






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
394/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
394/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
394/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
394/A


The image shows the front cover of an old book. The cover is decorated with a marbled paper pattern in shades of purple, blue, green, and cream. A central rectangular label with a cream-colored background and a thin gold border contains the text 'DEBACQ LIBRARY' in a black, serif, all-caps font. The book's spine, visible on the left, is made of dark brown leather with some wear and tear.


DEBACQ LIBRARY



A. xiv. b

394/A





37. 42206
ARETAEI CAP-
padocis medici lib. viii.

RUFFI EPHESII
de hominis partib. li. iiii.

I V N I O P A V L O C R A S S O
Patauino interprete.

A C C E S S E R E quę Crassus nō vertit
Aretæi aliquot Capita.

Ruffi liber de Vesicæ ac renum affectib.

Eiusdem de Medicamentis purgātibus.

Adnotationes locorum in quibus ab in-
terprete Græca discrepant.

P A R I S I I S, M. D. L I I I I.
Apud Guilielmum Morelium, & Iaco-
bum Puteanum.

Jm Graville Dny

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

1221 7 12 1221


1221 7 12 1221

1221 7 12 1221

ILLVSTRISS.

PRINCIPI ALBERTO
seniori, Marchioni Brandenburgensi,
Prusiæ, Stetini, Pomeraniæ, Vandalorum,
Cassubiorumque
Duci, Burggraui Norimbergensi, ac Rugiæ
Principi,

IUNIVS PAVLVS CRASSVS
S. P. D.

 Volōgè omnium pulcherrima, diuinisque operibus cōsimilia nobis à diis fuisse concessa, veritatem scilicet eloqui, & mortalibus benignè facere, Pythagoras ille philosophorum sapientissimus assererat. Id ego mecū sepe animo reputās, ALBERTE princeps Illustrissime, verissimam tantī philosophi sententiā esse cognoui. Deus nanque cū res omnium summa, perfectissima, verissimāque sit, cuiusque ve

* ij

ritatis fons est vberimus. idem cum sit
perquam beneficus & liberalis, in om-
nem mundum munera sua longè latèq;
diffundit: & quicquid est, à Deo vitam &
perfectionem, quantam eius natura ca-
pere potest, adipiscitur. quapropter ego
Deum imitari, eiusque muneribus ali-
quo pacto defungi cupiens, vt primùm
per ætatem licuit, veritatem docere, atq;
humanum genus pro virili parte iuare
constitui. Inde factum est, vt annos pro-
pè viginti in nostra Patavina Academia
per totam Europam celeberrima, Hip-
pocraticam medicinam publicè non in-
frequenti auditorio interpretatus fue-
rim. Verùm cum ab eo docendi officio
nimis laboribus deterritus, corpusculi-
que nostri valetudini consulens destitif-
sem, alia ratione veritatem patefacere,
humanoque generi opem ferre quare-
bam. Ea verò est, aut aliqua per me vti-
liter inuenta literarum monumentis cõ-
mendare, aut veterum auctorum obso-
leta documenta illustrare, in hominũ-
que memoriam reuocare. Cum in hac
animi fluctuatione versarer, fortè liber.

quidam Græcè manu scriptus, veterri-
mus & cariosus in manus meas incidit:
in fronte libri nomen auctoris inscriptū
erat, Areteividelicet cappadocis. de mor-
bis agebat, qui singulatim humani cor-
poris membra corripunt: ipsum auidè,
vt mihi moris est, & ter, & quater perle-
gi. perlectus liber cū gaudio, tum mœ-
rore animum perfudit meum. Quippe
gausus sum tam egregij auctoris librū
qui vetustatis iniuria hominūque so-
cordia in tenebris tot secula iacuisset,
in lucem Dei beneficio fuisse vindica-
tū. Indolui verò non mediocriter, ipsum
non sanum, non integrum, sed multis
mendis inquinatum, multis magnisque
vulneribus concisum & laceratum ad
manus nostras delatum esse. Caterū
hæc fragmenta colligere, vtque pluri-
bus vsui forèt, Latina facere, ac publica-
re satius esse iudicaui, quàm ea in totū
carie, tineis, sitūque deleri permittere.
Scriptor enim mihi plurimi faciendus vi-
sus est: nam salutaria in primis documē-
ta proponit: auxiliāque pellendis mor-
bis præsentanea recenset. quo quid ma-

gis expetendum mortalibus sit, nescio.
quid enim cetera vitæ bona affecto lan-
guentiq̃ue corpore proficiunt? præterea
summoperè lectorem detinet, atque de-
lectat. nam & quatenus materiæ conue-
nit, grandiloquus est cum ampla & sen-
tentiarum grauitate, & maiestate ver-
borum, vehemens, varius, copiosus, ad
permouendos animos acerrimus, ipsa
quoque vetustate venerabilis. Qua ve-
rò tempestate vixerit, apud nullum Græ-
cum Latinūve scriptorem hætenus re-
perire, aut certis coniecturis assequi va-
lui. Natione Cappadox fuit, vt libri testa-
tur inscriptio. in qua regione, licet bar-
bara, tres tamen gentes Græcæ, Dorica,
Ionica, & AEolica florere. Galen° cūm
huiusce Aretæi nusquam meminerit, a-
lioqui veteres medicos sæpe cōmemo-
rans, nullam de eo notitiam habuisse vi-
detur. Paul° AEgineta semel eum initio
quarti sui voluminis, Aetius verò Ami-
denus frequētius nominauit. Sua patria
lingua Ionica scribit: Hippocraticam-
q̃ue dicendi formam, idest breuitatem
cum grauitate coniunctam æmulatur.

Hippocrate nanque fuit etate posterior:
siquidem eum nonnunquam testem ad-
ducit: eiusq; vel integros aphorismos in
suis voluminibus conscripsit. Nulli secte
addictum se Aretæus aperte demonstrat:
in quibusdam enim ab Hippocrate, Ga-
leno, Aristoteliq; dissentit. De nonnul-
lis etiam morbis propria quædam à nul-
lis aliis tradita, rationi tamen consenta-
nea, scituq; dignissima exponit. Quàm
multos in eo transferendo labores tulerim:
quantum temporis atque olei ab-
sumpserim, vix queam dicere, cum pluri-
mis undique vulneribus confossus esset.
ex tribus tamen collatis exemplaribus
multa quæ deficiebant, restitui: quæ erant
deprauata, castigavi: quæ confusa erant,
in ordinem redegi. per coniecturas etiã
certissimas ab artis medicæ peritia de-
sumptas, non paucos locos librariorum
incuria vitiatos antiquæ & sanæ lectio-
ni restitui. De quibus autem ambi-
gebam, neque synceram veritatem
eruere, mihi que penitus satisfacere po-
teram, eos asterisco notavi: aliorumque
iudiciis pensandos castigandosq; reli-

qui: vtque in summa dicā, quantum huic
libro opis attulerim, qui candida mēte,
& liuore purgata ipsum curiosè lectita-
bunt, & cum Græcis exemplaribus con-
ferent, facilè deprehendēt. Libellus præ-
terea quidam Ruffi Ephesi de medici-
nalibus appellationibus inscriptus Fran-
cisci Frigimelici medici nobilissimi, &
omnibus reconditis disciplinis ornatissi-
mi opera cū ad me allat⁹ esset, auctoris
præstantia atque eruditione cognita, cū
quoque eadem de causa Latinitate do-
nandum, Aretæoque adiungendum esse
iudicaui. vterq; enim vetus scriptor est:
vterque Græca oratione artem medicā
literis commendauit. Fuit sanè Ruffus
Traiani Adrianiq; Cæsarum tempori-
bus, medicus eximius Ephesi natus, vrbe
Ionix celeberrima, minorisq; Asiæ me-
tropoli. Hic multos de medendi facul-
tate libros eruditissimè composuit, ma-
gnique Galeni testimonio laudari com-
meruit. nam de atra bile neminem ex-
actius luculentiusq; quàm Ruffum, dis-
seruisse cōmemorat. Verū ex tot eius
doctissimis libris hic vnus, quod ego

sciam, vix reliquus est. in quo singularū
corporis partium Græca vocabula enu-
merat: necnon & earum positum, figu-
ram, numerum, vsum, facultatesque de-
clarat. Igitur hunc libellum perutilem,
dignumque, qui ab eruditis perlegatur,
Latina lingua donare, & in manus stu-
dioforum proferre haud alienum duxi-
mus. Neque hîc parum diligentiae adhi-
bendum fuit, cū Græcis vocibus Lati-
nas respondentes indagaremus: neq; id
in omnibus semper assequi possemus. In-
terdum enim linguam nostram voca-
bulorum inopem (nisi forsan hoc igno-
rantia nostra factum sit,) inueniebamus.
At vbi nos Latina deficerent, Græcis,
quæadmodum & in aliis doctrinis fieri
solet, pro Latinis vti sumus. Porro illud
monitos lectores velim, huiusce libelli
primam partem à Ruffo bis eisdem fe-
rè verbis fuisse conscriptam, eadēque
fermè ad vnguem repetita. Quo id con-
filio fecerit, diuinare nequeo. Ego verò
cū ita manu scriptum librum offende-
rim, ita & transferre, & edere libuit. ne-
que enim ex toto partes hæ similes sunt:

Sed nonnulla, quæ in altera defunt, in altera reperiuntur: nonnulla, quæ in altera obscure ac breuibus perstricta sunt, in altera clarius ac fusius explicantur. Hos itaq; perueteres ac præstantissimos artis medicæ scriptores, ne eorum qui de humano genere benè meriti sunt, memoria prorsus euanesceret, diuulgare cùm mihi in animo esset, meaque commendatione apud vulgus eos minus probatum iri suspicarer, sub tuo nomine id facere optimum esse celsui illustrissime ac sapientissime Princeps. Te verò potissimum inter Christiani nominis principes delegi, cui has lucubrationes meas dicarem, quòd te constans fama & sanctissimis moribus, & vera religione insignem, bonarumq; disciplinarum alumnus, & parètem celebrat. non potui igitur non te maxima veneratione atq; amore prosequi: cùm nihil sit in terris optimo principe dignius, nihil amabilius: nihil, si modò humana diuinis cōferre fas est, quod magis Deo simile dici queat. Verus enim princeps ille est, qui vt dignitatis fastigio, perinde & virtute cete-


ris mortalibus præstat. Qui talis autem agnoscitur, is tanquã terrestris Deus, aut saltem Dei vicem gerens inter homines suspiciendus, ac sanctè pièque obseruandus est. Iccirco & antiquitus populi & ciuitates viros probitate vitæ excellentes ad magistratus & ad imperia prouebant: eosq; vel inuitos imperare cgebant. vt Scylax de regibus Indiæ memoriæ commendauit. Te verò huiusmodi esse, hisque de causis tanto imperio dignũ iudicatum, maximè atque optime Princeps, nemo tam rerũ imperitus est, qui nesciat. Ea enim in te omnia sunt, quę in summo rege inesse debere omnis testatur antiquitas. Porro familiæ tuæ, maiorumque tuorum splendorem, ac fortia facta consultò prætereo, quando quidem quæ nos, (vt poeta ille dicebat,) nõ fecimus ipsi, vix ea nostra puto. At quæ tua propria sunt, & verè regia ornamenta, ea planè digna sunt, quæ ab omnibus in cœlum ferantur, ab omnibus memoriæ ac literis prodantur. Admirabilis prudentia, quam propriam regum esse virtutem Aristoteles

voluit, in primis apparet. per eam enim
tantam molem tuæ latissimæ ditionis
tam in bello, quàm in pace scientissimè
gubernas ac moderaris: populisq; tuis
ventura incommoda longè prospiciens
& cauens, eos in summa tranquillitate
conseruas. iustitia præterea, quæ cuiusq;
regni firmissimum vallum ac munimen
tum est, nullo vnquã in principe, quàm
in te clarius enituit. nam sua cuique pro
meritis tribuis: diuites potentioresq; nõ
deprimis: proceres atq; humiles sustines,
foues, à contumeliisq; defendis. Libe-
ralitatem autem tuam, & erga omnes,
sed præcipuè literarum cultores muni-
ficentiam quis vnquam satis pro meri-
tis laudauerit? Plurimos enim ære tuo
non in Germaniæ modò verum etiam
Italiæ gymnasiis vberrimè fouisti atq;
sustentasti: scholã Regiomontanam in-
stituisti: doctissimisq; viris, qui studio-
sam iuuentutẽ erudirent, vndiq; accitis
exornasti: bibliothecã quibuslibet vete-
rũ scriptorũ libris refertissimã profusissi-
mis impensis condidisti. quam qui vider-
unt, cū antiqua illa Philadelphi Aegy-

ptij bibliotheca certare cōtendunt. Né-
pe fortitudinem, quanta in te sit, res in
bello strenuè ac fortissimè per te geste,
omnibusq; vel remotissimis gentibus
manifestæ declarant. Humanitatem &
clementium incredibilem non modò
subditi, sed & finitimæ & longinquæ na-
tiones testantur: cùm nemini vnquam te
adire volenti occludatur accessus: nemi-
ni vnquam irrita ceciderit, modò fuerit
honestæ petitio. Iure itaq; Homeri poe-
tarum principis carmina illa de te cani
possunt, quibus bon° princeps pastor po-
pulorum dicitur. Iuppiter deorum ho-
minūq; pater appellatur. Quid mirū er-
go, si tu virtutibus adeo fulgens, in tan-
ta fortunæ amplitudine positi⁹, (quæ duo
in eodē rara inuentu sunt,) me ad te a-
mandū, & quoquo modo possem, colen-
dū illexisti, vel potius attraxisti? Ac non
vereor, ne flagitiosa quadā assentatione
aucupari tuā gratiā videar: neq; enim
tu is es, qui sis nescius eos magis qui te
non admirentur, inuidos, quàm eos qui
laudēt assentatores esse iudicandos. Nā
quæ de te hætenus prædicaui, neq; mea

cōmentum sunt, neq; solus attestor: sed hæc
passim Germani, Sarmatæ, Itali homi-
nes, neque vulgaris notæ, sed grauissimæ
quiq; viri vno ore fatentur, ac celebrant.
Hisce ego rebus impulsus, sed tua po-
tissimū lenitate mansuetudinēq; fretus
benignissime Princeps, hos tibi dedicaui
libellos: non me latet, quā ignobile,
quā sordidū munusculū: at me legisse
memini Artaxerxi Persarū regi cogno-
me: to Memori agrestē quendā haustā ē
proximo flumine aquā caua manu ob-
tulisse: neq; ab eo reiectum, sed comiter
acceptum, & phiala aurea, stola persica,
multisq; daricis donatum abiisse. Dices
forte, quid principi cū medicorū libris?
multa & præclara priscorum regū exem-
pla adduci possunt, Attali regis minoris
Asiæ, Gentij Illyriorum, Iubæ Maurita-
niæ, Mithridatis regum barbarorum ma-
ximi. Hi omnes medicinæ scientiā ada-
marunt, diligenterq; coluerunt. Quod
nisi iā plus æquo vagatus essem, tibi va-
lentissimis argumentis ostenderē, prin-
cipi viro nihil medicina charius, nihil iu-
cundius, nihil fructuosius in vita accide-

re posse. Itaq; ne tuas aures grauissimis
in administranda republica negociis oc-
cupatas diutius inani loquacitate fati-
gem, finem faciam, si hæc pauca adiece-
ro, me in his vertedis auctoribus fidelē,
quàm elegantē atq; disertū esse maluis-
se. cū in arte medica res spectentur, nō
verba pendantur. Sterilis quoq; materia
est morborum natura & curatio: neque
magnæ, (in alieno præsertim libro) fa-
cundia capax: quæ alioqui nobis te-
nuissima est. Sed iā aliud op^o, quod deus
fortunet, sanè quàm pulchrius meo iudi-
cio, longēq; vtilius amicis nostris hortā-
tibus, ac prope impellentibus aggressi
sumus: vbi non alieni scriptoris sententiis
adstringemur, sed propriis viribus niten-
tes spatiabimur. latius excurret oratio,
amœna interdū quæret diuerticula: ca-
sus mirabiles, euentus varios, aliāq; iu-
cunda dictū, ac legentibus non minus
frugifera, quàm blanda narrabimus. In-
terim hos libellos nostri erga te animi
veluti arrabonē qualēmcūq; mittimus,
grandiorem librū, & magis operosum, si
hos nō respueris, missuri posterius. Vale.



AR ET AE I CAP
padocis medici

DE CAUSIS ET SIGNIS
acutorum morborum,
Liber I.

Iunio Paulo Crasso Patauino
interprete.

PRIMI LIBRI CAPI-
ta, ex quibus prima quatuor perierūt.

| | |
|---------------------------------|------------|
| De phrenitide, | cap. I. |
| De lethargo, seu veterno, | cap. II. |
| De tabe, | cap. III. |
| De apoplexia, | cap. IIII. |
| De accessione morbi comitialis, | cap. V. |
| De tetano seu rigore, | cap. VI. |
| De angina, | cap. VII. |
| De affectibus columellæ, | cap. VIII. |
| De tonsillarum vlceribus, | cap. IX. |
| De pleuritide, | cap. X. |

A

2 DE ACCESSIONE MOR-
bicomitalis, cap.V. sine principio.

* hebetudines, vertigines, tēdonū gra-
uitates, venarum colli repletiones &
distensiones: nausea frequentius quidē
à cibis, non minimē tamen & ab inedia
pusilla quædam nausea sequitur, & vbe-
rior pituitæ sit vomitus: paucis assum-
ptis cibis fastidiunt, & crudi sunt: flatibus
replentur: præcordia elata habent.
Hæc sanē perpetuò comitantur. cū ve-
rò accessio appropinquat, splendores
quidam purpurei, aut nigri, aut omnes,
vnā permixti ob oculos in orbem ver-
santur ac discurrūt, vt in cœlo iris præ-
senta esse videatur: aures sonant, fœdū
odorem sentiunt, iracundi fiunt, bilis
præter rationem accenditur. Quidam
igitur leui de causa, vt potē ob animi
angorem, ceciderunt: aliqui intentē flu-
minis decursum, aut rotam quæ circun-
uoluitur, aut turbinem qui in orbem
agitur, conspīcati: alios autem rerum
grauolentiam, vt gagatis lapidis odo-
ratus, prostrauit: his vtique in capite vi-
tium inhæsit, atque inde noxam infe-

DE ACUTIS lib. I. 3

rens ortum habet. Nonnullos verò & corripit à nervis procul à capite positus incipiens, quicumque principium in consensum affectus inducant. Itaque magni manuum aut pedum digiti conuelluntur: vnde & dolor, & stupor, & tremor sequuntur. atque hæc in caput impetum faciunt, si & malū surrepēs caput inuasit. His porrò fragor quidam redditur perinde ac si ab ligno, aut lapide verberentur. cūque ab humo surrexerunt, quædam tanquam si ex insidijs vapulassent, commemorant: hoc sanè pacto illi quibus primo id malum incidit, decipiuntur: quibus verò familiare & consuetum est, simul atq; morbus in digitum impetum dedit, aut inde exortum est, vñtatos, qui adsunt, adiutores inclamant, futuramque ab experimento calamitatem prospiciunt: obsecrant quoque, vt membra, vnde oritur, constringant, reflectant, dirigant. qui etiam ipsimet sibi ipsis affecta mēbra, tanquam inde morbum eximentes trahunt velluntque: atque ita sibimet auxiliātes, nonnunquam & nos ad ægri-

A 2

tudinis notitiam impulerunt. Nōnal-
los utique ceu inuadente fera pavor
corripuit, aut adumbrationis opinio
incessit, atque ita prociderunt. At in ip-
so morbi insultu sensibus captus ho-
mo iacet: manus ipsi nervorum disten-
sione conuelluntur. crura verò non so-
lum distracta sunt, sed etiam huc atque
illuc à tendonibus proijciuntur. Id ge-
nus calamitas ingulatis tauris haud
absimilis est: ceruix incuruatur, caput
variè distorquetur. siquidem nonnun-
quam pronū ceu arcus inflectitur, quā-
do pectori maxilla adherescit: nonnun-
quam verò in scapulas refringitur, ve-
luti his qui per vim crinibus trahuntur,
usu venit: quando modò in hanc, modò
in illam partem ad humeros admoue-
tur. Sic laborantes magno hiato os ape-
riunt: id siccum habent, linguam praelō-
gam, ut periculum sit ne aut magno
vulnere faucietur, aut penitus absin-
datur. Interdum conuulsione dentes in-
ter se colliduntur: oculi inuersi sunt:
palpebrae cum palpitatione frequenter
dehiscunt. quòd si quando conuiuere

DE ACVTIS LIB. I. 5

velint: palpebræ non committuntur, sed alba oculorum cernuntur, ac subapparent. Supercilia nonnunquam, ut his qui ad iram concitantur, in glabellam attrahuntur: nonnunquam ad tempora vehementer admodum reuelluntur: ut cutis circa frontem valde prætenta sit, atque in superciliorum medio rugæ euanuerint. Malæ rubentes palpitant: labia interdum quidem in acutum clauduntur, interdum verò ad obliqua dilatantur, quando in ridentis speciem dentibus circuntenduntur. Malæ rubent quidem, sed cum morbus increuit, & faciei liuor accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, ut in strangulatu, aufertur. etiam si vehementer inclames, non sentiunt. eorum vox nihil nisi gemitus & suspirium est. respiratio verò suffocatio quædam est, veluti in his qui laqueo strangulantur. Inter initia arteriarum motus vehementes sunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi, & languentes: in vniuersum autem, ordine carentes. penis quoque erectio sequitur. Hæc utique circa acces-

sionis finem patiuntur: vbi ad mali remissionem perueniunt, tunc sponte vri nam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adstrictis compressisque vasculis genitura excernitur. id verò & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere potest. siquidem & istis neruorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, crassam, & frigidam: eam si trahas, in longum, veluti filum, ipsius multitudinem deduces. Porro temporis longitudine, & laboris vehementia, quæ intra pectus sunt, feruent: spiritus verò intus coercitus omnia concutiet: eorundem quoque & conuulsio & perturbatio sequitur. inter respirandum præterea humores & os & nares inundant, spiritus cum humore effertur. Cum præcedens verò strangulatio remittit, omnia item remittere videntur. Quinetiam, vt magnis procellis cōcitatum mare, spumâ ore profundunt: quando & tanquam iâ dudum expulso morbo resipiscunt, & resurgunt. Cæterû cum à morbo quiescunt, ab initio membris segnes sunt: ca

DE ACVTIS LIB. I. 7

pitis grauitate premūtur: dissoluti sūt,
languidi, pallentes: consternati animo
ob lassitudinem morbi que verecun-
diam contristātur.

DE TETANO SEV RIGORE, cap. VI.

Tetani musculorum qui in maxillis
sunt, & tēdonum distentiones sunt,
dolorem quidem magnum inferentes,
celerrime vero necantes, haud facile
quoque sanabiles. At noxæ ab hoc ma-
lo cum omni corpore communicātur:
omnia enim cum principiorum vitijs
consentiunt. Species verò conuulsionis
tres sunt, cū rectum corpus riget, aut
retrosum flectitur, aut prorsum vers⁹
incuruatur. Recto quidem corpore te-
tanus dicitur, cū neutram in partem
detortus homo atq; inflexilis contētus
est. At cōuulsiones, quæ retrorsū aut in
priorē partē fiūt, à tētione & loco nomē
claturā accipiunt. nā in auersā partē æ-
grotātis reclinatiōē opisthotonō vo-
cam⁹, neruis qui eō loci sunt, male affe-
ctis: emprosthotonon autē, si in priorē

A 4

partē homo deflectitur, neruis antērius
 positis laborātibus. ton⁹ enim neruorū,
 tentionisq; vocabulū est. Causae autem
 istorū infinitae sunt. nā ob vulnera fieri
 solēt, mēbrana, aut musculis, aut neruis
 pūctis, ex quo plerūque moriūtur. à vul
 nere enim cōuulsio, letale est. Cōuelli
 tur autē & ex abortu mulier: verūm &
 haec raro admodū euadit. & ab aliquo
 vehemēti ceruicis ictu nōnulli cōuellū
 tur: & frigus lōgē excellēs horū vitiorū
 causa esse potest. quapropter hyems o
 mniū maxime horū vitiorū ferax est:
 secundo loco ver & autūnus, aestas autē
 minime, nisi vuln⁹ prēcesserit, aut pere
 grini morbi grassentur in vulgus. Mu
 lieres sanē magis, q̄ viri, neruorū disten
 tione tētantur: frigidae enim sunt. verū
 ipsę frequētius liberātur, quoniā humi
 de sunt. Quātū ad ætates attinet, pueri
 assiduē hoc morbo vexātur: sed nō ad
 modum pereunt, quòd illis vītatū &
 familiare id vitium sit. iuuenes autem
 rarius quā pueri, id patiuntur: sed cre
 brius intereunt. viri minime. at senes
 inter omnes magis & eo vitio corripitū

DE ACVTIS LIB. I. 9

tur, & eo necã ur. in causa est frigiditas
& ariditas senectæ, & mortis natura. Ce-
terum si frigiditas cum humido coniũ-
gatur, minus noxiæ sunt cõuulsiones,
mi: usque ab ipsis discrimen impêdet.

Affectũ hunc ista comitantur: omnes
subito atque affatim corripit, labor &
intentio tendonum adest: & dorsi, &
musculorum, qui in maxillis & pectore
sunt. inferiorem enim maxillam supe-
riori annectunt adeo, vt neq; vectibus,
aut cuneis per Iouem facilẽ diduci pos-
sint. Quod si quis vi dentes abducẽs hu-
morem instillauerit, non demittũt, sed
effundunt, aut ore continent, in narẽs-
ue retrudũt. Isthmus enim simul inhæ-
rescit, ac tonsillæ duræ atque intentæ
eius quod deuoratur impressioni non
cedunt. Facies est rubida, variegata, o-
culi ferme rigentes, qui vix circumuol-
uantur: strangulatio vehemens, spiratio
vitiosa, manuum crurũque distentio,
musculi palpitantes, facies varijs modis
distorta, buccæ & labia tremunt, maxil-
læ quatiuntur, dentes strident: in alio
verò quodam & aures mouebãtur. Ego

sanè vidi & miratus fui, lotium sup-
 primi vsque ad insignem meiendi dif-
 ficultatem, aut sponte effundi, cum
 vesica premeretur. Hæc utique omni-
 bus cōuulsionis generibus communia:
 propria verò cuiusque hæc sunt: tetani
 quidem in rectum totius distentio, nul-
 lam prorsus in partem detorta neque
 declinans. recta quoque sunt crura &
 manus: opisthotonos verò retrorsum
 incuruat hominem, vt reflexum caput
 inter scapulas locetur, guttur extat: ma-
 xilla inferior plerunque dehiscit, & ra-
 rō cum superiore committitur. in respi-
 rando stertunt, venter & pectus promi-
 nent, lotium his minus contineri po-
 test. abdomen intentum est, & si percu-
 tias, resonans. manus retrorsum exten-
 sione detorquentur: crura inflectuntur;
 econtrariō poplites vitiosè curuantur.
 At si in priorem partem contrahuntur,
 conuexa quidem his terga sunt: æqua-
 liter cum parte pectori opposita, quam
 metaphrenon Græci appellant. coxen-
 dicibus extra pulsīs, dorsum totum re-
 ctum est: vertex caputque in pectus ver-

DE ACVTIS LIB. I. 11

gunt: mētum ossibus pectoris affigitur, manus confertæ sunt, & cohærentes: crura extenta. Dolores omnium atroces, vox omnium flebilis. suspirant autem mussantes profundius. Si pectus & spiritum morbus occupauerit, facile migrant è vita: bonum quidem ægrotanti quòd laboribus, distortionem, turpitudinēq; liberatur. præsentib⁹ quoq; hominibus min⁹ triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritus licet vitiato, nihilominus permanente, prorsum versùs non arcus modò instar, verum & orbis incuruatur, ut caput genibus adnexum habeant, cruræque ac terga in priorem partem refracta sint. adeo ut genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniucundus aspectus, triste intuenti spectaculum, & malum insanabile: ob inuersionem autem vel ab amicissimis hominibus non agnoscuntur. votum quoque illis qui adsunt, prius impium, nunc honestum efficitur, ægrum vita defungi, quo vnà cum vita doloribus & acerbis malis liberetur. Quinetiam neque

medicus præsens atque aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figuræ emendationem quicquam opis afferre potest. nam si mēbra dirigere velit, viuentem sanè hominem distraxerit discerpseritque. Igitur victis à morbo nihil vltra subueniens, contristatur duntaxat. hæc verò est medici magna infelicitas.

DE ANGINA, cap. VII.

ANGINA peracutus affectus est. spiritus enim cōpressio est. Duæ verò eius species sunt. aut enim instrumentorum spirandi phlegmone est, aut solius spiritus in seipso causam habentis affectus. Instrumentorum quidem, tonsillarum, epiglottidis, faucium, columellæ, summæ arteriæ: quod si depascitur, phlegmone, etiam linguæ, & maxillarum interius: cū ob phlegmones excellētem magnitudinem, linguam extra dentes proferunt. oris enim cauernam implet, & ipsius quod abundat, extra dentes exeritur. hoc malum synanche Græce,

angina Latine, & cynanche, id est canina angina nominatur: aut quoniam huiusmodi animalia assidue hoc malo vexantur, aut quod etiam sana linguam exerere consueverunt. Alteri autem generi contraria eueniunt, instrumentorum collapsio, & singulorum nature insignis macies, & strangulatio vehemens: ut ipsemet in pectore latetioribusque partibus circum cor atque pulmones abditata esse inflammatio videatur. anginam hanc appellamus, quasi interius vrgentem atque angentem. Ego verò existimo ipsius solius spiritus id vitium esse, praua conuersione ad calidissimum sic cissimumque conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante. Id autem mirandum non est. nam in Charonæis strangulatus citra vllum corporis affectum acutissimi contingunt. immò vel vnica inspiratione prius quam corpus aliquod maleficio contrahat, homines moriuntur. quinetiam & à rabido cane, qui in faciem, dum spiritus adducitur, tantummodo inspirauerit, & nullo pacto momorderit, in rabicm ho

mo agitur. Talem igitur respirationis mutationem interius fieri, haud est ex his quæ fieri nequeant: quandoquidem & alia infinita eorum quæ in homine sunt, eandem speciem cum exterioribus causis obtinēt. succi perdentes intra corpus sunt & exterius. morbi quoque medicamentis perniciosi assimiles: & à medicamentis talia vomunt, qualia ob febres vomere solent. Quocirca neque à ratione alienum est, in pestilentia quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Piræi à Peloponensibus venena fuisse coniecta. homines enim pestilentis morbi cum letalibus medicamentis similitudinem ignorabant.

Adest fanè canis angina laborantibus, tonsillarum, faucium, totius oris inflammatio: lingua extra dentes & labia prominēs: salivæ effunditur: pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patētes, valdè rubent: potus in nares refunditur: dolores acerbissimi sunt, sed strangulatione vexati eos obscurius sentiūt: pectus & cor ardent: frigidi aeris desiderium adest,

DE ACUTIS LIB. I. 15

& admodum exiguum inspirant, couſq;
donec demũ intercluſo ad pectus aeris
trãſitu ſtrangulẽtur. Nempẽ quibuſdã
cum pulmone vitium facile commu-
nicatur: hi vero permutatione moriun-
tur. febres ignauæ oriuntur, molles, ni-
hil proficientes. At ſi alicui in bonum
res vertitur, abſceſſus ſecundum aurem
hinc atque inde exterius aut interius in
tonſillis fiũt. Quod ſi cũ torpore nõ ad
modũ tarde fiãt, euadũt quidẽ, ſed cum
dolore atq; discrimine: ſin autẽ morbo
in abſceſſum mutato, tumor maior ſu-
beſt in acutũ abſceſſu inſurgẽte, repẽte
ſtrãgulãtur. Hæ ſunt planẽ caninẽ angini
ſpecies. Anginã autẽ collapſio, graci-
litas, pallor comitãtur, oculi caui, inte-
ri^o demerſi, fauces & gurgulio retracti
tõſillæ multo magis ſubſidẽtes, vocisq;
priuatio. Huiuſcẽ ſpeciei ſtrangulatus
lõgẽ quã prioris, violẽtior: quippe cũ
in pectore malũ ſit, vbi ſpirãdi initiũ po-
nitur, eodem die moriuntur, qui celer-
rime: nonnunquam & ante quã me-
dicum accerſuerint: nonnulli & accer-
ſito medico nihil profecerunt. mortuus

est enim arget ante quàm medicus ar-
te vteretur. Quod autem in melius ver-
titur, inflammatur omnia, quęcunque ex-
trorsum phlegmone impulerit: quare
ex synanche, id est angina, fit cynache,
id est canis angina. Bonum quoque est,
si in pectore magnum œdema oriatur,
aut insigne erysipelas. Egregius vero
medicus, aut cucurbitula in pectus ma-
lum detrahit, aut sinapim ossibus pe-
toris, aut partibus iuxta maxillas im-
ponens extrinsecus ulcerat difflatio-
nemque molitur. Quibusdam sanè bre-
ui tempore vitium his auxiliis exterius
tractum fuit: absolutum verò, subito re-
currit, & ad interiora reuersum est.

Causę utique infinitę sunt, refrigera-
tiones magis, exustiones minus, plagę,
ab ossibus piscium penetrationes in ton-
sillas, frigida potus, ebrietates, satura-
tes, & mala à respiratione prodeuntia.

DE AFFECTIBVS COLV-
mellę, cap. VIII.

CORPUS solidum ex palato pendens,
inter tonsillas positum, columna &
gurgulio

DE ACVTIS LIB. I. 17

gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomen est. Columella natura neruus est, sed humidus. nam in humido loco situs est. Iste itaque gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim plegmone crassescit, æqualisque à basi vsque ad extremum terminum efficitur in longum protentus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & increfcit, liuet, atque subnigricat, vua huiusmodi affectus cognominatur: omnia enim vuæ similia sunt, & figura, & color, & magnitudo. Tertius affectus est membranarum ab vtraque parte iacentium, quæ veluti squammæ latæ, aut vespertilionum alæ conspiciuntur. id genus morbi lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem & oblongam membranam columella desinat, veluti vrinaculum in extremis habens, craspedon Græci hunc affectum nominant, quod montis radicem vel pedem significat: Latino caremus vocabulo. Prouenit au-

B

tem & id ex fluore, quemadmodum & alia vitia: fit verò & per abscissionem obliquè factam ab vno tantùm latere membranam relinquente medico. sin autem bicornis columella reddatur, geminis membranis hinc atque inde pendentibus, nomen quidem nullum obtinuit, verùm affectus ipse perspicuus est. omnia verò hæc facilè fuerit introspicientē dignoscere. Omnibus ipsis strangulatus accidit, & ægrè cibū potūmq̃ deuorant. tussis quoque omnibus adest, sed præcipuè loro vexatis, & craspedo. quædam enim arteriæ titillatio à membranis oritur: nonnunquam verò & aliquid humoris in arteriam clanculum instillatur, ynde ad tussim prouocantur. Vuam autem & columnā maior spiritus difficultas sequitur, & magis impedita deuoratio. in his enim humor in nares repellitur, quoniam tonsillæ vna malè habent. Senibus columna accidere consuevit: iuuenibus autem ac viris, vua. siquidem hi sanguine repleti sunt, & inflammationi magis obnoxij. pubescētes & pue-

DE ACVTIS LIB. I. 15

ros membranarum vitia sæpius infestant. Secari autē omnia citra noxam queunt: sed in vna adhuc rubentibus locis sanguinis effluuium, & dolores, & phlegmones incrementū superueniūt.

DE TONSILLARVM VLCERIBUS, cap. ix.

Vlcera in tonsillis fiunt, aliqua familiaria, mitia, non ledentia: aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non altè descendunt, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pingua, quodam concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia. Id genus vlcera aphthæ nuncupantur. Quod si cōcreta illa sordes altius descēderit, affectus ille eschara est, atq; ita Græcè vocatur, Latinè crusta. Crustā vero circūueniūt rubor excellēs, & inflāmatio, & venarū dolor, quemadmodum in carbunculo, & exiguæ raræque pustula, quas Græci exanthemata vocant, orientes, hisque aliæ superueniētes in vnum

coalescunt, atque inde latum vlcus efficitur. Id si interius in os depascendo serpit, ad columellam vsque peruenit, ipsamque exedit, & linguā etiam occupat, & gingiuas, & fræna, id est dentium alueolos: dentesq; inde labefactantur & denigrescunt. In collum etiam phlegmone erūpit. atque isti haud ita multis dieb' pōst phlegmone, febribus, fœtore inediāque cōsumpti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangulat. pulmo enim & cor neque talem odoris fœditatem, neque vlcera, neque saniosos humores sustinent: sed tussis spirandique difficultas enascitur. Causa maleficij tonsillarum est, frigidorum, asperorum, calidorum, acidorū, adstringentiumque deuoratio. quandoquidem hæ partes pectori ad vocem spiritūque edendum inseruiunt: & ventri, ad alimentī transmissionem: & gulæ, ad eiusdem deuorationem obsequio sunt. Internis verò partibus si quod contingat incommodum, ventri videlicet, gulæ, & pectori, ad isthmum, & tōsillas, & lo-

ca ibi posita mali consensus & eructationes perueniunt. Quapropter pueri vsque ad pubertatem maximè hoc morbo tentantur. præcipuè nanque pueri multum frigidumque aerem inspirant. quoniam in his plurimum caloris inest, & ad cibos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, & excandescunt ac ludentes altiùs vociferantur. Puellis quoque vsq; ad menstruæ purgationis tempora hæc vitia vsitata sunt. Regio Aegypti horum affectuum planè fecunda est. aer enim spirando ficcus adducitur: varios præterea cibos suggerit. radices enim, herbae, atque olera ibi largè proueniunt, & acris semina, & potio crassa, utpotè Nilii aqua. sibi vero Aegyptij ex ordeo, & ex flocibus seu vinaceis potiones acres conficiunt. Syria quoque, maximè illa, quæ cœle, id est caua nominatur, huiusmodi morbos procreat. vnde Aegyptia & Syriaca vlcera id genus appellant. Modus vero mortis quæ miserimus accidit. dolor quidem acer, & calidus, qualis in carbunculo, spiritus vi-

tiatus. exhalant enim maximæ putredinis odorem, eundemque vehementer in pectus spirando adducunt. Immundi adeo sunt, ut neque suum ipsorum odorem ferre queant. Pallida his seu livida faciès, febres acutæ, sitis, ut igne accensi videantur: potum, veriti dolores, non admittunt. tristantur enim, cum tonsillæ comprimuntur, aut potus in nares resilit. cumque decubunt, surgunt ut sedeant, decubitus non ferentes. quod si sedent, quiete carentes, iterum decumbere coguntur. plerunque autem recti stantes obambulant, nam quiescere nequeunt: solitudinem fugiunt, dolorem tollere dolore tentantes. Inspiratio magna est. frigidum enim aerem ad refrigerationem desiderant: expiratio verò parva. nam veluti igne exusta ulcera cum sint, à calido præterea spiritu inceduntur. raucitas adest: vox nihil significat. atque hæc in peius ruunt, cum subito in terram collapsis anima deficit.

DE ACVTIS LIB. I. 23
DE PLEVRITIDE,
id est morbo lateris, cap. x.

SVb costis, dorso, & internis pectoris
ad iugula vsq; tenuis membrana ro-
bustaq; ossibus inhærens substrata est,
cui nomen succingens inditum est. In
hac cum phlegmone suborta fuerit,
ignis adest cum tussi & sputis variis.
pleuritis morbus iste à Græcis appella-
tur. Opus est autem omnia hæc inter se
cōsonare atque conspirare, ab vna cau-
sa pendentia. quotquot enim ex his
sparsim alia ab alia causa proueniunt,
etsi omnia simul ingruunt, pleuritis nō
vocatur. Hunc affectum comitatur
dolor acutus ad iugula ascendēs, ignis
acer: decubitus in latus inflammatum
facilis est. in sua enim ipsius sede collo-
catur: in oppositam vero partem decu-
bitus dolorem cōcitāt. à pondere enim
& phlegmone, & suspensione in omnes
membranæ continuas partes ad hume-
ros vsque & iugula: quibusdam vero &
in terga, & in dorsi scapulas dolor pro-
tenditur. pleuritida veteres Græci ap-

B 4

pellarunt, Latini morbum lateris, vel
costarum. Eam vero sequitur difficilis
spiritus, vigilia, ciborum fastidium,
malarum rubor hilaris, tussis arida, spu-
ta ægrè exeuntia, pituitosa, aut biliosa,
aut abundè cruenta, aut subflaua: & hæc
ordinè non seruantia, sed aliàs alia ad-
uenientia ac recedentia. ex omnibus
verò peius est, si cruentum sputum desit.
Delirant autem, & nonnunquam co-
mate occupantur, atque in soporè gra-
uem inclinantes, mentis alienationem
patiuntur. Itaque si in malum vertatur
morbus, omnibus in peius vergētibus,
intrà septimam isti in syncopam lapsi
consumuntur: at si in secunda heb-
domada educi sputa incipiant, & mala
augescant, decimoquarto die pereunt.
Nonnunquam sanè intra huius tempo-
ris spatium, omniū in pulmonē transi-
tus est. trahit enim in seipsum pulmo ra-
rus, & calidus, & ad proxima trahenda
sefe commouēs: tuncque morbi trans-
positione repente homo strangulatur.
Cæterum si diem hunc agrotus transie-
rit, atque intra vicesimum non moria-

DE ACUTIS LIB. I. 19

tur, in empycum, hoc est pectore sup-
puratum euadit. Hæc profectò, si mor-
bus ad perniciem tēdat, eueniunt. At
si in melius vergat, sanguinis è naribus
larga profusio cū impetu succedit: tūc
que repente morbus discutitur. quan-
doquidem & somnus oritur, & pituitæ
reiectio aduenit, postea biliosorum te-
nuium, deinde multo tenuiorū, rursus
verò cruentorum, crassorum, carnis for-
mam referentium. Quòd si post cruen-
ta iterum exeat bilis, post ipsam pitui-
ta, secuta est hæc in pristinum restitui-
tio. Hæc si tertio die incipiunt, & faci-
lè extusciunt, læuia, æqualia, humida,
rotūda, septimo die liberantur, quando
& venter biliosa exturbat, spiratio con-
quiescit, mens ad se redit, febres decre-
scunt, ciborum appetentes sunt. Si se-
cunda verò hebdomada hæc inchoan-
tur, decimoquarto die sanantur: sin mi-
nus in empyema, hoc est pectoris sup-
purationem morbus vertitur. Id verò
rigores indicāt, dolorésque punctorij.
sedere cupiunt, spiritus deterius duci-
tur, tūc metus maior est, ne pulmo pus

multum subito attrahens hominē suffocet, qui prima & maiora mala euaserat. Verum enim verò si inter costas morbus irreperit, easque disiunxerit, & phlegmones fastigiū extrorsum deprompserit, aut versus intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni tempora hyems maxime huius morbi ferax est: secundò autumnus: ver minus, nisi interdum frigidum sit: estas verò minimè. Quātum ad ætates attinet, in primis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæpius quàm alij liberantur. neque enim magna phlegmone in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est: quippe qui est in senectæ quàm in alia ætate frigidior, quādo & spiratio parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autē & viri haud ita frequenter in hūc morbum incidunt: verum neque admodum frequenter euadunt. nam neque ab exigua causa, neque ob exiguam phlegmonem ægrotant. in magnis autem maius inest periculum. Et pueri minimè pleuritide

DE ACVTIS LIB. I. 27

corripiuntur, minúsque ab ea periclitantur. quandoquidem puerilia corpora rara, humida, fluxáque sunt, ac multa est in eis difflatio atq; digestio: quocirca neque magna contrahitur phlegmone. ea est huius ætatis in hoc morbo felicitas.

ARETAEI CAP
padocis medici

DE CAUSIS ET SIGNIS
acutorum morborum, Liber secúds,

IUNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

Hæc insunt in secundo libro.

| | |
|-----------------------------|------------|
| De pulmonaria, | cap. I. |
| De sanguinis reiectione, | cap. II. |
| De syncopa, | cap. III. |
| De ardoribus, | cap. IIII. |
| De cholera, | cap. V. |
| De voluulo, | cap. VI. |
| De iecinoris acutis morbis, | cap. VII. |
| De caux venę acuto morbo, | cap. VIII. |

De renum acutis affectibus, cap. I X.

De vesicae acutis affectibus, cap. X.

De uteri strangulatu, cap. X I.

De satyriasi, cap. X II.

DE PVLMONARIA, cap. I.



O B duo potissimū viuunt animalia, escam videlicet & spiritū. ex his multo magis vitæ cōducit spiratio. hanc enim si quispiam supprimat, non diu feret incolumis, sed protinus interibit. Huius instrumenta multa parata sunt. initium sunt nares: via est arteria: locus cōtinens, pulmo: pectus autem pulmonis est vallum & conceptaculum. Verum cætera vt instrumenta solū animali subseruiunt, pulmo verò attrahendi causam in se continet. Nanque in ipso medio calidū viscus sedet, cor, vitæ spirādique principium. id pulmoni quoque attrahendi frigidi acris cupiditatem iniicit. siquidē ipsum incendit, verūm cor est quod attrahit. In pri

mis igitur si cor affectū est, nō diuturna est mortis dilatio: si pulmo male habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitam agit, mors tardissime aduenit, si quis medelam adhibet. Si vitium insigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, vocis spiritusque sublatio: subitanea perniciēs imminet. Hæc est ægritudo ea, quā Græci peripneumoniam, Latini pulmoniam dicunt, vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. quippe qui naturaliter dolore immunis sit, ob corporis raritatē, lanis assimilis. asperæ arteriæ in ipso insertæ sunt, cartilaginosa, & ipsæ dolorem non sentientes. Musculorum pulmo expers est: nervos habet exiguos, graciles, ad motum ciendum opportunos. his de causis pulmo dolorem non percipit. At si quæpiam ex membranis eum ambientibus & ad pectus deligantibus inflammatur, adest tunc & dolor, spiritus est deprauatus, calidus: sedere volunt laborantes: ad spiritum du

cendum, corpus rectum statuitur: ad id enim hic est situs aptissimus. rubescit facies, sed malæ præcipue: oculorū album nitidissimum ac pingue est: summæ nares finæ sunt, venæ temporum vel etiam colli elatæ apparent: cibos auersantur, arteriarū pulsatus initio magnos habent, inanes, creberrimos perinde ac si festinare coacti sint. calor in exterioribus membris modicus humectusque est: in interioribus, ingens, aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, lingue siccitas, frigidi aeris aueritas: mētis ambiguitas superuenit: tussis adest plerūque sicca. sin aliquod sputum mouet, id vel spumans pituita est, aut aliquid exquisitè biliosum, aut cruentum floreo colore valde perfusum. id vero cruentū aliis perniciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, vigilæ augeant, somn⁹ paucus, torpidus, haud ablimilis sopori, qui à Græcis coma nominatur. cogitationes vanæ insurgunt, mens alienatur, non admodum ecstasi corripuntur: præsentia mala ignorant. nam eos si de morbo interroges, nihil

periculi instare respondent. eorum al-
 gent extrema: liuescunt vngues cur-
 uanturque. motus arteriarum parui fre-
 quentissimiq; sunt & deficientes: quan-
 do ipsis proxima mors est. nam septimo
 die plerūque moriuntur. Porro si non-
 nunquam morbus subsistit, & aliquan-
 tulum in melius vergit, vehemens de
 naribus sanguinis eruptio conspicitur:
 aut per aluum cum perturbatione mul-
 torum biliosorum & spumantium suc-
 corum deiectio. qui ex pulmone in sa-
 crum ventrem depulsi fuisse videri pos-
 sunt, si multi liquidiores & facile deii-
 ciuntur. nonnunquam verò & per vri-
 narias semitas euocantur. Cæterū qui-
 buscunque hæc simul eueniunt, hi quā-
 primum ægritudine subleuantur. qui-
 dam utique sunt, quibus magna vis pu-
 ris in pulmone procreatur: aut ex pleu-
 ritide fit permutatio, si maius bonum
 suboritur. Quòd si ad intestina aut ve-
 ficam ex lateris morbo sanies deriuata
 fit, tunc quidem continuè pulmonis vo-
 mica liberantur: sed diuturnum vlcus,
 quod demū sanescet, in latere patiun-

tur. quibus vero in pulmonem pus ir-
rumpit, nonnulli ob subitanam & co-
piosam effusionē, & reiiciendi infirmi-
tatem suffocantur. At quicumque suffo-
cationis periculū ex tumoris eruptio-
ne subterfugiunt, hi longo tēpore pul-
monis vlcere cruciantur, & in phthisi
prolabuntur. Verum ex abscessu &
phthisi pauci admodū senes liberantur,
sicut neque à pulmonia iuvenes & flo-
rentem ætatem agentes.

DE SANGVINIS EXITU
ab ore, cap. I I.

Sanguis ab ore duobus modis emit-
titur, primo, ex ipso ore, capite, & va-
sculis quæ ibi sunt. via est palatum &
fauces, ubi est gulæ & arteriæ princi-
pium. screantes vero & cum parua tus-
si, vel etiam citatiore in os sanguinem
eructant. Nam cum ab ore fertur, ne-
que screatu opus est, tum expuere di-
citur: cū vero paucissimus & gutta-
tim sanguis exit, aut etiam si copiosus
de capite, vel ab ore eruperit, nondum
reiectio

reiectio est appellanda, sed idem vel sputum, vel sanguinis eruptio, Græce hæmorrhagia dicitur: sin ab inferioribus, ascendat à pectore visceribusque ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, locisque spinæ finitimis, huiusmodi nō sputum, sed reiectio Latinè, Græcè anagoge vocitatur, ascensionis ac viæ per quam fertur, nomen habens. Signa verò vtriusque communia, exigua & pauca sunt, quātum & locus permittit, in quem reiectio & sputum cōueniunt: singulorum autem propria, magna & multa, & periculosa sunt, quibus vtrunque effusionis sanguinis speciem internosse leue est. Igitur si à capite sanguis decurrit, vbi multus est, plura maioraque aderunt: pauca minoraque, vbi raro paucusque expuitur. caput graue est, dolet: sonant aures, facies rubet, venæ distentæ sunt, vertigo infestat. Et ante hæc causa euident fuit, percussus, frigora, calores ingētes, vinum largius epotum. quippe id subito ac valde caput implet, repentēque multum sanguinis effracta vena profundit: modica

C

ebrietas rarefacta vena sanguineum sputum mouet. Interdum per nares sanguinis consuetum profluuium sistitur: ad palatum verò conuersum, reiectionis imaginem præbet. Igitur si de capite profluit, titillatio in palato gignitur: creber screatus fit: post quē sputum erumpit: inde irascuntur, tussique magnopere agitantur. Si ex palato in arteriam defluit, tum per tussim sanguinem extrudunt: idque multos falsos habuit ex profundis visceribus reiectionē fieri suspicantes. Nonnunquam & ex capite decurrit in gulam, sicque cum nausea euomitur: falsoque multis ita persuasit, ut ex gula ferri sanguinem crederent. Qui expuitur sanguis, haud ita crassus est, colore ater, leuis, æquabilis, alienæ materiæ non permixtus (screantibus enim confestim in linguā cadit) rotundus, auulsioni que obediens. Tu vero si palatū etiam introspecias, id sordidum, vlcerosum, & sæpius cruentum videbis. Huic simplex curatio breuisque suffecerit, adstringentia videlicet medicamenta palato adhibita, & ea frigida. si-

quidem calefacientia, & quæ rara faciunt corpora, & quæ dilatant, fluxum maiorem citant: eaque sit à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque, vel per venæ sectionem, vel per nares, vel per aliam difflationem euacuandum est. & hæc mature facienda sunt. nã si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursui exercitatio, eiusque loci membra suscipiendo sanguini alluescent. vlceratur autem & arteria: vnde tussis, non scretus exoritur: atque inde fit corruptionis initium. Si verò à pectore inferioribusque visceribus sanguis effluerit, reiectio Latine, Græcè anagoge nūcupatur. Vtique valde mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manauerit, aut à concaua cordis vena, sanguinem ab iecore illi suggerente, aut a magna arteria secundum dorsi spinam discurrente. nam erumpente sanguine, perinde ac si iuguletur homo ac stranguletur, mors instat celerrima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito in-

tereunt: verū tamen in suppuratione pectoris, Grece empyema dicitur, & in phthisin incidunt. minus periculi ab aspera arteria portēditur. Si gula aut vētricus sanguinem vomunt, non ita terribile est: & si valde copiosi sanguinis vomitus est, neque lōga curatio est, neque varia. Si à iecore aut liene prodeat, non facile id fit, neque continenter. nanque in ventriculum & intestina expeditius hæc viscera sanguinem propellūt: haud ita tamen, quin credendum sit, hæc eadem ad superiora, videlicet pulmonē & arteriam posse retrudere. Siquidem in febribus à liene & iecinore per narem illam sanguis erūpit, quæ è regione patienti visceri opponitur. Locos, vnde fit exitus, iam recensuimus: eorūque periculi vel mortis discrimina. Effusionis autē sanguinis tres sunt modi, vel rupta vena aliqua, vel exesa, vel rarefacta. Rumpitur quidem repente vel ictu, vel ferendo onere, aut tollendo, vel ab edito loco desiliendo, vel clamore, vel magna excandescencia, aliave id genus causa.

cum subito in arteriam copiosus sanguis effunditur. Si ab erosa parte, hominem interrogare opus est, num prius tussierit, difficulter spirauerit, nausea vomitusve antea infestauerit. in his enim diuturnis affectibus copiosa & acri fluxione persuerate vascula exeduntur. Vbi igitur detrita & attenuata, ad extremum consumpta fuerint ambientes membranulae, hac atque illac sanguine perfluunt. Atrarefactio citra rupturam est: proinde non subitanea, neque cum multi, aut crassi sanguinis exitu. nam cum rarescunt venarum corpora, tenuis pars excernitur. Quod si multus in aliquo inani spacio sanguis collectus rursus emittitur, crassior seipso redditur: non tamen multo crassior neque ater, quale concrementum aut grummus est: sed copiosior, ut potest qui vnum in locum prius confluxerit. Id genus autem repentini exitus plerumque foeminis, quibus menstrua non respondent, euenire solet, idque singulis mensibus euenit, iisdemque menstruae purgationis circuitibus apparet.

necnon iisdem statis cessationis diebus
supprimitur. ac nisi mulieri laboranti
succurratur, per multos circuitus san-
guinis emissio reuertetur. Nempe qui-
busdam vasa rupta sunt, sed multitudi-
ne reiectio euariat. Et ab arteria, an à
vena feratur, interest. quoniam ater est
sanguis, crassus, & facile spissescens, qui
à vena mittitur: præterea minus disci-
minis affert, celeriusque compescitur.
Ab arteria, flauus tenuisque prolabitur,
haud ita cogitur, citius hominem peri-
mit, & maiori negotio supprimitur. nã
arteriæ agitatio, sanguinis fluorem mo-
uet, vulnusque frequenti concussione
dehiscit. Erosionis autem curatio ma-
gnam diligentiam postulat, cum sit lon-
ga, difficilis, & periculosa. Etenim par-
te membri deficiente, ad solidationem
vltus non ducitur. vltus enim, nõ vul-
nus efficitur. Rupturæ verò facilior so-
lidatio, quia vulneris oræ se cõtingunt:
& hæc secundo periculi ordine consistit.
Minimus in rarefactione, metus subest.
spõte enim sanguis cõquiescit, & adstri-
ctio refrigeratioque in medendo satis

est. Cæterum & sedes vnde sanguis proficiscitur, obseruandę sunt. siquidena multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioque diuersa. A gula igitur haud ita sæpe per rarefactionē solet sanguis effluere, cū ob cibos potionēsque refrigeratio & adstrictio eius partes cōdēset. Quinetiam rosiones haud frequenter fiunt, ac minùs quàm rarefactio, gulam infestant. quippe fluxiones erodentes non multum temporis in ea subsistunt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. Frequentius gulę incidit ruptio: itaque si interdum rupta est, non tam magnę, sicuti à pectore, sanguinis profusiones fiunt. in causa est venularum quę ibi sunt, arteriarumque tenuitas. sanguis verò exiens non magnopere nigricat, subflauus est, non exactè læuorem habet, aut saliuę permixtus est. cū nausea & vomitu reiicitur. leuis tussicula citatur, modò humidum quippiam mouēs, modò arida. id euenit, quoniam gulę affectum arteria quoque participat, secundum illam extenta & adhærescens.

morsus vel adstrictio vlcis inter deuorandum percipitur: idque praesertim, si bene frigida, aut calida, aut acerba sint quae deglutias. nonnullos autem & gulae ipsius dolor inuadit, ad interscapulum usque interdum pertinens. vomunt pituitosa. nonnunquam si morbus producit & inualefcit, cibum reiiciunt, cibos summopere fastidiunt. febres haud ita multum continuae, sed erraticae sunt. E ventriculo niger concretusque sanguis euomitur, etiam si ab arteria fluxerit: si a vena, multo nigrior, compactiorque est. nausea multa adest: pituitosus, biliosusque vomitus: si prius homo comedit, cum cibus mixtus sanguis eiicitur. in eodem enim loco cibus sanguisque colligitur. ructus crebri fiunt, & virus olentes. Quod si multa materia collecta est, angor animi vertigoque sequitur: cum materiam vomuerunt, subleuantur. resoluuntur tamen, penitus exstuant, assidueque dolet ventriculus. Ab aspera autem arteria paucus sanguis, vehementer flauus, per tussimque expellitur: qui nisi expellitur, continens

DE ACUTIS LIB. II. 41

tussis inhæret. sensus verò & dolor in gutture est, paulum suprâ aut infrâ. vox rauca & obscura fit. Si à pulmone, repētē vberiorq; sanguis emanat, idque magis, si erosio in causa sit, tussis permolesta est: sanguis verò exacte flauus, spumans, rotundus sic vt pars eiecta à parte distincta sit. Cæterum & in communi vase corruptio eorum quæ de pectore exeunt, alia est: cōparatione autem, permixta discernas: alioqui pectoris partes specie carnosas pulmonis esse partes censueris. verùm pectoris grauitas, indolentia, ruborque in facie multò magis in pulmonis vitio reperitur. Si in pectore noxa sit, in parte priori secundum os pectorale quod vocant, dolor laceratam partem ostendit. ingens tussis adest, vix, aliquid extrudens: sanguis nō multum flauus est, modicè crassus spuma carēs. Quòd si & pulmoni in transitu noxâ impertiat, aliquid etiam spumæ consequitur. quandoquidem ex pectore in arteriam per pulmonem iter datur. Si à membrana costas vestiente, per tussim quidē sanguis funditur: sed

niger, lævis, tetri odoris virosique, qualis ex putridis rebus exhalat. dolor succingentis membranae acutus vexat. multi ex his cum febre, ut pleuritici solent, intereunt. Tempus anni humidum calidumque sanguinis emissionem maxime procreat. tale est humidum & calidum ver: secundo loco æstas, autumnus minus, hyems minimè. Aestate maxime moriuntur ob sanguinis effluuium: quo tempore haud ita magnæ phlegmonæ oriuntur: vere secundò phlegmonis & vrentibus febribus consumuntur: autumno plurimum tabes, quas Græci phthoas dicunt, eueniunt. Ut semel autem dictum sit, omnem sanguinis reiectionem, quantumvis modicam, quanvis iamrupta vasa coierint, comitatur moeror, diffidètia, vitæ desperatio. quis enim est adeo firmo & constanti animo, qui se iugulationi simile quiddam passum esse conspiciens, non futuram mortem vereatur & perhorrescat? graviora namque animalia & robustiora, quales tauri sunt, sanguinis profusione celerrimè perduntur. Verum hoc haud magnope-

DE ACUTIS LIB. II. 43

re mirandum est: illud summa admiratione dignum, quod in sola ex pulmone reiectione, quæ omnium sæuissima est, homines animum non despondent, cum tamen in extremo discrimine versentur. Pulmonis indolentiam huiusce rei causam ego statuo. quilibet enim dolor, quauis exiguus, interitus metum iniicit, & plerumque terribior est quam periculofior: contra indolentia in plurimis vel magnis morbis à morte securitatem præstat, damnosiorque est quam terribior.

DE SYNCOPA, cap. III.

Recte planè medicus & vulgus, rectè, inquam, huic affectui nomē indiderunt. OCyphon, cuius mali est nomen? Ecquid enim maius, ecquid celerius synccpæ facultate? ecquidnam aliud nomen ad hanc rem appellandam significantius? quid verò corde ad mortem vitamve potentius? Neque syncopam cordis ægritudinē esse, aut vitalis in eo potestatis detrimentum, non cre

dendum est. tanta est mortis celeritas, & talis morbi species. Quippe is affectus vinculorum potestatis vitam fuentis dissolutio est, hominis constitutioni aduersarius. hanc enim tenaciter corripuens nō dimittit, sed dissoluit ac dissipat. Neque id magnum est miraculum. nam & alij affectus quorundam membrorum quibus inhærescunt, indeque accenduntur, proprii sunt & periculosi. Inguinū quidem tumores pestiferi & permaligni (bubonas Græci nuncupāt) iecoris soboles sunt, nullaque alia ex parte prodeunt. Tetanus autem neruorum labes est: comitialis morbus caput obsidet. Pari igitur ratione & syncopa cordis & vitæ ægritudo est. Quicumque verò stomachi affectum syncopam esse opinantur, quoniam cibus vinóque, in nonnullis & frigida vires resectæ sunt, & ægritudo sublata, iidem mihi videntur capillorū capitis, & cutis affectum esse phrenitin suspicari: quoniam capillorum detensione & cutis irrigatione phrenitici releuantur. Verum cordi stomachus vi-

cinus perniciosus est: vnde in cor tam noxia quàm vtilia deriuantur. Etenim per pulmonem etiam, vt spiret, acrem cor accersit: veruntamen pulmo haud ex æquo spirandi facultatis particeps est: cū facultates non in instrumentis, sed vbi est vitæ fons atque roboris, statuuntur. At stomachus, vitæ neq; principium neque sedes est: aliquis tamen ab eius imbecillitate lædi potest. Nam & cibicordi nocētes nō stomacho offi- ciunt, sed cordi per eum noxam infligunt. Siquidē & ab illis morientes cordis affecti notas representant, arteriarū motus paruos debilesque, cordis concussionem cum vehementi palpitatione, vertiginem, animi deliquium, torporē membrorū, resolutionēque, copiosum sudorē, qui supprimi nequeat, refrigerationem in toto corpore, sensus vocisque priuationem. dicendumne est hac stomachum perpeti? Sed quænam ei propria? Nausea, vomitus, cibi fastidium, singultus, eructatio simplex, vel acida. Illi præterea, quibus cor laborat, sensus aciem exquisitiorem ha-

bent, vt videant, vt exaudiāt plus quàm antea. mente etiam sunt firmiore, & animo puriore. proinde non tantū præsentia declarant, verum etiam futura verissima diuinatione prædicūt. Nūme igitur & hæ stomachi potestates sunt? Hercule minime, sed cordis, vbi & anima & ei⁹ natura inhabitat, ad quod & virtutum ibi sitarum calamitas pertinet. Huius verò morbi est tenoris naturæ destructio, auctore frigido humidoque. quippe hoc oppres*si* intus & incute refrigescunt, non sitiunt: frigidum spirant, quanuis magnis ac perurentibus febribus, vnde ipsa syncopa dependet, affligantur. Natura enim robusta & probe temperata omnia superat, omnibus dominatur, ac per humorē & spiritum & solida, horūque omnium cōuenientem ordinem & modum hominis vitā administrat. Quod si naturæ nexus, id est tenor, dissolutus sit, tūc affectus oritur, cuius prægrediens causa est comburēs febris, quæ Græcè cap*si* sus dicitur. ea verò huiusmodi est.

IGnis passim & acer & tenuis est: sed
intus maxime. Spiritus tanquam ab
igne, calidus: aeris vehemens attractio,
frigidi cupiditas, lingua arida, in labiis
& cute squallor, algēt extrema, lotium
quàm biliosissimū, insomnietas, arte-
riarum motus crebri, parui, imbecilli:
oculi puri, lucētes, subrubri: facies bene
colorata: si morbus vltorius crescit, om-
nia maiora & seuiora fiūt. arteriæ mi-
nimis motibus & creberrimis agitan-
tur. ignis aridissimus & acerrimus.
mens delirat, omnia ignorat, siticulosi
fiunt. omnia frigida attrectare cupiūt,
parietem, vestem pauimentum, humo-
rem. manus frigēt, sed palmæ perquàm
calidæ: vngues liuent, spiratio crebra
est, roscidus humor circa frontem & iu-
gula. Cū ad summam ariditatem ca-
lorēque corporis natura peruenerit,
tum calidum in frigidum, squallor in
imbrem conuertitur. Rerum nāque ad
maximam molem incrementa in con-

trarium statum prolabuntur. Vbi ergo naturę nexus soluti fuerint, ea syncopa est. tunc sudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto cōpescitur. Spiratio frigida est. vapor è naribus multus exhalat. Siti non vexatur. cætera enim exaruerunt. quinetiam alia instrumenta sitiunt, os & gula. vrina tenuis & aquea redditur. Aluus plurimum adstricta est: nonnūquam tamen pauca quedam biliosa descendūt. copiosa & aliena humiditas redundat. ossa quoque tabescentia diffluunt: & vndique, vt in flumine, ad exteriora omnia dilabuntur. animus stabilis & cōstās est: sensus omnis purus & integer, subtile ingenium, mens vaticinando idonea. Primū quidem seipso de vita migraturos præsentiunt, deinde præsentibus futura denūciant. Nonnulli verò interdum eorum dictis fidem non habendam putant, sed dictorum euentus homines in eorum admirationem concitat. Aliqui præterea ex his cum quibusdam vita defunctis sermonem habent: fortasse quidem ipsi soli præsens acumine & puritate

cos

DE ACVTIS LIB. II. 49

eos adesse cernentes: aut forte ipsorum animo viros cū quibus versaturi sunt, prænoscere, atque enarrante. Quippe antea in lutulentis humoribus & caligine demersus erat: quos vbi morbus exhaustit, & ab oculis tenebras deterfit, quæ in aere fiunt prædicant, exutoque sordibus animo veracissimi vates efficiuntur. Sed quorum succi & ingenium adeo extenuati sunt, hi non diu admodum solent esse superstites, cum eorum vitalis potentia iam in aerem cesserit atque abierit.

DE CHOLERA, cap. V.

CHolera est materiæ à toto corpore in gulam, ventriculum & intestina retro fluens motio, vitiū acutissimū. supra enim per vomitum erumpunt, quæ in ore ventriculi & gula congesta fuerant. infra deiciuntur humores in ventriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt: quæ anus effundit, stercorea, liquida, terræque odoris sentiuntur. siquidem longa cru-

D

ditas id malum excitauit. Quòd si per clysterem eluantur, primo pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, de lore vacās: postea verò tensiones in ore ventriculi & gula, tormina in ventre nascuntur. Si magis sauiat morbus, & tormina augeantur, anima deficit, membra resoluuntur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumultu nausea & vomit⁹ inuadit, tum sincere flaua bilis expellitur: deiectiones quoque similes sunt: nerui tenduntur, tibiārum brachiorūque musculi conuelluntur, digiti incuruantur: vertigo oboritur, singultiunt: ungues liuent, algent extrema, totum corpus rigore concutitur. Si malū ad vltimum venit, tum verò aegrotus sudore perfunditur: bilis atra supra infraque prorumpit. cōuulsione impedita vesica, lotium cohibetur: quod tamē, cū in intestina humores deriuentur, abundare non potest: voce priuantur, arteriarum pulsus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in syncopa proposuimus. co-

DE ACVTIS LIB. II. §I

natus ad vomendum perpetui ac inanes fiunt. inclinatio ad deiiciendū prōpta, quam tinesmon Græci vocant. sicca tamen, nihilque succi egerēs. mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum & inanem vomitum. Id genus maxime ætate grassari consuevit: secundò per autumnū, minus vere, hyberno tempore minime. Inter ætates autē iuuentas, & ea quæ robustior est, hoc ferè corripuntur: senectas rarissimè: pueri magis quàm senes, sed non mortiferè.

DE ILEO GRAECE

vocato, Latine voluulo, cap. VI.

PHlegmone in intestinis gignitur, perniciosum dolorē mouens. quippe innumeris terminibus acerbissimis necantur. In hisce & frigidus flatus & lētus colligitur, nec infra, nec supra facile penetrans. Commeratur autem diu, pèrque superiorum intestinorū angustos anfractus reuoluitur. vnde & affectus ilei Græce, Latine voluuli nomen

D 2

accepit. Quòd si ad tormina compres-
sio & remollitio intestinorum accesserit, id vero iam chordapsus est: quod no-
men vltima parte elixationem remol-
litionēue significat: chorde autem inte-
stinorum vocabulū est. lactes enim epi-
chordida Græci veteres nominarūt, ner-
uos scilicet interfacentes, & vascula, &
membranas, quæ intestinorum stabili-
menta & fulcimina sunt. Voluuli cau-
sa est, perpetua ciborum multorum, di-
uersorum, inusitatorūque corruptio,
& alia super aliam cruditas: præcipue
ab esu ciborum qui voluulum excitare
conſueuerunt: quale est ſæpię attramen-
tum in ferculis ſumptum. idem existi-
mandum de plaga est, de frigore, de fri-
gidæ potionē: ſi, dū quis ſudat, eam lar-
gè abundēque ingurgitauerit. Ad hæc
his voluulus accidit, quibus inteſtinum
cum ſtercore in ſcrotum procidit, neq;
in ventrē repulſum, ſed per vim retentū
fuit: his inferiora inteſtina phlegmone
vexari ſolita ſunt. Pueros hic affectus
crebro male habet: vtpote quos ſæpe
cruditas infeſtat. hi tamen ſæpius etiam

sanescunt, cum ob consuetudinem, tum ob humiditatem intestinorum. lubrica enim sunt. Senes raro afficiuntur, sed multo perniciosius. Aestas magis quam ver huius mali referta est: autumnus quæ hyems: æstas vtrunque superat. Multi quidem vi torminū repente intereunt: aliis intestinū suppurat, deinde nigricans, tunc & putrefactum excidit, atque ita deficiunt. Mediocre[m] voluulū hæc symptomata comitantur, dolor oberans, in stomacho humiditas superans, exolutio, mollitia, ructus inanes, nihil proficientes: aluus flatibus perstreperens, qui ad podicem vsque properant, sed ibi exitus intercluditur. Si autem ex toto voluulus occupet, omnia sursum petūt, flatus, pituita, bilis: hæcque vomitu prodeunt. fiunt perpallidi, frigēt toto corpore, acerbo dolore cruciantur, male spirant, sibi iungunt. Quibus verò iam iam mors instat, gelidus sudor emanat, vrina difficulter exit: anus tam arcte clausus est, vt neque vel tenuem acum possis adigere: sterces per os redditur, vox aboletur: arteriæ raro inter initia &

parum micant: instante morte minimè,
creberrimè, tandem micare desinunt.
Hæc sunt quæ tenuibus intestinis affe-
ctis incidunt. Verum & in pleniore
intestino, quod Græci colon vocant,
iidem affectus oriuntur, eadèmq; sym-
ptomata eandem formam retinentia.
Sed nonnulli, quibus colon suppurat,
huiusce morbi discriminè effugiūt. Cau-
sa est huiusmodi affectus carnosæ inte-
stini crassitudo. Dolor autem in graci-
libus quidem intestinis tenuis est & acu-
tus: in pleniore verò intestino est re-
dundans humiditas, & incumbens gra-
uitas. dolorque modò ad costas vsque
superiores ascendit, quando & speciem
lateralis morbi præ se fert, siquidem &
isti febricitant: modò sub spurias costas
in dextram aut in læuam partem de-
scendit sic vt iecur aut lienis dolere vi-
deantur: item & ilia nonnunquam do-
lore torquentur. Colon nanque præ-
grāde est, & quoquo versum se circum-
uoluens. Quidam sunt etiam quibus &
in sacro osse dolor inhaerescit, & in fe-
moribus, & illis in locis quibus testes

DE ACVTIS LIB. II. 55

appenduntur, Græci cremasteras appellant. Qui hoc genere tentantur, vomitione plerunque inani laborant. quòd si quid reiecerint, id est subtile, biliosum, olei simile. In hoc malo periculum tanto leuius est, quanto laxum intestinum tenuibus corpulentius, pinguius, & noxæ tolerantius est.

DE ACVTIS IECORIS affectibus, cap. VII.

Quibus iecur male habet, hi non celerius quàm qui corde agrotant, sed maiore cruciatu perimuntur. maxima enim iecoris pars sanguinis cōcrementum est. Si in huius autem visceris portis aliqua incidat causa mortifera, æque ac si ex corde laborarent, celeriter cōsumuntur. Ratio in promptu est, quia videlicet hæ partes mēbranis, tonis gracilibus & magni ad vitam momenti, grandioribúsque venis cōtexuntur. præterea, vt sapientum quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animæ domicilium est. Sanguinis vtique pro-

D 4

fluvia è iecore omnium maxima fiunt: neque ab re. venarum enim radicatio iecur est. Itaque in ipso magna vomica haud ita frequenter, neque in particulis magis præcipuis oritur. homo enim vita excedens præuenit. At exiguae frequentius eueniunt. inde fit vt mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti crucientur. Iplius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neque dilatio: atque hinc ad cor & ad viscera infra septum sanguis diffunditur. At si qua magna iniuria, vtputa verbere, longa ciborum multorum, vitiosorumque corruptione, ebrietate, vehementi refrigeratione, phlegmone in portis iecoris excitatur, tunc ægrotus celerrime iugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. venarum motus torpent. Doloris species varia & diuersæ sunt. nonnunquam enim dextra in parte defigitur, adeo vt acutum telum adactum esse videatur: interdum torminibus similis est: rursus verò interdum dolor cum summa grauitate con-

iungitur: atque inter dolendum virium debilitas vocisq̃ue casus incidit: transuersum septum, & interna costarum tunica inferius detrahuntur. quoniam inde iecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad iugulum è regione oppositum vehemens dolor peruenit. Tussicula quædã imperfecta, seu potius tantum ad tussim inclinatio est. si quando verò tussiunt, nihil reddunt. vitiose spirant. neque enim pulmoni transuersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum morem gerens. paulum aeris adducunt, plus expirant. colore ex atro viridique permixto infecti sunt, plumbea scilicet specie. cibos odierunt. quòd si quid sumpserint, eis inflantur præcordia. ructus biliosi, acidi, graue olentes exeunt, nauseant, vomere frustra conantur. venter solutus multa biliosa excernit, viscida pauca: sed perpetuò augescunt mala. mens haud ita multum delirat: torpida, suspensa, & attonita est. magna est in corpore segnities: extrema frigent, tremor adest, horrores, singultus inanis, conuulsioni simi-

lis, morbus regius: pura bilis, totumque corpus bilioso colore suffunditur. Quin morbus regius ante septimum diem si apparuerit, plurimos sustulit. Quibus autem vel sanguinis profusio, vel per aluum multorum biliosorum exturbatio, vel vrina syncera plurima effluens mortem depulit, post tres septimanas iecur his suppurat. Quod si multum temporis citra abscessum praetereat, in hydropem ineuitabilem terminatur. Hi siticulosi sunt, parum tamen bibunt. eorum corpus squallet, pinguedine carens. appetunt acida, sed gustatus sapor non percipit. Autumnus hoc malum fert, multorum variorumque fructuum esum sequente cruditate. Inter aetates florens ei magis obnoxia est.

DE VENAE CONCAVAE

acuto morbo, cap. VIII.

AB iecoris portis inter eius extrema magna vena ingreditur: quae semper in tenues pluresque dum scinditur, denique in tenuissimas visumque laten-

DE ACUTIS LIB. II. 39

tes toto iecore dispergitur. Istarū sum-
mis osculis aliæ venarum extremitates
cominittuntur: quæ ex gracilibus & plu-
ribus maiores amplitudine, sed nume-
ro pauciores constituuntur. demum in
medio iecore in venam vnicam gran-
dem coalescunt. Inde hæc in duas par-
titur, quæ iecoris extrema petunt. Ha-
rum altera superius primam fibram pe-
netrans, in eius cōuexa egreditur: mox
transuersum septum perforans, in cor
inferitur. hæc vena concava nomina-
tur. Altera vero quintam fibram, quæ
inferius iacet, traiciens vsque in ieco-
ris gibba ad spinam peruenit: & eo lo-
co ad coxendices vsque porrigitur. Ea
quoque eodem nomine concava nun-
cupatur: quoniam vna & eadem vena
est ab initio de iecore exoriens. Si quis
enim aliquid de superiore vena caua
cordi infixæ in eam quæ iuxta spinam
protenditur, aut à spina per iecur ad
cor velit impellere, eundem descensum
ascensumq; inueniet. Hæc igitur vena,
vt arbitror, vniuersa egritudines & acu-
tas & validas patitur. nam tota vna est

atque continua. à nōnullis autem medicis ea pars duntaxat quæ secundum dorsum discurrit, ægrotare creditur. quoniam eius quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. intra pectus enim rei nulli adhærens, sed in pectore subleuata protenditur, donec transversum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc venam corripit, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena cedmata oriūtur, (sunt autem cedmata diuturni affectus ex defluxu materiæ prouenientes) quando sanguis copiosus erumpēs citissime vitam delet: per superiora quidem, per pulmones & arteriam effluens, si in pectore fiet effractio: si iuxta principium, in imū ventrem descendens in intestinis continetur, atque adeo intestina replentur. cū prius quàm deiectus sanguis in conspectū detur, homines intereunt, & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venam phlegmone, quæ & ipsa si magna sit, celeriter hominē tollit. ignis enim acer mordāxq; in ambabus cauitatibus inclusus accenditur, paucisque

DE ACUTIS LIB. II. 61

duntaxat foris apparet, ut tãgenti flamma tenuis esse videatur: æger verò sese comburi existimat. pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi. frigus adest extremorũ, sitis aspera, oris ficcitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidũ est: præcordia dura sunt atque reuulsa. dolor in dextra parte maior, & cum eo palpitatio in lōgitudinem ad ilia usque perueniens. quibusdam & arteria secũdum dorsum inflammatur: quod pulsatio in alteris præcordiis manifestat. nã & ipsa venæ cauæ morborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, utpotè ea quæ in omne corpus diducitur, nihil leuaminis afferente, neque cum emolliẽte. cutis autem sic affectorum squallida, rugosa atque aspera est: sed in partibus prominentibus atque ossibus, ut in cubitis, genibus, digitorũque articulis magis talis conspicitur. somni tumultuosi fiunt. alius quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. lotium acre mordaxque est. mens utique his constat, sed quadam

segnitie torpet, & corpus tabe cōsumitur. tum quotquot hunc habitum viderunt, cum causi, id est ardoris speciem appellarunt. quandoquidem quæ adsunt, sub ardoris genere collocantur.

Per autumnū hæc labes exoritur, cū ferum quiddam & immane sapit. Viros ac iuvenes occupat, quibus mala viuendi ratio laborēsque tenuem corporis habitum compararūt. Decimoquarto die hi plerunque moriuntur: quibus morbus diutius trahitur, duplo lōgiori tempore pereunt. Quotcunque autē aut ab initio puīllam phlegmonem habēt, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem euadunt, sed nondum morbo liberantur. Hi longo sanē tempore causo laborant, verūm omnia periculosa iam desinūt, dolores, præcordiorū distentiones, & pulsuum malitia, & mētis ignauia. adhuc tamē fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes: simulque & ardor, & fitis, & linguæ orisque ficitas ægrum discruciant. multum diūque trahentes spirant, & subito totum aerem vna spiratione refrigerandi causa ad-

DE ACVTIS LIB. H. 63

ducunt. Verum si frigidam quamplurimam affatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur. postmodum ipsi sitis accenditur: rursúmque vberime aquá ingurgitant. & hec est mali successio & reciprocatio. At egregius medicus, frigidam liberaliter citra noxam propinare potest, vt in aliis ardoribus assolet: sed longe tutius ardore à vena caua oriente laborantibus eam concesserit. Quòd si ventriculus aut vesica potam aquam expellant, neque vomitione opus est: sin id facere nequeant, à multa frigida epota multum vomendum est. homo enim disrumpetur, si tãto bibito humore nihil aut per sudores, aut per vrinam, aut per vëtreffunderet.

DE RENVM ACVTIS
affectibus, cap. IX.

Renes quantum ad corporis speciem attinet, haud ita multū periculis patient, tametsi in aliquod acutum vitium incidant. glandulosa enim ipsorum na-

tura est. ad mortem verò inferendam bene habiles sunt: ipsorum enim actio peropportuna est, vrinę videlicet à sanguine secretio, eiusdémque expulsio. sed eam cohibet aut calculus, aut ingenta phlegmone, aut sanguineum concretum, aut id genus: quando quidem ex cōsensu affectionis ob formam corporis prouenientis nulla creatur offensio. Vrinę autē interclusio omnia facina & acerba facit, ignem acrem & fastidium inferentem, dolorem grauem secundum lumbos in dorso, partium distentionem, sed magis circa præcordia. Suppressio autem lotij non ex toto fit, sed stillatim quidem meiunt, multum verò effundere cupiunt. redundantiam enim sentiūt. Quòd si & acre mordaxque lotium inest, frigent, tremunt, conuelluntur, distenduntur præcordia & replentur. Hæc morbi forma perceptioque doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneque prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac sēgnes: si malū plus vrgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati. somni

DE ACVTIS LIB. II. 65

somni tenues, dolore vexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, profiliunt: postea in soporem tanquã lassitudine oppressi delabuntur. mentis alienatio haud ita magna est: nugãtur, facies liuet. At si quando rursus meiendi auuiditas redeat, cù distentionibus magnisq; doloribus modicum quiddã, idque stillatim eiiciunt. tum paulum cruciatibus leuãtur, postmodum in eadem relabuntur. Inter hos illi celerrime pereunt, qui nihil prorsus emittunt. Quicunq; vero non moriuntur (plures enim liberantur) hi aut calculo in vesicam per vrinæ semitas delapso, aut phlegmone suppurante, paulatimve per distillationem exhalante discrimen euadunt. quanquam enim paulatim & auarè effundatur vrina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus cõtabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusque labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni verò tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in vena caua laborante fe-

E

rebant. Nonnūquam è renibus sanguis, multus subitaneus erupit, multisq; diebus continenter effluxit. verum nemo ex huiusmodi profluuiο moritur: sed phlegmones ratione, quæ simul cū profluuiο nascitur, & sanguinem coerces. plerunque autem ex retentione, quam ingens phlegmone facit, moriuntur.

DE ACUTIS IN VESICA
ægritudinibus,
cap. X.

Vesica difficiles in acutis morbis dolores patitur: etsi ab aliis vitium participet. difficiliōres magisq; mortiferos, si per se laborare incēperit: quandoquidem omni corpori & nervis & menti labem communicare valentissimè potest. Quippe vesica nervus frigidus albusque est, & ab innato calido quamlongissimè, quamproximè vero externo frigori posita. Nam in imo sacro ventre ad aures thoracis sita est: nobili quoque munere fungitur, vrinę videlicet emissionē. Hac porro si tan-

tum calculis, aut sanguinis grūmis, aut qua alia propria, peregrināve calamitate interclusa fuerit, perniciosum est. In mulieribus enim iplis & vteri phlegmonas comprimit, in viris autem extremum rectū prēlongūque intestinum. In plerisque verò ob inuolūtariam præverecundia retentionem in cœtibus hominum, aut in conuiuuiis repleta distenditur, constringerēque non valens nihil amplius excernit. Igitur vbi vrina supprimitur, superiores quoque partes, renes videlicet, replentur: vrinæ ductus, (Græci vreteras appellant) distēduntur. ilia dolor pōderosus infestat: nervi cōuelluntur: tremunt, horrent, desipiunt. Verum si ad hæc & vlcus accedat & inflammatio, multa sanè damna eueniūt: sed mors ab vlceribus sanè quàm celerima inuadit. Cæterū de vlceribus abscessu, suppuratione, & id genus aliis, quæcunque non acutissima sunt, in libro de Lōginquis morbis tractabitur. Quæcunque verò peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriūse hominē perimunt, qualis phleg

mone est, aut grūmi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus, de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inciderit, vrina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum ventrem occupat. vesica turgēt: decimo die luteus sudor exit: pituita vomitur primò, deinde bilis: vniuersum corpus friget, sed pedes vehementius. Si malum vires maiores acquirat, tum febres cum singultu hominem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est, sitiunt: animo ancipites sunt, mens nō constat: nerui contrahuntur. Medicamentis præterea venenosis, & cantharidibus, aut bupreste & pneumatibus vesica deurit: & tota aliis maiorem vim patitur, ac prorsus in peiorem statum delabitur: neque longa mortis mora interponitur. Nonnunquā & sanguinem vesica effundit. Fluus autem ac tenuis vesicæ sanguis est. Sed perraro hac de causa homines pereunt, quauis haud facile sanguis supprimitur. Grummi verò & phlegmonæ mi-

DE ACVTIS LIB. II: 69

nantur interitum. refrigeratio enim & extinctio caloris ingenti sequitur, quæ necrosis Græce dicitur, & gangræna, & quæ eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit. Hæc vitia hyeme & autumnò grassantur. In ætate virili, magis etiam in senectâ vigent. Reliqua anni tempora & ætates neque assidue hos morbos ferunt, minimè que mortiferi sunt. Pueri omnium maxime his calamitatibus vacant.

DE VVLVAE STRANGULATU,
cap. XI.

IN mediis ilibus mulierum vulua posita est, muliebri viscus animalis ferme naturam adeptum. Siquidem per se huc atq; illuc versus ilia mouetur: quin etiam ad superiora è regione pectoris cartilaginem subit: in latera quoque in dextram videlicet, aut laeuam partem, aut ad iecur, aliâve intestina mouetur: & ad inferiora natura procliuior est. vtque paucis absoluâ, penitus errabunda est, & iucundis odoribus delectatur.

ad ipsosque se recipit: contra foede olen-
tibus contristatur, & ab ipsis longius se
proripit. ac prorsus est in homine vul-
ua perinde atque in animali quoddam
animal. Hæc itaque si repente superio-
ra petierit, ac diutius ibi commoretur,
visceribusque violenter incumbat, in-
terdum homo veluti comitali morbo
correpta citra neruorum distentiones
strangulatur. angustis nanque iecur,
transuersum septum, pulmones, cor ce-
lenter opprimuntur. Qua de causa spi-
ritus priuatio, imbecillitasque adesse vi-
dentur. Præterea & venæ somniferæ (ca-
rotidas Græci vocant) cordis vitium
participantes affliguntur: unde capitis
granitates & sensuum abolitio cum no-
no quodam sopore adueniunt. Incidit
etiam ipsis aliud vitium proxime dicto
non absumile: in quo spiritus & vox au-
feruntur: sed à vulua nō prouenit. quip-
pe & viros infestat instar morbi, quem
catochon nominant. At mulieribus à
vulua malè habentibus tetra odora-
menta naribus subiecta, iucunda verò
naturalibus apposita opitulantur. alte-

ro autem affectu laborantibus hæc frustra adhibentur: nihilque opis afferunt. Præterea mēbra in vuluæ morbo agitantur, in altero affectu quiescunt. Amplius tremores spontini, & non spontini, sed ex ambrothriæi subiectione excitantur. vuluæ refrigerationes vehementes, copiosæ sanguinis profusionis retentio, & id genus alia in causa sunt. Itaq; si in superiora subeunte vulua vexari mulier incœperit, ad obeūda negotia pigrior redditur, exoluitur, infirmatur, genua labant, vertigo infestat, extrema debilitantur, caput dolet grauescitque. in venis ab utroq; nasi latere iacentibus dolorem mulier percipit: quod si ceciderit, stomacho mordetur. iuxta præcordia ilia, vbi vuluæ domicilium est, inania sunt. motus arteriarū intermittunt, ordine carent, deficiunt. spiritus magnopere angitur, vox intercipitur, sentiēdi facultas impeditur. spiratio ignota obscuraque est, celerrima necopinatò mors aduenit. nihil enim adest quod mortē instare significet. color nanque viuidus est, ac multo post

mortem tēpore, magis rubent, oculi parū admodum extantes fulgent, haud ita multū intenti, neque tamē valde remissi & conuiuētes. Ceterū si prius quā malum ad extremum venerit, aliquando vulua in sedem propriam migret, à strangulatione liberantur: quando alius submurmurat, humiditas ad est locorum muliebrium, spiritus asperior manifestiorque redditur. nequaquā tamen ab affectu excitantur, aut subleuantur. immo quā celerrime interitus aduenit. nam facilē superiora vulua petit, facilē quoque inde recedit. Quippe vulua suapte natura superfluitat: membranæ verò eam sustinentes humidae sunt: humidus est & locus, vbi reconditur. Amplius fuga & appetentia tristiū iucundorūque mouetur: quocirca labascit facile, ac veluti arboris ramus huc & illuc, susque deque impellitur. Propterea & iuuenes foemine id vitij partitūtur, seniores immunes sunt. Quibus enim ætas, & vita, & mens vaga magis & erratica est, his vulua quoque errabunda instabilisque sit necesse est. Quibus

DE ACUTIS LIB. II. 73

verò firma ac stabilis ætas, & vita, & mens fuerit, his & vulua similiter afficitur. Hæc utique à vulua proueniens ægritudo, strangulatus videlicet, mulieribus duntaxat infesta esse potest. Veruntamen cōmunes quoque viris ægritudines in vulua oriri consueverunt, phlegmone videlicet, & sanguinis profusio. communes etiam sunt quæ comitantur notæ: utpotè febres, pulsus abolitio, refrigeratio, vocis amissio. In sanguinis autem profusione & maturius mors ingruit, quemadmodū cū quis animal iugulat.

DE SATYRIASI, cap. XII.

Satyri Dionysio sacri, qui pictura, quique statuis exprimuntur, arrecto pene figuratur. quod diuinæ rei signum est. Est verò & affectus species, qui laborantis penem excitat erigitque: atque ob Dei figuræ similitudinē satyriasis nuncupatur. Est autem inexplibilis coeundi appetitus. Verum neque si ad veneris opus accedant, quicquam iuuantur: ne-

que multo assiduóque concubitu sedatur arrectio. Conuulsiones autem omnium neruorum fiunt, & tendonũ distentio, & inguinum, partisque eius quę inter inguina & fœmen est, plechada Græci nominant: genitalium præterea inflāmatio & dolor. in facie rubor inest, & vapor quidam roscide humiditatis similis. porrò ipsi ægri sese incuruant & comprimunt: quiescunt tristes, demissi, utpotè calamitatem suam grauatim ferentes. Quòd si hominis verecūdiam id malum superet, turpiter admodũ lingua intemperantes efficiuntur: intemperantes quoque in aluo exoneranda, in venerem lasciuiantes, mentēque indecenter titubantes. nam se continere nequeunt: siti laborāt, pituitam largius euomūt: quoniam labris spuma, quę admodum hircis in libidinem ruentibus, infidet. quinetiam haud absimilis odor est. lotium post longam retentionem effunditur album, crassum, geniturae simile. aluus resoluitur, costæ & axillæ sponte pruriunt ac titillantur. conuelluntur: à cibis abhorrent: sed cum eos

assumunt, rapaciter assumunt: conturbantur. Sin ad interitum ægritudo spectat, inflantur, ventérque in tumorem effertur tendones & lacerti omnes contenduntur, ægrè admodum corpus mouetur, membra contrahuntur, arteriæ paruo motu, debili, inordinatòq; agitantur. Hæc omnia quandoque discutiuntur, si alius perturbata multaspiruitosas biliosasque humiditates eiecerit: easdem quoque vomitus non absque discrimine effuderit. Nempe medela non vacat discrimine: ea per somnum profundum longissimùmque præstatur. Si quid refrigatio & resolutio stupor:que neruorum multus somnus est: stupor verò ac refrigeratio satyriæ in medicatur. Id morbi genus vere potissimum atque æstate sæuire consuevit.

Inter ætates autem adulescentia iuuentúsque ei maximè patet: præcipueque illi omnes quorù natura in venerè propensior est. Acutissimùm id malum, triste fœdumque est. nam plerunque in septima die hominem cõsumit. Memoræ proditum est mulieres etiam in hanc

labem incidere, & eūdem in libidinem impetum, ac cætera omnia similia perpeti. Verum ego impudicū quendam libidinis ardorē mulieres inuadere mihi persuadeo, mulieres inquam humiditate affluentes, vt ipsius redundantia profundatur: sed satyriā fin id esse minimè cōcesserim. Neque enim ipsarum natura atque temperies, cū frigida sit, huic vitio habilis atque exposita est. præterea neque partes ad arrectionem idoneas, quemadmodum Satyrus, vnde affectui nomen est inditum, mulier obtinet. quandoquidem neque viri strangulatione ab utero vexantur: quoniam viro uterus datus non est.

ARETAEI CAP padocis medici

DE CAUSIS ET NOTIS
diuturnorum affectuum,
Liber primus,

IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| De longis affectibus, | cap. I. |
| De cephalæa, | cap. II. |
| De vertiginosis, | cap. III. |
| De morbo comitiali, | cap. IIII. |
| De melancholia, | cap. V. |
| De furore, | cap. VI. |
| De resolutione neruorum, | cap. VII. |
| De phthisi, | cap. VIII. |
| De suppuratione in pectore, | cap. IX. |
| De vomica pulmonis, | cap. X. |
| De anhelitu, | cap. XI. |
| De pulmonariis, | cap. XII. |
| De iecore, | cap. XIII. |
| De liene, | cap. XIIIII. |
| De morbo regio, | cap. XV. |
| De cachexia, i. malo corp. habitu, | c. XVI. |

ARETAEI
DE DIUTURNIS AF-
fectibus, proœmium,
cap. I.



Diuturnarum ægritudinum dolor multus est, tempus colli-
cationis longū, & me-
dicatio instabilis. vel
enim haud ex toto
deleti sunt, vel ex
qualibet leui offensa morbi deleti re-
uertuntur. Nam laborantes æquo ani-
mo ferre vsque in finē non audent. quin
etiam si æquo animo ferunt, in victus
ratione nimis longa delinquūt. Si verò
& dolor adest, laboriosa curatione per-
fitim, famem, amara medicamina, & do-
lorem excitātia, aut per sectionem, aut
vstionem, quibus in diuturnis morbis
egemus, miser ægroti cruciātur, vt mor-
tem quam iam pridem appetebant, effu-
giant. vbi me Hercule in magna animi
constantia diu præstanda, auxiliis va-
riandis, iucundis citra noxā ægro con-
cedendis, ipsōq; decipiendo medici vir-

DE DIVTIVR. LIB. I. 95

tus atque excellentia dignoscitur. Ceterum & ager fortis sit, & cum medico aduersus morbum cōspiret, necesse est: qui non solū corpus tenaciter arripiens ipsum celeriter tabefacit & exedit, verū etiam sensum magnopere subuertit, animāque insanam reddit. Nāque ab intemperie corporis id genus furorem atque insaniam, quam Græci melancholiam vocant, proficisci nouimus: de quibus in sequentibus dicam: in præsentia de cephalæa, id est de vetere capitis dolore, sermonem instituam.

DE CEPHALÆA,

cap. II.

SI caput repente obuia quaque de causa, per plures etiam dies dolorem patitur, hic affectus cephalalgia Græcè nominatur: si multo tempore dolor instare assuevit, & per longos frequentēque circuitus, ac in dies maior violentiorque insultat, difficulter sanationem admittens, id genus cephalæam Græco.

vocabulo appellamus. Eius formę infinitę sunt. quibusdam enim perpetuus dolor inhaeret, exiguus quidem, sed nō intermittens, nonnullis per circuitus reuertitur, vt his qui quotidiana intermittente febricitant: nonnullis ab occasu solis vsque in meridiem, & tunc ex toto remittitur: vel à meridie in vespēram, aut etiam vltērius vsq; in noctē permanet: sed non multum hęc durat circuitio. Pręterea dolor modō est in toto capite, modō in dextra magis, modō in sinistra, modō circa frōtem, aut sinciput: hęcque eodem die incertē & erraticē fieri solent. Quidā dextra tantū parte dolent, quidā læua, quā tempus, vel auris, vel supercilium vnū, vel oculus ad medium vsque terminatur, vel quā nāsus in æquas partes diuidit: vltra quem terminum dolor non progreditur, dimidium tantum capitis occupans. Id vitium solū heterocrania dicitur, haud leue malum: quanuis intermitte, quanuis exiguum esse prima specie videtur. nam si acutē interdum impetum faciat, fœda atq; atrocissima

trimenta

trimenta affert:nerui distenduntur, facies obtorquetur: oculi vel contēti instar cornu rigidi sunt,vel huc atque illuc interius conuellūtur, ac vertiginose agitantur: in ipsisque dolor profundus vsque ad intimas tunicas descendit. sudor ex tēdonibus immodicus effluit repente,neque cohiberi potest:neque vlla causa præcessit,perinde ac si quis ligno plagam inflixerit. Nausea & vomitus biliosus comitantur:homo consistere nequit, sed in terram delabitur. Quod si vitium quandoque increscit, de hominis vita actum est:at si debilius est,& citra vitæ periculum,diutius permanet:pigritia multa adest, & capitis grauitas:animi pendent:vitam ægrè ferunt.fugiunt enim quodā modo lucem, tenebræque his ægritudinem solantur:neque quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinent. olfactorius in iis sensus infectus est,neque quicquam eos bene olens oblectat:pariter quoque graueolentia detestantur. Vita ipsis inuisa est,mortēque discipiunt.Harum calamitatum fons & origo est,cum aridi-

tate frigiditas. Si diu teneat, magisque inualeſcat ægri- tudo, poſt id genus dolores vertigo ſubſequitur.

DE VERTIGINE, cap. III.

SI tenebræ oculis præ- tenduntur, & caput in turbinis modum circumduci videtur, & auribus murmur veluti delatentis cū ſtrepitu fluminis inſonat, aut tanquam ventus flatu vela percutiens, aut tibi- arum fiſtularumque cantus, aut veluti ſtridor plauſtri currentis obſtre- pit, vertigo huic vitio vocabulum eſt: malum quidē, ſi capitis ſymptoma eſt: malum quoque, ſi cephalææ ſucceſſit, aut ex ea vetuſta ægri- tudine ortū eſt. Nam ſi priora vitia non re- ceſſerūt, ſed remanet ſcotodine, id eſt tenebræ oculorum & apparens motus in orbem, aut longiori tempore cum propriis ſymptomatibus nulla adhibita curatione ad ſummum peruenit, vitium quod à Græcis ſcotoma dicitur, à Latinis vertigo, procreatur. Cauſam habet frigidam & humidam: aliorumque ſæpe mor-

DE DIVTVR. LIB. I. 99

borum, cum insanabilis euasit, initium est, ut furoris, melancholiae, morbi comitialis, cuique suis symptomatibus accidentibus. Vertiginis autem forma ita se habet, grauitas adest capitis, splendida quaedam oculis inter multas tenebras sese offerunt, suimet æger propinquorumque ignarus est: cumque morbus augetur, tunc tibi soluantur, atque humi repunt. Nausea fit atque vomitus pituitae, bilisve tam atræ quàm flauæ. quando flaua per vomitum reiecta furor enascitur: atra verò, melancholia: ac pituita exeunte, morbus comitialis efficitur. omnium quippe morborum talis conuersio est.

DE MORBO COMITIALI,
cap. III.

VARIUM ac portentosum morbi genus est epilepsia quæ dicitur à Græcis, Latine comitialis morbus. terribilis tique in accessionibus, & peracutus, & perniciosus: quâdo quidē nō nunquā accessio vna hominē rapuit. At si diligen-

F 2

ti cura vim morbi sustinet laborans, ægre tamē vitam ducit inter fœditates, ignominias atque dolores. Morbus autem non facile recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore viget. vexat etiam pueros & adolescentes. interdū secunda fortuna euenit, vt per succedentem prouectiorē ætatem abi-gatur: quādo simul cū ætatis flore eua-nescit: sed & tum quosdam abiens de-formes efficit, pueros quoque pulchri-tudinis inuidia perdit: aut manum inu-tilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquē prorsus auferens. Quod si malū hoc penitus insederit, atque ra-dices altius egerit, neque ipsum medi-cus, neque ætatis inutatio submouent, sed cum ægrotante viuit atque commo-ritur. Interdum morbus iste membra o-culósque conuellens ac distorquens, do-lores ciet: interdum & mētem in furo-rem adegit. Triste medijsfidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio & spontina ventris solutione. Ipsius quo-que morbi origo mirabilis, & præter

hominum opinionem est: quippe non-
nulli flagitiosis hominibus à luna im-
mitti existimant: cuius rei causa & sa-
crum morbum hunc nominant. Verum
& aliis rationibus id nomen ei fuit im-
positum: aut ob magnitudinem. omne
enim magnum, sacrum dici consuevit:
aut quòd non humana ope tolli queat,
sed diuina: aut quoniam dæmone cor-
reptus esse homo videatur: aut ob hæc
simul omnia sacer morbus appellatus
est. Quæcunque sane huic tanquã acu-
to morbo symptomata eueniunt, supe-
rius memorauimus. At si diu perma-
net: neque per intermissione citra no-
xam degunt torpentes, abiecti animo,
mæsti, hominum aspectum consuetudi-
nemque vitantes: neque ætate procedē-
te mitiores fiunt: vigilant, per quietem
multis formidolosus imaginibus terrē-
tur: cibum sumere fastidiunt, sumptum
malè conficiunt: decolores, facièq; plū-
bea sunt. ob ingenij sensusque tardita-
tem ægre discunt. auditus hebet, aures
tinnunt, capiti bombi veluti quidã in-
sonant. Lingua in sermone perplexa est

ita hom
Cum uult
exprimere
magnitudi-
nem alicu-
ius respo-
ndit. Sacru
pro magno.
IXTVES
Expo. Sacri
piscis pro
magni

ac titubat, aut ex vi morbi, aut ob vulnera, quæ tempore exacerbationis accipit. tunc enim ob conuulsionis nervorum motum lingua in ore variis modis torquetur. Rationem quoque usque eo morbus conturbat ac deiicit, ut prorsus denique infatuentur. Atque horum omnium causa est cum humiditate frigiditas.

DE MELANCHOLIA,

cap. V.

A Tra bilis in acutis ægri tudinibus, si in superioribus apparet, oppido quàm mortifera est: si ad inferiora descendens exiit, non valde vacat discrimine. In tardis autem longisque morbis, si ad aluū bilis atra decurrit, in tormina iecorisque dolorem finitur: mulieribus verò purgatio vice mensū aduenit, si in cæteris abest mortis periculum. At si superius, ut puta stomachum, septūve transuersum petit, insaniam parit, quam Græci melancholiam nominant. flatum nāque gignit, & ructus

foetidos piscium odorem exhalantes: infra vero & flatus cum crepitu transmittit: necnon & mentē simul alienat. Proinde melancholicos iuxta & flatuosos medici veteres sic affectos appellarunt.

Porro quidam reperiuntur, in quibus neque flatus, neque bilis atra colligitur: sed ira immoderata, & moeror, & ingens animi consternatio. hos quoque nihilominus melancholicos nuncupamus. Bilem quidem in istis redundare iracundia significat: atram vero bilem, iracundiae vehementia ac feritas. testis autē Homerus est, ubi inquit, Inter hos autem surrexit heros atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem valde praecordia atra circum oppleta erant: cuiusque oculi igni fulgenti similes erant. Tales evadunt melancholici, cum ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in vna cogitatione defixus atque inherens absque febre. Mihi profecto melancholia maniae, quae Latine furor dicitur, initium atque pars esse videtur. siquidem furentibus animus modo ad excandescentiam, modo

ad voluptatem conuertitur: at melancholici in tristitia & animi angore dūtaxat versantur. Furentes etiam plurimum vitæ sic transeunt desipientes, & fœda atrociâque committētes. Melancholici verò non vna tantum insanix specie laborant, sed aut venenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum consuetudinem perosi, in solitudinem aufugiunt: aut ad supersticiosam religionē conuertūtur, aut lucem hanc vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis aduenit. hi vero in furorem præcipitāt. Sed quomodo quibūsq; sedibus affectis id vitium plerunque contrahitur, subiiciā. Porro si in præcordiis residet, causa circa septum trāsuersum immoratur, bilisq; supra infrave melancholicis prorumpit. Si caput etiam per consensum afficitur, & excandescentiæ delirium in risum hilaritatemque per longū vitæ spacium commutatur: hi verò morbi potius magnitudine, quàm affectus dolore in furorem prolabun-

tur: in vtrisque nimirum ariditas accusanda. Viri sanè & furore & melancholia corripiuntur: rarius autem quam viri, sed deterius mulieres furis agitantur. Aetas quæ prope statum est, & ipse status huic malo subiiciuntur. Aestas tempus, & autumnus hunc morbum procreant, verum autem iudicat. Inter notas euidetiores hæ sunt, quod videlicet quieti aut tristes, abiecti torpentisque sunt absque ratione: nullaque de causa melancholia initium sumit. præterea in iram facile incidunt, male sunt animati, vigilant, ex somnis tumultuose excitantur, ingenti quoque pauore trepidant, cum morbus cremetum suscipit: quando & insomnia vera sunt, terribilia atque euidetia. quotquot enim à naturali statu valde aliena sunt, ea non protinus huic malo insunt, sed per quietem sese offerunt: cum in aliquid impetu rapti sunt, postea facile eos poenitet: mutabiles sunt, turpes, de minimis quibusque solliciti, auari: sed non ita multo post simplices, prodigi, multa largientes, non virtute animi, sed morbi varietate.

Quòd si malum exasperatur, homines oderunt, ab eisque fugiunt, de inanibus conqueruntur: vitæ maledicentes mortem expetunt. Atque istorum multis sensus ac mens usque eo stupore fatuitatēque capiuntur, ut omnium ignari sui quemet immemores in morem bestiarum vitam degant. corporis quoque habitus in peius labitur: colore foedo, & ex atro viridique commixto tinguntur: nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquo versum per corpus cum sanguine diffundatur. multi cibi capaces, nihilominus tamen extenuati sunt. quoniam somnus in eis neque potu, neque cibo membra confirmat, sed vigilia ad exterius mouet, ac dissipat. proinde & aluus arida est, nihil deiciens. nonnunquam verò deiecit sicca, rotunda, atro quodam biliosoque circumfusa. vrina pauca redditur, acris, biliosa. multum flatuosi spiritus in praecordiis est. ructus putidi feruntur, graueolentes perinde ac si ex maris lacuna exhalarent. nonnunquam & humidum quoddam acre cum bile reiciunt. arteriarum motus fe-

DE DIVTVR. LIB. I. 107

rè parui sunt, pigri, inualidi, crebri, frigori similes. Fama est, ex his quempiam insanabiliter se habétem, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego vero suspicor, cum ab initio in puellam exarsisse, inde tristem & languenti animo, quòd ea non potiretur, euasisse, suisque popularibus melancholicum visum esse. at iste ubi puellæ amatae se coniunxit, mœstitia recessit, ira, & animi languor discussus est, gaudiū tristitiā deleuit, & mens amore medico prorsum sanata est.

DE FVRORE, cap. VI.

FVroris modi specie permulti sunt, genere tantum vnus. est enim ex toto mentis alienatio diuturna, vacans febris. Etenim si febris quandoque coniungitur, id nō ratione furoris proprie, sed alio quouis casu incidit. Quippe & vinum mentem inflamat, & per ebrietatem delirare cogit: præterea quædam esculenta amentiam pariunt, vt man-

dragora & altercus. sed neutiquam hi inter furentes numerandi sunt. nam repente hæc adueniunt, & celeriter conquiescunt. furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectæ calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignauia ex refrigeratione proueniens: at furor ex calida siccaque causa exoritur, functionesque tumultuosas præstat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per interualla desinit, simulque commoritur: furor verò & intermittit, & diligenti curatione radicitus vellitur. sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut tēporis anni clementia curatur. Nonnullos nanque qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in victu, aut ira casu aliquo prorritata denuo ad furorem reuocauit. Porro illi huius vitio facile patent qui natura sunt iracundi, acriter exardescientes, negotiosi, faciles, hilares, qui iocosus puerilibusque delectantur. Illi

etiam qui contrario his sunt ingenio, quicūque videlicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseuerantes, & qui cū demum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt. hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verum & in aetatibus quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, vt puberes, iuuenes, & viri. In quibus autem calor ex atra bile accenditur, corporisque habitus ad ariditatem vergit, his in melancholiam cadere facillimū est. Item victus ratio, multi cibi assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, ueneris appetentia hanc agritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi mūdetur corpus, furor infestat: cū ipsarum vteri ad virilem congressum apti euaserunt. aliæ verò haud ita facile, sed admodum acerbè in furorem aguntur.

Causæ tales sunt: vir nimirū furiosus fit, si consuetus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor voluptati est, ridet, ludunt, saltant die noctūque: ira-

scuntur palam: nonnunquam coronati incedunt, ac si ex aliquo certamine victores redeant: quibus obuiam fiunt, non sunt infesti. ita se habet huiusmodi furoris species. Alij verò ab ira furentes nonnunquã sibi vestes prosciderunt, & seruos interfecerunt, & sibi ipsis manus intulerunt, & obuios quosque male habuerunt. Species utique infinitæ sunt. ingeniosi namque ac dociles astronomiam callent sine doctore: philosophiamque possident à nemine traditam: poeticam quoque veluti à musis infusam norunt. aliquid enim & in morbis emolumentum præbet docilitas. Rudes autem atque indocti homines hoc malo circumuenti, grauius pondera ferunt: figulinam exercent aut fabrilem, aut lapides cælant. Præterea & monstrosa quædam cogitant. timebat enim quispiam ne vasa olearia prociderent: alius non bibebat, se laterem esse existimans, ne humore dissolueretur pertimescens. Id etiam fama diuulgat: carpentarius quidam olim fuit, cum domi esset, prudens operator: ligna bene metiebatur, scindebat, com-

DE DIVTIVR. LIB. I. III

planabat, clavis iūgebat aptabátque: in domo extruenda sobrius cum exactoribus operū versabatur, paciscebatur, pro laboribus iustam mercedem poscebat. porro iste in loco vbi arte sua fungebatur, mente constabat: at si in forū quandoque discederet, ad balneum aut ad aliud quippiam necessarium, instrumenta deponens, primo suspirabat, deinde egrediēs humeros cóstringebat: postea cū ē seruorum, fabricæ, locique illius cóspectu abiisset, tum penitus insaniebat, & furore rapiebatur: quòd si ad eūdem locum celeriter recurriisset, iterum ad se redibat. Hæc erat inter locum illum & viri mentem cognatio. Causa morbi huius in capite præcordiisque continetur: modò vtroq; mēbro pariter laborare incipiente, modò alterū altero inuicem lædente. Verum præcipua furoris & melancholiæ sedes viscera sunt: quemadmodum caput & sensus in phreniticis plerunque laborant. in quibus vis sensoria oblaesa est, & quæ non adsunt, tanquam iam præsentia conspiciunt: & aliis non conspicua, ipsorū sese

oculis representant. At furentes tantū-
modo vident quæ videre oportet: sed
de illis non sentiunt, vt sentiendum est.
Itaque si magnū est malum, promptio-
re ingenio sunt: sensibus acutiores fiunt,
suspiciosi sunt, iracundi nulla de causa,
mœrentes præter rationem, cum in se-
uerum & tetricum furor vertitur: cum
verò ad animi hilaritatem inclinatur, læti
& alacres fiunt. prius dicti sine lædente
causa vigilant. vtrisque visio deprauata
est. capitis dolor, aut saltem grauitas co-
mitatur. auditu prompti sunt, mente tar-
dissimi, in quibusdam sanè peculiariter
sonant aures, & bombis adeo perstre-
punt, vt tubarū fistularūque voces au-
dire sese existiment: idque fit, cum mor-
bus crementum accepit. multo vento
inflantur, anxij sunt, in sumēdo cibo vo-
races atque auidi, vigilant enim, & vi-
gilia famem suscitatur. verum neque, vt
ægri solent, emiciantur: sed magis pe-
culiaris melancholicis corpulentia est:
item pillore quodam suffunduntur. si
quod autē viscerū phlegmone inuase-
rit, tunc appetentia nutritiōve hebe-
tatur:

tatur: oculi caui fiunt, non conuiuentes: ob quos cœruleæ atræq; imagines sese obiiciunt, si ad melancholiam affectus vergit: sed rubicundiora & punicea visa sunt, si ad furorem inclinât. plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, paûorque eos veluti instantis fulminis occupat. nonnullis vero & rubent oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu variis secûdum quietem visis perturbâtur, immoderatèque venerem concupiscunt: neque eos etiam in publico ventrê exonerare pudet. ad mutua & familiaria colloquia pigri sunt: cômonefacti & increpiti ad iram excitantur, atque furore penitus insaniunt. Exinde alius alio modo furit, quidam immensum spacium decurrunt: & quo peruenturi sint, nescientes, eodem vnde discesserant, cursu feruntur: alij per longum iter eos quibus forte occurrerint, comitantur. Item nonnulli vociferântur, latrocinium, aut viâ illatam querentes: alij ab hominum cōspectu in solitudines fugiunt, secûmque tantummodo versantur. Cûm verò

G

iam inclinatus est morbo, stupidi, quiescentes, mœstique sunt: in notitiâ enim morbi venientes, sua calamitate miseriamque tristantur. Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilacerant pia cogitatione. Diis suis tanquam id postulantibus gratificantes. Id furoris genus à persuasione quadam duntaxat proficiscitur. in ceteris hi temperantes modestique sunt. excitantur autem tibiæ cantu, aliòve animi oblectamento, aut temulentia, aut presentium hortatu. Decorum afflatu hic furor prouenit: qui cum remittitur, hilares sunt & curis vacui, tanquam diis initiati. præterea decolores & macie affecti sunt, diuque ex vulnerum doloribus infirmum eorum corpus est.

DE NERVORVM RESOLUTIONE, cap. VII.

A Poplexia, paraplegia, paresis, paralysis, omnia genere eadem sunt. aut enim motionis, aut tactus, aut vtriusque defectus est: interdum & metis, in-

terdum & reliquorū sensuum. Sed apoplexia totius quidem corporis & sensus, & mentis, & motionis resolutio est. proinde apoplexiam fortē solvere nulla facultas potest: debilem verò tollere non facile est. Paraplegia est tactus motusque remissio, sed in membro vno, ut puta manu crurēve: paralyfis autē motus tantū ferè est, actionisque defectio. Quòd si nonnunquam solus tactus deficiat (raro autem id evenit) potius anæsthesia, id est sensus abolitio, quàm paresis, id est defectio, nominatur. At si Hippocrates apoplectō, id est attonitū, crus secundum rectum dicat, illud tanquam mortuo simile, inutile & insanabile vult significare. quod enim in toto corpore est vehemens apoplexia, illud in crure paraplegiam vocat. Urinæ autem in vesica aut suppressio, aut retinēdi impotētia, paresis propriè est. Palpebrarum verò & malarū, musculorūmq; in maxillis, & genę in alterutrā parte: in diductio, si per convulsionē torqueantur, canina cōvulsio nominatur. Genuū resolutionem, sensusque per aliquātam

temporis stuporem, & exanimationem,
& casum lipothymiam, id est animę de-
liquium, vocitamus. Verũ nonnunquam
membra singulatim resolvuntur: super-
cilium, exempli gratia, solum, aut digi-
tus, aut maiora etiam, vt manus crũsve:
nonnunquam simul plura: & aliàs dex-
tra tantũ, aliàs sinistra, aut vnum post
aliud omnia resolvuntur exquisitę, aut
debiliter. neque tantum quę distantia
sunt, & quę eodem censentur nomine
coniugataque sunt, vt oculi, manus, cru-
ra: verum etiam cõiuncta, cognataque,
vt nares vsq; ad medium, & lingua vs-
que ad fines, qui in ipsa media positi
sunt: vna tonsilla, & isthmus, ipsaque gu-
la dimidia resoluitur. Ego sanè stoma-
chum etiam, & intestina, & vesicã, ob-
longũque intestinum vsque ad prin-
cipium, id est anum, idem vitium pati
existimo. Sed interiora membra reso-
luta latent, obscuraque sunt: imperfectę
verò sunt ac dimidiatae eorum func-
tiones: proinde mihi & membra dimidia
pati videtur in duas partes à morbo di-
ducta. Hęc res nimirũ documento est,

quo dextræ partis facultas & natura à
 finistræ partis natura & facultate diffe-
 rat. Quippe assidens causa æqualis est,
 & vtriq; cōmunes morbi occasiones, si-
 ue frigiditas sit, siue cruditas. sed vtraq;
 haud æque pati idonea est. Natura ve-
 rò æque valens est, vbi subiecta sunt æ-
 què valentia: idem autem inæqualibus
 inesse nullo modo potest. Igitur si infra
 caput aliquod principium affectum sit,
 qualis medullæ dorsi mēbrana est, quæ
 nominis eiusdē sunt & contigua, dextra
 in dextris, & in sinistris lēua resoluun-
 tur. Verum si caput primo in dextra pa-
 tiatur, sinistra: si in lēua, dextra neruorū
 resolutione laborant. Hoc ideo euenit,
 quòd neruorum initia permutata sunt.
 neque enim dextri nerui in dextras par-
 tes secundum rectum vsque ad extre-
 mum progrediuntur: sed ab initio ena-
 ti protinus ad oppositos transeunt, se in
 vicem in figuram huius literæ X, quam
 Græci chiasmon vocant, permutantes.
 Utque semel dicā, siue omne simul cor-
 pus resolutionem neruorum patiatur,
 siue aliqua membra, siue ab alterutra,

siue ab vtraque parte, nerui de capite
fluentes alia ratione patiuntur. Nam
sensu quidē, vt paucis dicam, hi priuan-
tur, non admodum autem facile ex se
motum amittunt. Quod si per commu-
nionem cum his qui mouentur, aliquid
vitij cōtraxerint, paulum & ipsi motus
perdiderint. Nam & per se ipsi motum
tamen si minorem naturaliter possidēt.
Nerui enim à musculis ad musculos
transeuntes motionis principatum ob-
tinent, & his qui à capite manant, imper-
tinnt. Nerui enim capitis ab illis pluri-
mum motus participant: tamen ex se
quoque licet minore, vim mouendi ha-
bēt. Atque hi nimirum in motu noxam
magis patiūtur. Rarò autem vsu venit,
vt per se iacturam sensus faciant: neque
tunc ex toto eam facere videntur. At si
qua copula neruorum ab osse quopiam
enatorum, & ad ossa pertinētium, solu-
ta aut rupta sit, tum membra proprio si-
tu non continentur, luxantur, locòque
dimouentur: non tamen sensu priuan-
tur. Hæ sunt autem paraplegiæ species.
quandoque enim membra resoluta in

longum porriguntur: neque, quando extrema longissima apparent, iterum possunt recuruari. nonnunquam in orbem flectuntur, neque in longum extenduntur: si quis autem ea, ceu ligna adaptans & poliens, violenter protrahere nititur, breviora ea seipsis inueniet. Vtrunque id vitium & in oculis pupilla sustinet. aut enim in amplitudinem magnam diffunditur: idque platycorien, id est pupillæ amplificationem, appellamus: aut hæc eadem in angustum contrahitur: idque phthisis, aut etiam mydriasis à nobis dicitur. Vesica etiam in suis obeundis muneribus deprauatur, & paresin quam vocât, patitur. aut enim per extensionem resolvitur, cum retinendi impotens lotium effundit: aut in se ipsam conuoluitur, cum vrinæ plena reddere nihil potest. Morbi huius, paresis videlicet, causæ prægredientes sex numerantur, vulnus, percussio, refrigeratio, cruditas, venus, vinolentia. Cæterum & animi immodicæ perturbationes, vt repente incussi pauores, timores, animi consternatio, & mæror: præterea

& in pueris terrores: interdū inopinatum atque ingens gaudium, item risus vsque ad mortem implacabilis nervos resolvere consueuerūt. Hæc utiq; morbi prima initia sunt sed vltima atque potissima causa est ingenitæ caliditatis refrigeratio, quando ab humiditate aut siccitate iniuriam patitur. ab hac verò magis quàm ab illa sanatu difficilis læsis est: necnon & à vulnere, neruiq; intercissione malū insanabile prouenit.

Quantum ad ætates attinet, senes & ipsi curationem vix recipiunt: pueri facile ad sanitatē redeunt. Inter anni tēpora hyems hanc ægritudinem gignit præcipuè, secūdò ver, tertio autumnus, æstas omniū minime. Habitus corporis pingues natura, humidi, desidēs, belluini, hoc vitio facile corripuntur. Affectus hi iam perfecti talibus signisprehenduntur, immobilitate, sensu sopito, qui neque calidum, neque frigidum, neque vellicantes, aut scalpētes, aut aliter contingentes percipiat. Raro euenit, vt istis extremitates doleant: verum sanitati recuperandę indolentia non le-

DE DIVT VR. LIB. I. 109

uiter prodest. Porro morbus hic repente inuadere solet. nonnunquam tamen etiam prælonga habet initia, grauitatem, motum difficilem, torporē, frigoris sensum, aliàs caloris excessum, somnos breues, cogitationes siue apparitiones vehementiores, atque tunc subito resoluti sunt. Nempe in canino vocato spasmo, id est neruorum conuulsione, omnes faciei partes conuelli, non magnopere vsitatum est. Sed ad dextras partes læuæ, ad læuas dextræ feruntur: quando buccæ atque os huc aut illuc, tanquā ex sede propria discedente maxilla longius detorquentur. Etenim quibusdam nonnūquam articulus luxatus est, cū valde hiantibus maxilla ad inferiora delapsa fuit. in læsa mala oculi inuersio & strabositas (vt ita dicā) fit: in palpebra inferiore palpitatio: palpitat & superior aliàs quidem cum oculo, aliàs verò sola. Contenduntur & labia seorsum alterutrum: nonnunquam verò & ambo collapsa balbutiunt: quibusdam & exacte occluduntur, postea repente ac late dehiscunt, & solitum sputum cum stre-

pitu eiiciunt. conuellitur & lingua: si-
 quidē & ipsa musculus est & nerui: quā-
 do ad palatum secundum latitudinem
 tota coharens subitò sese remouit, &
 concussionis sonum reddidit. conuel-
 litur & columella: ac si os quæ interius
 sunt in vnum cogat, inopinatus sonus
 redditur: si vero dehiscat, columellam
 intueberis nonnunquam palato secun-
 dum latitudinem adhaerentem: nonnū-
 quam violentia quadam in longū pro-
 ductam, ac descendantem, fistulæ per-
 similem: quandoquidem & ipsa sonum
 edit. Porro caninæ conuulsiones deci-
 piunt, quippe integræ ac sanæ partes æ-
 grotare spectantibus videntur. Nam in
 omnem partem tentione, colore, oculi
 amplitudine, sanæ partes lesionem pati
 existimantur. Deprehenduntur verò &
 ridēdo & loquēdo, & cōniūedo. siquidē
 læsæ partes omnes cum violētia & stre-
 pitu quodam trahuntur: labium risu ca-
 ret: inter loquendum non mouetur: pal-
 pebra non volubilis, oculus intentus ac
 rigens est: sensus tangendi nihil perci-
 pit. At sana membra loquuntur, conni-

uent, sentiunt, rident.

DE PHTHISI, cap. VIII.

SI ab externa causa abscessu in pulmone facto, aut à lōgīnqua tussi aut à sanguinis reiectione & puris extusīāt, pye & phthisis nominatur. Si pectus autem costāve suppurauerit, materiāque per pulmones traducatur, id genus homines empyi Græcè vocantur, purulenti à Latinis dici possent. Quòd si & ab his pulmo exulceretur à præterlapso pure corrosus, hoc vitiū non vltius empyema, id est purulentiam, sed phthoen, id est corruptionē appellato. Simul autem adest & ignis assiduus, qui nūquam intermittere videatur, interdū latens sudore atq; corporis frigore. Hæc enim propria phthoen sequuntur, quòd videlicet caliditas excitatur, & in noctē emicat, interdū rursus in visceribus delitescit. patet autem istorū angor, & imbecillitas, & colliquatio. Nam si per diē corpus ignem euaderet, cur non fieret tūc homo carnosior, & robustior, & mor

bi tolerantior? ut enim recessit, grauiamagis intenduntur: arteriarum motiones paruae & imbecillae sunt: vigilant, color languet: & alia omnia patiuntur, quotquot febricitantes comitari solent. At species humorum prope infinitae sunt, liuidorum, atrorum, purorum ac syncerorum, aut pallido alboque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rarorum diffluentium, aut odore carctium, aut foede olentium. Omnes autem hae puris formae ac species sunt. Quicumque vero aut igne, aut aqua humiditates explorant ac notant, hi haud ita multum phthoen mihi dignoscere videtur. Namque visio quolibet alio sensu certior est, non modo his quae reiciuntur, intuentis, sed etiam aegrotantis specie consideranda. Siquis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hunc vera phthoe laborare pronunciat. Quinetiam quibuscunque quidem ulceratus pulmo non fuerit, nihilominus tamen diuturnis febribus consumpti sunt, saepiusque

DE DIVTVR. LIB. I. 109

duriter, & absque effectu vlllo tussientes nihil reiiciunt, hos quoque phthysicos haud ita multum improprie nominarunt. Simul verò & his adest pectoris grauitas: pulmo enim infirmus est: angor, intolerantia, cibi fastidiū, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: sudor vsque ad pectus caliditate molestior: per tussim varia, qualia memorauimus, extruduntur, vox raucescit, ceruix nonnihil tortuosa est, gracilis, nō versatilis, sed veluti rigens atque intenta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt: ossium duntaxat species remansit. siquidem & carnes extabescunt. vngues adunci fiunt: digitorum ventres rugosi & lati. nam prae macie neque fasciam ambientem, neque rotunditatem obtinet. quam ob rem & vngues aduncisunt. ea est enim ipsorum requies & fulcimen, quæ ipsorum extremitates replet: quoniam & ipsi laborem sustinent, utpote qui solida membra sunt. Item nares iisdem acuminatae, graciles: malae extates & rubidae: oculi caui, lucidi, micantes: tumida, excarnis, pallida, seu li-

uida facies est. buccarum tenuia dentibus inhaerent: ridentibus aſſimulantur: in omnibus denique cadaueris ſpeciem referunt. Hunc in modum & cætera ſeſe habent. tenues enim & carnibus priuati ſunt: brachiorum muſculi non apparent: mammarum neque veſtigia extant: ſolæ autem papillæ cernuntur. coſtas non ſolum diſnumerare perſpicuè licet, verum etiam vbi deſinant, intueri facile eſt. neque enim cum vertebris factæ articulationes occultantur. patent etiam in os pectorale coſtarum inſer-tiones: quarum interſtitia inania & caua ſunt, rhombi figuram ſecundum oſſium circûductû oſtédentia. præcordia vacua ad ſuperiora cõuulſa ſunt. abdomen & ilia ſpinæ dorſi cohæreſcunt. artus cõſpicui, prominētes, & macri ſunt: perinde ſe habēt & tibia, & coxendix, & brachiū, at ſpina vertebris ſuperextat, à priori parte caua, vtriſque muſculis per tabem diſſipatis. ſcoptula operta tota ſeſe cõſpectui offerunt, atque auium alas imitâtur. Huiusmodi ægrotis ſi alius perturbetur, actum eſt: ſin ad ſani-

DE DIVTIVR. LIB. I. III

tatem vergant, perniciosis contraria signis adueniunt. Porro senes in hoc malum frequenter non incidunt, sed minime euadunt. Iuuenes autem usque ad florentem consistentemque ætatem post sanguinis reiectionem in phthisin prolabuntur: inde sanescunt quidē, sed non facile. Pueri assidue tussi usque ad phthisin nonnunquam diuexati facile ad sanitatem redeunt. Habitus verò in id vitium proni sunt graciles delicatique, fecilibus tabulis similes, alarum instar habentes, prominenti gutture, albidiori pectore. Regiones autem frigidaæ atque humidaæ huiusce affectus germanæ sunt.

DE PURULENTIS,
cap. IX.

Quibus hominibus in cauis locis è regione pectoris, aut inferius subtransuerso septo puris abscessus fiunt, si per os id eiciunt, empyi hoc est purulenti vocitantur: si per aluum pus deiecitur, apostematia Græco vocabulo di-

cuntur. Ac si in pectore quidem, cum est
ulceratū, in pulmone verò, cum phthoe
laborat, aut in sublinente costas mem-
brana circa latus, aut os pectoris, quod
Græci sternon vocant: aut inferius, vbi
pulmo cum spina dorsi committitur co-
hærescitque, aut si quo alio pectoris lo-
co vitium sit, omnibus ad pus excernē-
dum via per pulmonem munita est. Sub
intersepto verò in visceribus, iecore,
liene, renibus per vesicā: in mulieribus
etiam per vterū transitus datur. Nempe
cuidā ego aliquando abscessum laxio-
ris intestini dextra in parte prope iecur
diffecui: multūque inde puris effusum
est: multū quoque per renes & vesicam
ad plures dies emanavit: vnde & sanita-
tem homo adeptus est. Causæ verò cō-
munes omnium hæ sunt, plaga, crudi-
tas, frigus, & idigen^a alia. Porro & qui-
busdam in pectore diuturna tussis incū-
bens, & lateris inflammatio, & vomica
pulmonis, & fluxio longinqua, necnon
& acuti morbi in aliquod istorum de-
cubitus purulentæ originem præbent.
At humor aliàs iners imbecillūque
alij

alij inhæret, aliàs acris & mordax, & ad mortē vsque putrefaciens. Nam & species infinitæ sunt, quas suo loco postea memorabimus. Sed magnum profecto miraculum est, quomodo id fiat, ut ab exili tenuiq; membrana nihil crassitudinis habente, membrana inquam costas interius obtegente, tanta copia puris effundatur. multum enim colligi in multis deprehensum est. Huius rei causa est inflammatio ex sanguinis multitudine oriens, ob quam mēbrana crassescit. verūm ex multo sanguine multum in medio pus contrahitur. id si ad interiora subeat, costarum ossa suam propriam sedem obtinent, sed phthisis altera species superius à nobis memorata secundum naturam eueniet: sin ad exteriora procurrat, ossa disiunguntur. in aliquod enim inter costas medium spatium ipsius abscessus acies exeritur: quando in hanc atque in illam partem costarum ossa pelluntur. Notarū autem quædam omnium cōmunes, quædam singulorū affectuum propriæ sunt: grauitas potius quàm dolor, commune

signum est. Pulmo enim dolorem non percipit. febres obscuræ, horrores vespertini, sudores in remissione, vigilia, tumores in extremis pedibus, manuumque digitis subinde consistentes, atque insurgentes: inquietas, cibi abominatio, totius corporis macies. Quod si & in longum mutatio producit, habitus phthisicus redditur. neque enim ultra in officio natura perseverat: quoniam concoctio non fit, qualis antea. inde caro consumitur: color qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis peior, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. quinetiam tussis ab initio tantisper vexat, donec inflammatio quæ urget, perseverat. quando & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & vigilia, & spiritus difficultas adhuc magis crescunt. Venarum motus parvi, torpentes, imbecilli fiunt: mens delirat, pectus distenditur. Verum enimvero si ad suppurationem inflammatio veniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parva est cum maiore tussi, & ex violento abscessu. in primis pituita fertur bile

DE DIVTIVR. LIB. I. IIS

infecta, ad nigritiem vergens, tanquam admixta fuligine, adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proximè rumpenda inflāmatio est, quæ reiiciuntur speciem carnis habent, crassioraque sunt. At si iam rupta sit, strangulatus discrimen impendet, si multum subitaneumque pus emanavit: si pedetentim verò emittatur, exactè sanitas aduenit. Porro si ad inferiora pus transire velit, partes quidem superiores, ubi erat abscessus, acutus dolor occupat: aluus verò humida est, primùm aquosa cum pituitolis deiciens, deinde cruenta quadam circūfluentia: rursumque carnosā, cū iam effractus abscessus est. Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per urinæ vias elabens. Sed materiæ ad renes & vesicam trāsmutationes meliores omnibus sunt. At si pus infra suprāve feratur, eius color varius est, pallidus, aut albus, aut cinereus, aut liuid⁹, aut ater. pus item aut olidum est, aut odore vacans: crassissimum, aut mediocris corpulentia: aut læue æquale, aut asperum inæquale. Et frustra caruncularum simi-

lia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile abluantur, aut tenacia. Utque in summa de pure dictum sit, quæcunque alba feruntur, concocta, inodora, leuia, rotunda, & celerius extussumtur, aut per aluum deturbantur, hæc tuta & salutaria sunt: quæcunque autem perpallida, biliosa, & inæqualia sunt, ea praua esse scito: sed multo his peiora, liuida & atra. putredinem enim & exedentia ulcera significant. Ad hæc & habitum simul animaduerrere conuenit, & quæ morbum comitantur. nam si excretionem bene tolerat, febre vacat, recte concoquit, bene coloratus est, bene ad cibos se habet, si facile extussit, si arteriarum motus bonus est, si vires firmæ, ægrotus perniciem euadit. At si febris superueniat, omniaque in deterius conuertantur, de salute desperatum est. Præterea & loci abscessibus occupati simul noscendi sunt: quibuscunque enim in osse pectoris, quod sternon vocant, empyema, id est purulentia fit, tarde abscedit. nuda enim, & excarnes, & cartilagineæ partes illæ sunt: eiusmodi verò non fa-

DE DIVTIVR. LIB. I. 117

cile phlegmones redundantiam susci-
piunt, & absque suppuratione multum
temporis permanent siquidem res fri-
gida cartilaginee sunt: sed earum pleg-
monae minime nocent. Ipsius verò ha-
bitus colliquationes pravae sunt, breui
enim tempore suppurant. Lienis, iecur,
& pulmo, & interseptum celerius quidem
pus ducunt, sed periculosa & mortife-
ra sunt.

DE PVLMONIS AB-
scessibus, cap. X.

Q Vicunque pulmonia laborant, si pi-
tuita sit, nisi diffundatur, super-
stites erunt. hi verò morbi primum im-
petum euadentes purulenti fiunt. Futu-
ri quidē, aut iam perfecti abscessus in-
dicia in capite de Purulentis exposui-
mus. Cū perfectus iam abscessus est,
non vi ac laboribus ad eum rūpendum
reiiciendūque, quemadmodum in a-
liis corporibus vsu venit, opus est: sed fa-
cile per superiora excernitur: cū magis
in raritatibus, quàm in corporis habitu

H 3

distentio fiat. Rarus enim ac foraminu-
lentus pulmo est, spōgia similis, humo-
rem haud moleste ferēs: qui aliam post
aliam inanitātē eo vsque donec ad aspe-
ram arteriam deueniat, permutare so-
let. Circuitus autē humori faciles sunt,
quandoquidem flexile atque lubricum
pus est. Respiratio etiam sursum spiritū
efflat. Sæpius autem mortem effugiunt,
nisi aliquando quā spiam subitanea ac
multi humidi attractione stanguletur:
quod arteria puris multitudine obstru-
cta aerem non recipiat. Horum nonnul-
li progressu temporis moriūtur, quem-
admodum phthilici aut purulenti ex-
tingui solent. Sputa verò candida sunt,
spumantia, cum saliuā permixta, aliās
cineracea, aut subnigricantia. Et bron-
chia, id est asperæ arteriæ circuli, non-
nunquam expuuntur ob vlcēis varic-
tatem, si altē abscessus penetrat: quando
& fragmenta visceris expelluntur. Rau-
cescunt, breue spirant, grauem vocem
edunt: ipsorum pectora lateſcunt, & la-
tioribus humiditatis causa indigent: o-
culorum nigræ partes fulgent, albæ ve-

DE DIVT VR. LIB. I. 119

rò albissimæ fiunt, ac pingues: malæ rubet, venæ in facie clatæ ac tumide sunt. Mirum est autem in his, quòd tenor quàm pro corpulentia maior est, animi verò alacritas & constantia tenore potentior.

DE ASTHMA TE,

sive anhelitu,

cap. XI.

SI à cursu, exercitationibus, & quolibet negotio spiritus ægre redditur, asthma Græcè, anhelitus Latinè vocatur. Morbus quoque ille, quem Græci orthopnœan dicunt, & ipse asthma nominatur. in accessionibus enim & ipsi anhelant. Orthopnœan verò appellant, quoniam erecto duntaxat corpore facile spiritum ducunt. decumbētes enim strangulantur. propter extentionem igitur quæ in spirando adhibetur, affectui nomen orthopnœa, id est recta spiratio, inditum est. Erectus enim homo ad respirandū extenditur. at si supinus decubuerit, strāgulationis instat periculum. Afficitur autē pulmo, simul etiam quæ

H 4

spirationi conducūt, afficiuntur, inter-
septum & pectus. At si cor vitiatum sit,
nunquam diutius vita produci poterit.
hoc enim loco spirādi viuendique ini-
tium situm est. Causa est frigiditas spi-
ritus, atque humiditas: materia verò,
crassi interiūsque abditī humores.

Huic vitio mulieres opportunæ sunt
magis quàm viri: quandoquidem & hu-
midæ & frigidaæ sunt. Pueri facilius q̃
hæ liberantur. nam ipsorum natura in
incremento est, quæ valentissime cale-
facere potest. Viri tamen nō facile hoc
morbo capiuntur, citius tamen capti pe-
reunt. Differtur autē interitus quibus-
cunque opere cōficiendo, aut lanis ela-
borandis pulmo incalescit, & accendi-
tur: quemadmodum calcis opificibus,
aut ærariis, aut ferrariis fabris, aut ignis
in balneis excitatoribus. Morbi verò
incipientis notæ huiusmodi sunt, gra-
uitas pectoris, tarditas ad opus solitū,
& ad aliud quodlibet gerendū: in cursu,
aut ī accliuī itinere difficilis & ægra spi-
ratio: raucescunt, ac tussunt: flatus in
præcordiis, atque eructationes præter

DE DIVTIVR. LIB. I. 122.

rationem excitantur: vigilant, noctu parum, & obscure incalescunt: nares acutatas, & ad spirationem paratas habent. Si malum in peius ruat, malæ rubent, oculi prominent, veluti in his qui strangulantur: stertunt, dū vigilant: multo magis, cū dormiunt: humida, obscura, sonoque carens vox est: multum & frigidum aerem cupiunt: sub diuo ambulāt. quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parua & angusta est. Erecti spirant, tanquam omni aere attracto potiri cupientes. præ aeris autem cupiditate & os aperiunt, patefaciuntq; , tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies præter malas, quæ rubent, pallida est: sudor circa frōtē & iugula emanat: assidua & aspera tussis infestat: reiciuntur pauca, tenuia, frigida, veluti quædā spumę efflorescētia: inflante spiritu collum intumescit, præcordia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus parui, crebri, atque depressi: crura exilia. Quod si hæc ulterius clementum acceperint, instar comitialis morbi nōnunquā hominem strangulant. At si vertantur in melius,

tussis longior, & rarior fiet: plura excernentur saniosa sputa, & humidiora: multa per ventrem aquea exturbabuntur: urina copiosa scaturiet, licet nondum quicquam in ea subsidat: vox sonatior, clariorque reddetur: somni longiores, quantum satis fuerit, efficientur: praecordia remittentur: dolor interdum ad scapulas in remissione transiit: anhelitus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate fit. Ita sanè mortem effugiunt: sed in morbi cessationibus, licet ipsi nō decumbentes obambulent, secum tamen morbi signa circumferunt.

DE PULMONARIIS,
cap. XII.

ANhelitus species pulmonarium est, quod Græci pneumōdes vocant: & à pulmone vitium, quemadmodum & anhelit⁹, oritur. Quæ insunt enim, utriusque communia sunt, & exigua differentia est. nam spirandi angustia, & tussis, & vigilia, & caliditas utrunque vitium comitantur. item in cibos odium, & to-

DE DIVTVR. LIB. I. 123

rius corporis extenuatio. Id enim malū
cūm fœdum sit, producitur: neque tamē
anni spaciū excedit. Nam si autumnī
tempore ægrotare quis incœperit, vere
aut æstate futura vitam finiet: sin hye-
me, sequenti autūno moriturus est. In-
terdum & senes in hanc labē facile in-
cidūt, & exterriti. Ea correptis leui mō-
mento ad perniciem opus est. omnes si-
millimē spiratione priuantur: arteria-
rum motus parui, crebri, infirmi sunt.
sed hæc & in anhelitu reperiuntur. Pri-
uatim verò hi tussunt, tãquam aliquid
expulsuri, cūm tamen irritus eorum la-
bor sit, nihil enim reiiciunt. verū si quid
ex pulmone vi extruditur, illud exiguū,
album, rotundum, grandinosumque est.
Pectus in his latius utique est, non ob-
tortum, non vlceratum. Tametsi autem
pulmo non suppuret, humorum tamen
veluti concretorum plenus est. Tempo-
ris intercapedines inter huiusce morbi
accessiones lōgiores sunt. Nonnulli ex
his celerius suffocati sunt, q̄ aliquid de-
terius omne corpus inuasit: nōnullis
vero in hydropē circa ilia, aut in eum

qui anasarca dicitur, morbus iste mutatur ac desinit.

DE IECORE, cap. XIII.

IEcur lienj in generationē æquilibre est. dextrā enim laeuāque partē hæc viscera occupant, naturaliter paria numero, sed facultate tam in sanitate q̄ in morbis imparia. In sanitate quidē, quoniam principatum alimenti iecur obtinet. si quidem venarum radicatio iecur est. Quinetiam in morbis ad sanitatem consequendam multò quàm mors valentiorē causam habet. Igitur quanto ad sanitatem iecur melius est, tanto & deterius à morbis afficitur. Etenim celerius & violētius inflāmatur: & frequētius perniciosiūsque abscessum patitur. At duro tumore qui scirrhus Græce nūcupatur, affectū velocius, atque dolentius q̄ lienis, interficit. Quæ ad inflammationē attinēt, in libro de Acutis morbis proposui. Quòd si in pus conuertitur, dolor acutus ad iugulū vsq; , aut & ad summū humerū pertinet. Nam præ

DE DIVTVR. LIB. 4 125

onere interseptū, vnde iecur suspensum est, detrahit: interseptū verò membranā costis substratā degranat: ipsum enim illa consequitur: quæ planè ad iugulū vsque & ad summū humerum extenta est, atque hæc omnia simul ad inferiora detrahuntur. Ignis acer cū horribus in suppuratione exoritur. tussis arida nō admodum crebra diuexat: colore herbaceo ægri tinguntur: si largius colorentur, in auriginem incidunt, in albidum vergentes: somni haud ita visis imaginibusque vacāt. Prudētes verò cū sint in omnibus, in aliquo tamē ad tempus oblato repente delirant, ad seque protinus reuertuntur. Tumor sub māmīs, aut sub costis oritur: multi autē membranæ peritonæi tumorē esse falso crediderūt. Verū si tumor sub spuris costis fiat, cū premitur, dolor excitatur: iecur intumescit. humiditate nanq; refertum est. At si non sub osse remaneant, inflatur membranæ signum. Et ipsius quidem circumscriptio & fines patent: post enim fibrarum circumductum in vacuum abdomen comprimēs

manus descendit ac subsidet. Peritonæi
verò interminata duritia est: & extremi-
tatis processus nequaquā cernitur. Por-
rò si ad interiora subit abscessus, longè
medico natura præstat. aut enim ad in-
testina, aut ad vesicam pus cōuertet. ve-
rum multo innocentior est in vesicam
via. At si extra feratur abscessus, ipsum
non secare utique malū est. nam si præ-
termittatur incisio, à pure iecur erodi-
tur, nullāque mortis dilatio est. Si seca-
re autem malis, profluuij sanguinis pe-
riculum instat, statimque hominē perdi-
contingit. nam sanguinis è iecore pro-
fusio coerceri nullo modo potest. Igi-
tur si aliquando necessario ad sectio-
nem venire cogeris, vstorium ferra-
mentum candens perspicuūque ab
igne accipito, & vsque ad puris locum
intrudito. idē enim tibi & secat & cō-
burit. Quòd si homo periculum euadit,
tum pus album effluet, concoctum, læ-
ue, olidum, quoniam crassum est. istis
febres & acerba remittunt, omniāque
facile mulcebuntur. Verum si in in-
testinū pus effunditur, ex aluo primum

DE DIVTVR. LIB. I. 127

aquea feruntur, postea humori in quo
sint lotæ carnes, simila: item qualia in
torminibus, vbi vlcerata intestina sunt,
exire solent. interdum cruentum virus,
interdum cōcretus sanguis effunditur.
fertur & bilis flaua, syncera aut porra-
cea, & postrema interitum afferens, ni-
gra bilis. Si non suppurat vlcus, & malī
odoris quædam veluti putredinem ven-
ter expellit, crudum alimētum præter-
fluit ob ventriculi intestinorumque in-
temperiem. neque enim bene se habēs
iecur iterum ea concoquit. postea ignis
acer suboritur, omniāque in malū pro-
labūtur. carnes colliquatione tabescūt,
motus arteriarū parui sunt, & ægra spi-
ratio. vbi haud ita multo pōst vitæ finis
imponitur. Cæterum quibusdam dif-
ficultas quidem intestinorum vlcusque
sanata sunt, morbus tamen in aquā in-
tercutem desit. Quod si omnia remit-
tantur, pus album sit, læue, æquale, ino-
dorum, venter deiciat, & cibaria con-
coquat, homo in bona spe est. Optimū
verò est per lotiū crisin fieri. hac enim
securior est, minúsque maleficus puris

transitus. Verum si à phlegmone iecur
nō suppurat, nemini dubium fuerit, tu-
more. n. durum subsidētem in scirrhū
mutari ac stabiliri: quando continuus
dolor non infestat: cūque adest, ob-
tus inērsque sentitur: rara verò & ca-
liditas: à cibis alienatio, ab amaris dele-
ctatio, à dulcibus contristatio: horrore
afficiuntur: subalbicāt, virent: lumbi ac
pedes tument: facies corrugatur: venter
squallet: deiectiones crebrę fiunt. malo-
rum autē colophon aqua intercus. Post
aquam intercutē, si multa vrina & cras-
sa feratur, multūque in ea limosi sub-
sideat, & cum impetu erumpat, humorē
illum intercutaneum effluere posse spe-
randum est: si tenuis autem, subsidētia
carens, paucāque vrina exeat, aquā in-
tercutē auget fouētque. Quòd si pri-
stinas vires natura recipiat, & quando-
que per vētre[m] cum impetu materia
deturbet, post multorū, crassorū, aquo-
sorūque depulsiōē & ipsum hydro-
picum morbum tollere consuevit. Ve-
rum id genus auxiliij cum periculo est:
post enim subitas & copiosas inanitiō-
nes,

DE DIVTVR. LIB. I. 129

nes, extremosque casus prostratis interdum viribus, quemadmodum in sanguinis profluvio accidere solet, agri interierunt. cum minori autem noxa morbum sudor, si liberalius effluat, dissolvit. Hydropici nanque haud ita multum in summa cute humectari solent. atque morborum iecoris hic finis est. Quando in iecore pus nascitur, *

Adolescentes, & qui usque ad consistentem aetatem perennerunt, his vexantur morbis: mulieres minus his patendis expositae sunt. Huiusmodi vitiorum causae numerantur, vitium intemperantiae, & longa valetudo. praesertim post difficultatem intestinorum, & colliquationes. quandoquidem & eos syntecticos, id est colliquatos nominarunt, qui post ulcera iecoris tabefacti moriuntur.

DE LIENE, cap. XIII.

Leni familiaris longus morbus est, quem scirrhum nominant. Purulentia vero haud ita facile, quandoque tamen efficitur: cum dolor non asper, tumor au-

tem ingens spiratione maior exoritur. Siquidem in dextram partem ad iccur usque tota communione increfcere visus est. vnde multi vt fallerentur in causa fuit, tanquam nō lienis, sed membrana affecta efferet. nam peritonæon quod Græci vocant, inflammatione occupari isti existimant. contumax autem atque inadomitus instar lapidis tumor est. talis plerunque à scirrho lienis efficitur: quando & ambiguitas difficultasq; maxima simul adest. Verum si forte suppu- ret, tractabilis est utiq; & in parte summa, vbi puris quoque creatio est. tactui cedit. quando verò pus non ducit, tactui omnino resistit. Porro nonnunquā scirrhus totus super ventrem suspensus est, in hanc atque in illā partem, prout impellitur, delabens: donec, pusillus cū sit, locum ad fluitandum habet. Adest nausea & anxietas: maxime cum instat eruptio. Incrementi autem notæ sunt febres, dolores, & horrores, multoties enim horrent: nonnunquam verò non horrent, cū breui caliditate & dolore vacent. hac de causa interdum & in sple

ne abscessus oriens latuit. rarum enim, & sensu carēs in sanitate quoque viscus est. Turgēt isti, atque humoris, tanquam hydropici, pleni sunt, atro colore viridi admixto suffusi, ægre omnia patientes, pectore veluti pondere oppresso graviter spirantes. evidens enim malum est. vsque ad superiora spiritu venter impletur crasso, caliginoso, humido quidē ad speciem, cū tamen non sit humidus. tussis adest, multūque irritantur, sed pauca sicca extruduntur. Venter si quē infra depellit aquosa, primò paulū subleuat, deinde si largius deicit, hominem quidem tabefacit sed nihilominus iuuat. At si & abscessus ruptus fuerit, pus utique purum & concoctum nunquam excernitur, sed subalbidū & cinereum, quandoque fæculentum, aut liuidum. quòd si & profundior abscessus fuerit, nigra etiā fertur humiditas: quando & aliqui succi lienis, qui simul tabescit, particula exprimitur. Quibusdā præterea & integræ lienis partes exierunt: siquidem & natura dissolubilis lienis est. Cæterum si morbus vlcerenō

substitit, sed in longum tempus extrahitur, cibos auersantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu fœdi, multis vlceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent. rotunda, liuida, concaua, sordida, ægre sanabilia vlcera sunt. sicque demum tabefacti interiере. At in exiguo tumore cum duritia & renixu indolentia est. vnde fit, vt isti lōgiorem vitam ducant. Verùm si ab affectu superentur, aqua intercus, aut phthisis necessario sequitur: & corporis eliquatio superuenit. atque iste sanè pernicipiei modus ipsos è vita migrare compellit.

Iuerei ac iuene: facillè calamitatem hanc patiuntur, facillèque inde liberantur. senes verò non facillè utique læduntur, sed affecti euadere interitum nequeunt. Quinetiam seniores quidam nesciētes ipsi vitio lienis absumpti sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque ægritudo tabidos facit: & iuuenibus ocium maximè nocet, quicumque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidireque tradant: loca palustria, aquæ

DE DIV TVR. LIB. II. 133

exuberâtes, falsæ, virosæ. Inter anni tempora ferinus autumnus.

DE MORBO REGIO,

cap. XV.

SI bile flaua, vitellina, aut crocina, aut nigra cū viridi mixta omne corpus à viscere suffusum sit, affectus hic à Græcis icterus, à Latinis regius morbus, siue arquatus, siue aurigo dicitur. Difficile vtrique in acutis malum est: quia nō solum ante septimum apparens, sed etiam post septimū infinitos necauit. raro autem ad extremum febrem bene indicauit: ipse verò haud facile discutitur. Neque vitio iecoris tantummodo prouenit, vt nonnulli medicorum existimant: sed & ventriculus, & lienis, & renes, & laxum intestinum in causa sunt. & ab iecinore quidem nascitur, si phlegmone, aut scirrho viscus illud opprimitur, à solito tamen munere non impeditur. creatur enim in iecinore bilis, eamque in iecinore posita vesica secernit. Verū si meatus ad intestinum bilem deferentes phlegmone, aut scirrho in-

terclusi fuerint, vesica autem exundaue-
rit: bilis retro labitur. Cū sanguine igitur
miscetur, qui per totum corpus dis-
surrens, secūmque bilem vehens in om-
nia membra diffundit: atque ita cor-
poris species bile tingitur. Stercora ve-
rò albida sunt, & argillam referentia.
neque enim bile colorantur, quoniā hu-
moris eius affluxu carēt. idcirco & vē-
ter valde siccus est: siquidē bile nec ma-
det, neque stimulat. color autem ad
albedinem vergit. Si morbus regius ab
liene ortum habeat, color est ater cum
viridi mixtus. ipsius enim atra bilis ali-
mentū est: cū sanguinis atrī effigies
quādam ac simulacrum sit. cuius pur-
gamenta non suscipit, neque elaborat
lienis ægrotans. inde fit vt per omne
corpus cum sanguine dilabantur. Pro-
pterea lienis arquato laborantes cum
viriditate quadam nigricant. ipsorum
quoque consueta stercorea nigriore co-
lore imbuta sunt. nam quod alimenti in
splene abundat, ad vias exitus tanquam
recrementum propellitur. A laxo etiam
intestino & ventriculo arquatus proue-

nit. vbi concoquēdi facultas in ventri-
culo & laxo intestino, quod Græci co-
lon nominant, læsa fuerit. nam & in co-
lo concoctio efficitur, & ab ipso alimē-
tum in iecur digeritur. Igitur si aliud
alimentū crudius iecur susceperit, pro-
prium quidem elaborat, & cōficit, alic-
nū verò dimittit. sanguis enim qui di-
stribuitur, coli cessationē atque inertia
retinēs, in omnē partē labens eam disse-
minat. in colo autē cruditas ipsius bilis
effeatrix est. Hūc sanè in modum ab om-
nibus visceribus arquatus oriri poterit,
non modo ab iis quæ iecori escā sugge-
runt, sed etiam ab iis quæ à iecore su-
scipiunt. Neque enim per canales dūta-
xat sensiles, sed multo copiosius per ha-
litus natura in omne corpus alimēta di-
stribuit. qui à tōto in totū natura ipsos
per solidas ac densas partes dirigēte di-
scurrere facilè queunt. gignuntur itaq;
halitus bile infecti: & corpus, vbi insede-
rint, colorāt. Nempè per aluū laborante
colo non fit albida excretio: iecur enim
creandis succis nullam noxam patitur,
exitūque bilis ad intestina patentem

habet. Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandum sum-
mopere efficax est. habet enim & in to-
to causam, quę huiusmodi est: In omni-
bus corporis partibus calor ad conco-
quendum insitus est: in omnibus item
humorum est creatio ac separatio. sed
aliorum alia, singulis autem propria.
ut puta in carne sudor, in oculis lachry-
ma, in articulis & naribus mucus, in au-
ribus cypselis Græcè dicta, Latini auriū
marmorata, seu cerumina vocāt. Itaque
si ad singula obeunda munera calidum
fatigatū lassatūque fuerit, ipsum qui-
dem in acre atque igneum vertitur, hu-
miditates autē omnes in bilem abeunt.
ignis enim opera amara & bile infecta
sunt. quod si & in sanguine cruditas in-
cidat, sanguis biliosus efficitur, & quo-
quo versus nutriens dispergitur. Pro-
pterea & ubique bilis conspicitur. Planē
acerbum id malum est, color verò spe-
cie horribilis. etenim colore aurum re-
præsentant: sed non hominē decet, quod
in lapide pulchrum fuerit. At superua-
cuum mihi videtur, unde id nomē iste.

DE DIVT VR. LIB. I. 137

rus tractū fuerit, explicare: praterquam
à terrestribus feris quadrupedibus, quas
Græci ictidas, Latini viuerras, aliqui
martes vocāt. & syluestris mustellæ spe-
cies est. his enim bestiis oculi huiusce-
modi colore tincti sunt. Dug sunt huius-
ce labis species aut enim in flauum cro-
ceūque vergit, simulq; albicat & vi-
rescit: aut in liuidum nigrūque decli-
nat. atque adeo istorum causa & ipsius
bilis causa est. Aliqua enim bilis flaua
est, subtilis, perspicua, tenuioris generis:
aliqua magis colore saturata, vt crocū,
aut vitellum eiusdem speciei quis affir-
met. Secunda bilis species nigrioris co-
loris est, porri, aut issatidis herbæ colo-
rem referens, atra. inter hæc extrema
infinitæ sunt colorum varietates. penes
autem calorē atque humiditates ista-
rum mutatio fit. Quinetiam viscera hu-
iusce varietatis causæ sunt: vt puta si fla-
uum viscus sit, quale iecur est: aut liui-
dum, qualis lienis. Quocirca si ab ali-
quo viscere arquat' oritur: à iecore qui-
dē iecoris notæ sunt: à liene, lienis: sin-
gulorūque, vnde oritur, membrorum

indicia apparent. Si nullius membri signa videantur, vniuersi habitus ægritudo est. Perspicua vero sunt & ea quæ in albisimis oculis cernuntur. Frontis autem secundum tempora, in corporibus naturaliter albis præcipuè, & in paruo arquato color exquisitior efflorescit. Porro quicunque nigro arquato laborant, in his ater color viridi commixtus apparet. iidem frigēt: imbecilli, desides, tristes atque demissi animo sunt. tetrū odorē exhalant, gustatum amarum habent: spiritus non facile ducunt: in ventriculo morsum percipiunt: alui excrementa porracia, subnigra, arida sunt, ægréque descendunt. vrina bene colorata est, ad nigrius vergens. ad hæc cruditate laborant, cibum detestantur, vigilant, mœrent, melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & viridi temperatus: mente sunt hilariores: cibos accipere primò eos piget: sed vbi cœperunt, nauiter comedunt, facilius quàm priores concoquunt: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea. lotium reddunt flauum, pallidum, cro-

cinum. In vtrisque corpus omne pruriginosum est: calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam biliosum distrahit laniatque: gustatus amarorum quidē non amarus, quod mirum est, non tamen dulcis: dulcium verò amarus. in ore ranque bilis in lingua residens, & prius cibis occurrēs sensum hunc ludificatur ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos nō sentit. atque antea quidem ieiunij tēpore bilis quiescit: neque idcirco lingua propter consuetudinē ægre fert: verūm si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis obiecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, amari sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. bilis enim sensio preuertit. Falluntur autem qui amara videri dulcia existimant. res enim haud ita se habet: sed quoniā membrum amaro aliquo delibutum duntaxat propter morbi cōsuetudinem amaritiam non percipit, ideo speciem dulcescētis repræsentat. verūm in dulcibus & amaris cibariis idem status reperitur. fallacium igitur ciborum velamentum

bilis est. Vtique si nullius visceris calefactio evidens fuerit, plerunque sine noxa arquatus est, sed diuturnior. si perseverauerit, atque insuper viscus inflammatione vexatū fuerit, in aquā intercutem, & malum corporis habitum ut plurimum definit. Plerique & sine aqua intercute colliquati interiire. Id malū adolescentulis iuuenibūque familiare est: quibus & minus officit. Tueris autē non admodum inusitatum, non omnino tamen innoxium est.

DE CACHEXIA, SIVE

malo corporis habitu,

cap. XVI.

OMnium simul vitiorum malus habitus conuersio est. Siquidem ab omnibus morbis propagatur & emanat. Verum & ipse solus citra alios morbos materiam multū lutulentam nactus, à principio noua aegritudo gignitur. Et habitus quidem malus, simplex, cōmunis est, & symptomata multa comitantur: nomenque ipsum significāter inditum est.

DE DIVTIVR. LIB. I. 141

Gracilitas verò, aut pallor, aut tumor,
& si quid aliud infit, ad tempus durās in
corpore exoritur: malus autem habitus
vnius ingentis affectus species est. eique
nomen tale fuit impositum. Nam homi-
nis ad omnia bonus habitus est: & ad cō-
coctionem, aut ad distributionem san-
guinis creatio, atque omnis naturæ fun-
ctio inde prouenit. hæc consequitur fa-
cilis spiratio, validæ vires, florid⁹ color,
sed prima omnium sanitas. Quòd si ad
imbecillitatem vitiosorum corporis hu-
morum, quæ caco-chymia à Græcis di-
citur, natura conuersa fuerit, id iam ma-
lus habitus est, quem Græci cachexiam
nominant. Valetudo hæc vix sanabi-
lis est, malūque longissimum. longo
enim tempore acquiritur, neque ab vno
corporis vitio, neq; ab vno viscere pro-
diens. sed omnium est in deterius con-
uersio. Quocirca ab hac enascētes mor-
bi inuitabiles sunt, vt puta aqua inter-
cus, aut phthisis, aut eliquatio. Siquidem
& mali habitus causæ colliquationis ger-
mane sunt. Morbus autē in multū tem-
pus extrahitur: intestinorum difficultas

adeſt continua: quibuſdam morborum reuerſiones eueniunt. bene utique cibos appetunt, tametſi multos ingerant, ac repleantur: crudi vero & nō cōfecti digeruntur. quoniam alimenti elaboratio ad coctionem pertinens, debilis admodum atque inualida eſt. Labis huius cauſae ſunt & ab hæmorrhoidibus quas vocant, venis eſſuuij ſuppreſſio, & viſitatorum vomituum retentio, & ab exercitationibus quies, & ſudorum exiccatio, & ab ingētibus laboribus ocium. quando enim horum ſingula, quę aderant, non amplius reuertuntur: tunc ſequitur corporis grauitas, pallor ſubinde repetens, venter flatibus reſertus, oculi concaui, ſomni graues torporem afferentes. Verum enim uerò hæc ſi erraticę, & non ſtatim temporibus ſiant, morbi inconstantiam inſirmitatēque ſignificāt: ſi autem exactis radicibus maneat, neque deſiſtere velint: ingētis mali nūcia ſunt. Stantibus pedes tibiaęque intumeſcunt, decūbentibus autem partes decliues atque iacētes. Quod ſi deſubitum mutauerint, tumor in illas de-

cūbentes partes deuoluitur: humidique aut frigidi in grauitatem fit circūstus. nam si calor humidum euaporet, id verò nō effundatur, postea delabetur. Multos utique cibos appetunt, edaces admodum sunt: celerior concoctione distributio fit crudiorum magis q̄ inconcoctorum. nutritio non perficitur. Sed hoc inde prouenit, quoniam in toto alimentum à natura non concoquitur. in ventre enim atque in omni corpore caloris imbecillitas eadem est. quapropter neque optimus, neque boni coloris sanguis procreatur. cūque crudorum succorum omne corpus refertum fuerit, & ciborum appetentia euanescat: sic malo habitu vsque ad ventriculum grassante, & affectu iam summam potentiam obtinente, tunc sanè tumidi fiunt, imbecilli, & ad omne opus abiecto prostratōque animo. Alius ficcior est: plerunque recrementa bile priuata, alba, aspera, crudaque deiciunt: corpore squalent, sudore carētes & pruriginosi. somnus nequaquam firmus est, sed decūbentes cōniuent tarde spiritū ducunt: arteriarum

motus languidi sunt, debiles, frequētes: post quālibet autē vel exiguam actionem frequentissimi fiunt. Post hanc respiratio cum anhelitu fit: venę in temporibus elatę apparent: partes enim quę circumiacent, emarcuerūt. verū & in brachialibus longe grādiore inflatio-
ne venę redditę sunt: sanguis atro colore viridi admixto infectus est. Ab his phthisis, aut colliquatio hydropē anasarca vocatā, aut ascitem adducit: istorūque procreatio inevitabilis est.

• A Etates huius morbi feraces sunt in primis sehectus, neque mortem euadūt. Pueri & celeriter pati idonei sunt, & liberantur facilius. Florentes ætate haud ita valde huic malo patent, non tamen penitus facilē sanantur. Tempus anni non vnum hanc fert ægritudinem, neque vno tempore finitur: verū autumnus cōcipit, hyems alit, ver ad ultimam vehementiam perducit, æstas verō interficit.

ARETAEI CAP
padocis medici

DE SIGNIS ET CAUSIS
diuturnorum morborum,
Liber secundus,

IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.


Hæc insunt in hoc libro.

| | |
|-------------------------------------|------------|
| De hydropē, | cap. I. |
| De diabete, | cap. II. |
| De affectibus renum, | cap. III. |
| De vitiis vesicæ, | cap. IIII. |
| De seminis effluuiō, | cap. v. |
| De stomachi vitiis, | cap. VI. |
| De ventris affectu, | cap. VII. |
| De dolore intestini coli, | cap. VIII. |
| De difficultate intestinorum, | cap. IX. |
| De læuitate intestinorum, | cap. X. |
| De affectibus vteri, | cap. XI. |
| De articulorum & coxendicis morbis, | cap. XII. |
| De elephantiasi, | cap. XII. |

K

DE HYDROPE, HOC EST

aqua inter cutem, cap. I.



Qua inter cutem, quā
Græci hydropa vocāt,
iniucundum aspectu
vitium est, & toleratu
difficile. ab ipso enim
perpauci liberantur:
icq; felicitate quadam, ac Deorum po-
tius quā artis auxilio. Maiora enim
omnia vitia soli Dij medicantur. Nam
aut in viscere primario morbus delite-
scens totum in malum habitum conuer-
tit, aut omne corpus ingruente pestilen-
tia in malum succum viscera permuta-
uit. quādo sibi vtraque vicissim ad per-
niciem suffragantur: nullaque est pars
noxæ carens, quæ vel modicam naturæ
opem afferre possit. Est autem ad hume-
ctationem fluxio frigida, crassa, qualis
est nebula vniuerso: aut cōuersio ab hu-
mida & frigida causa in talem habitum
hominem permutante. Neque enim in
inferiori ventre fluctuans humidū hy-
dropa nuncupamus: quandoquidem ne-

que ibi vitium est: sed cū morbū consequitur tumor, inflatio, coloris fœditas, iste in aquam habitus colliquescent hydrops & est & appellatur. Nā tametsi nonnunquam foras sponte aqua prorūpit, aut aliquis præcordia rescindens effundit: adhuc in sede sua permanent hydropici. Princeps itaque causa malus habitus est, species autem plures. verū & eius nomen aliud atque aliud. nam si sit humida suffusio, quæ in ilibus fluitet, & præ inflatione, cū verberantur, tympanum quodammodo referant, tympanias nominatur: at si aqua copiosa in peritonæo continetur, natantq; in humore intestina, ascitem eam cognominant. si autem ilia nihil istorum habeant, sed omne corpus intumescat, si ex alba pituita crassa, & frigida, phlegmatias ei nomen est: si in humorem sanguineum, aquosum, tenuem, carnes liquidæ fuerint, hydrops anasarca generatur. prava quidem est harum singularum constitutio, peior autem multo ipsarum permixtio. Nam earum quæ in ilibus sunt, vna vni earum quæ totum corpus

inflant, sociari nonnunquam consuevit. Difficillimus est autem tympanias cum anasarca vocato copulatus. Ex occupantibus enim illa, tympanias ascite improbius est: ex intestatibus verò totum corpus, leucophlegmatias quam anasarca benignior. Mitis quidem ut in desperatis morbus est, si minor species cum minori pariter coniungatur: peior verò, si aliqua ex minoribus cum altera ex maioribus admisceatur. Quòd si duarum maiorum mixtio exactè facta fuerit, gravius inde malum exoritur. Notæ autem maximæ sunt, & visu, & tactu, & auditu facillimæ. In ascite nanque in ilibustumorem, in pedibus nflationem videre licet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intumescunt testes, præputium, & totus colis ob inæqualitatem tumoris tortuosus est. tangito verò, & aliquam in partem manum imprimens: intrò moderate pellito. ad alias enim partes humiditas transluet. Verùm etiā in corporis ad alterutrum latus conuersionibus humor in locum declinans & tumorem & fluctuationem facit, flu-

Quantisq̃ue liquoris sonitus exauditur.
 quinetiam sicubi digitum impegeris, lo-
 cus cauus efficitur, & multum temporis
 cauus perseuerat. Hæc utique ascitem
 signa declarant. Tympanias autem vl-
 tra tumoris spectaculum, etiam auditu
 sonorus est: nam ad palmæ percussum
 abdomen sonum edit: neque ad corpo-
 ris conuersionem spiritus locum mutat.
 etsi enim locus ambiens aliquorsum in-
 clinat, spiritus tamen æqualis supra &
 infra vbique permanet. Cæterum si in
 nebulam & aquam spiritus vertatur,
 (nam ascites ex tympania gignitur) si
 non perfectè mutatus aliquando fuerit,
 ex dimidio factus in ventre fluitat. Cæ-
 terum anasarca & leucophlegmatias
 ilia inania occupant: tumidam faciem
 & brachia reddunt: & quæcunque in a-
 liis vacua sunt, in huiusmodi agrotis op-
 plentur. Quandoquidem in leucophle-
 gmatia alba pituita, frigida & crassa
 redundat: hac omne corpus impletur: fa-
 cies, collum, brachiaq̃ue tumescunt: ab-
 domenq̃; ex inflatione crassescit. mam-
 mæ quoque in tumorem excitantur il-

lis scilicet, qui iuuenes robusti in ætatis
prospera fortuna cōsistunt. At in hydro
pe anasarca vocato, carnis liquamētum
fit in succum speciem carnis referētem:
saniesque cruenta, qualis ab intestino-
rum vlceribus emanat. talis verò & à
membris aliquo graui, quod superinci-
derit, contusis, si paulum superficiem se-
cueris. humor effunditur. Ex duab⁹ qui-
dem speciebus permixtio ambarum in-
dicia obtinebit. Omnibus verò simul
inest pallor, spirationis difficultas, tuf-
fis. diuersis temporibus segnes sunt: pi-
gritia multa, à cibo alienatio. quòd si a-
liquid assumant quanuis modicum, &
flatu carens, nihilominus valde inflan-
tur: distentiones patiuntur, quales ex sa-
turitate fiunt. citra madorem eorū cor-
pus est: iccirco neque in balneis fudore
madescent. præterea albidifunt, & ef-
foeminati. Anasarca laborantes colore
ex atro, viridique permixto infecti sunt:
obscurasque & nigras venas habent: in-
ascite atque tympania conspicuæ at-
que admodum euidentes sunt in bra-
chialibus atque in abdomine. In ana-

sarca verò atque phlegmatia tumore omnia delitescunt: somni sunt graues, torpentes, breues, animæ deliquium, circa minima quæque sollicitudo, viuendi cupiditas. tolerantia non ex animi alacritate, ac bona spe, vt in iis est qui prospera fortuna vtuntur: sed ex ipsa morbi natura. neque causa dici potest, sed mirari tantum id licet, quod me Hercule magnum est. nanque in aliis haud omnino perniciosus affectibus ægrotantes abiecto sunt animo, tristes, mortis amatores: in his vero & bene sperant, & vitæ cupidi sunt. Ambo hæc contraria morbi efficiunt. Aqua inter cutem nonnunquam à copioso frigide potu continuo prouenit, cum præ nimia siti ad saturitatem quispiam multam aquam gelidam ingurgitauerit: postea humidum in peritonæum delatum sit, atque inde in ventribus insitus calor refrigeratus fuerit. deinde in ilia guttæ effluunt, quæ prius in aerem versæ per transpirationem digerebantur. Id igitur si incidit, facilius est huius morbi curatio, ante quàm viscus aliquod, aut totus homo affectus sit.

Ceterum & ventosus cibus, & cruditas,
& buprestes aqua intercutē pepererūt.

Est hæc omnibus communis calamitas, viris, mulieribus, cuicunque ætati: præterquam quod alij in aliam speciem sunt propensiores. In vocatam anasarcam, & leucophlegmatiam pueri: Iuvenes autem ad consistentē usque ætatem inundationi illi obnoxij sunt. At senes omnibus quidē generibus sunt expositi, cum inopes sint caloris: frigida enim senectus est. verum ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt. ipsis igitur tympanias accidere consuevit. Omnes quidem species prauæ: hydrops enim morborū omnium vitium est: sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur: nā multæ & variæ sunt eius tollendæ prosperæ occasiones, fadoris aut lotij excretionē, aut alui nonnunquam in huiusmodi ægrotantibus copioso effluuiō, iam abeunte aquæ intercutem habitu. Difficilis autem tympanias est, adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim medicum hoc in morbo totum hominem permutare.

DE DIVT.V.R. LIB. II. 155

Quod per Iouem neque diis ipsis facile fuerit. Nonnunquam & exigua in parte homo aquam inter cutem patitur: vt secundum caput in eo morbo qui hydrocephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut iecinore, aut liene, aut in mulierum vtero. & cæteris hæc species sanabilior. Nam si eius ostiolum à priori cōclufione hiare cœperit, humorem quidem si habeat, effundit: si spiritum, efflat. quod si vterus anasarca laboret, plurimum tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quædam hydropici morbi species talis agnoscitur: in ea vesiculæ quædam pusillæ, cretæ, humoris plenæ in loco vbi ascites fieri solet, excitantur. Cæterum, quod humore multo refertæ sint, illud indicio est, si abdomen perforaueris, parum admodum humoris effundes. Ab interiori nanque parte vesica occlufit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succus emanabit. Hæc utique aquæ inter cutem species haud levis est: vnde enim id genus vesiculæ eruperint, via haud facile reperitur. Alij nanque affir-

mant huiusmodi ampullas per intestina transisse. Ego verò id nunquam vidi: idcirco neque nūc scribendo affirmo. nam siue ex intestino colo, siue ex ventre ferantur, qualis sit ipsarum generationis modus, quid dicam nihil certi habeo. iter enim ad omniū excretionem per sedem lubricum, ac patens est. at ipsius humoris in ilibus collecti per intestinorum rupturam egressio credi non potest. neque enim innoxium, neque citra perniciem intestini vulnus est.

DE DIABETE, SIVE VRINÆ profluvio, cap. II.

Diabetes qui vocatur affectus, miraculum quoddam est, haud ita saepe hominibus vsitatus, carniū, ac membrorum in vrinam colliquatio. Frigida atque humida, vt in aqua inter cutem, causa est. Transitus autem consuetus renes & vesica. Neque enim cum intermissione lotium reddunt: sed perinde atque canales laxati sint, indefinēs est profusio. Diuturna est huius morbi creatio, & lō-

DE DIVT VR. LIB. II. 135

go tempore parturitur. Brevis erit autem hominis vita, in quo affectus iste perfectus fuerit: velox enim est colluctatio, & festina interdum mors aduenit, & vita fœda est, ac vexata doloribus. Sitis intoleranda est, potus copiosus, multitudini tamen lotij non respondens. copiosius enim lotium redditur: neque eos quisquam neque à potu, neque à mictu inhibere potest. Quòd si vel punctum temporis inhibeantur, si quidem à potu os siccatur, corpus arefcit, viscera ipsi sua conflagrare opinantur, omnia fastidiunt, de omnibus dubitant, haud multo post mortē obeunt, ardentissima sitis adest. Mictum verò quæ ratio suppresserit, aut quæ verecundia dolore potentior? Si autem vel parum temporis à meiando abstinuerint, intumescunt lumbi, testes & ilia: cūque remiserint, lotium quidem calefactione profundunt, tumidæ verò partes detumescunt: in vesicā enim confluit exundatio. Cū morbus iste iam perfectus est, facile omnes eumprehendunt. Sed cū futur⁹ est, os humore priuatur:

saliva est albida, spumans, perinde atque
in siti: nondū tamen sitiunt. prae cordia
gravia sunt. calorem aut frigus à ventre
in vesicam tēdere sentiunt, prout ad en-
tantis morbi processus est. quinetiā pau-
lo plus lotij quā moris erat, effundi-
tur: sitis adest, sed nondum vehemens.
Cūque amplius cremētum accipit, ca-
lesfactio parua quidem, sed mordax vi-
sceribus inhærens exoritur. abdomē ha-
bent rugosum, venas extantes, totū cor-
poris habitum gracilem, quando & vri-
nae profluuium, & sitis iam auctae insi-
gniter sunt. cūq; ad extremum colem
vitij consensus peruenerit, protinus vri-
nam reddunt: atque inde mihi huic mor-
bo diabetes appellatio indita fuisse vi-
detur, perinde ac si pertranseuntem di-
xeris, quod in corpore humor nō rema-
net: sed vbicunque in homine collectus
stagnauerit, ad exitum labitur. Durant
sanē aliquod tempus, licet nō admodū
diu: nam cum dolore meūt, atq; atrox
sit liquefactio. neque enim ex potu ali-
qua insignis portio in corpus assumi-
tur, & carniū magna copia in vrinam

DE DIVTIVR. LIB. II. 157

eliquatur. Huiusce languoris causa aliquis acutus morbus esse potest, qui hæc in partem impetū fecerit, & in crisi aliquod malignum virus latenter morbi reliquerunt. Haud incredibile est etiam aliquod perniciosum venenum ex his quæ vesicam & renes infestant, huic affectui causam præbuisse. Quinetiam si quis à dipsade morsus sit, talis morsum affectus sequitur. Ipsas autem reptilis fera si quem percusserit, sitim non ferendam accendit, isque copiose bibit, neque siti medetur, sed ventrē obruit humore: adeo inexplebilis est bibendi cupiditas. At si quis ob ventris distentionem doleat, graueturque humoris copia, & ideo paulū temporis à potu abstineat. iterum sitiens largissime bibit. Atque hæc est malorum vicissitudo: se namque mutuo sitis & potus adiuvant. Alij præterea sunt, qui lotium non reddunt: neque vlla est alia eius quod bibunt, transpiratio. itaque potius infatiabili aviditate, humoris inundatione, vétris distentione, repente ac penitus disrupti sunt.

DE RENVM AFFECTIBVS,
cap. III.

Renes substantia glandulas, quas Græci adenas vocāt, referunt: colore autem rubidiores sunt, quale est iecur potius, quàm mammæ, aut testes. nã & hi adenes sunt, verum albiores. Figura testibus similes, lati magis sunt, iuxta & retorti. Sinus habent exiguos ad lotium excolandum, cribrorum instar foraminibus peruios. Ex utroq; nervosi canaliculi tanquã fistulæ expullulant, qui in vesicæ terga utrinq; sese inferunt. æqualis est autem lotij à renibus in vesicam via. Huiusce viæ multi atque varij affectus renes, prædictosque meatus male habēt: aliqui acuti: sanguinis proflauio, & febribus, & inflammationibus iugulātes: hi verò sunt, quotquot ego ennumeravi: aliqui diuturni hominē colliquatione dissoluentes, haud lætales quidem, sed insanabiles, & vna cū ægroto commorientes. Diuturni itaq; sunt abscessus, ulcera, calculorū exortus, hæmorrhoides vocatæ. Ulcera quidem hominis ex ab-

DE DIVTIVR. LIB. II. 159

secessu facta omnia planè diuturnissima sunt, atque ægre sanationem recipiētia. Calculorū verò diuturna est creatio, cū dolore obstructions: haud enim facilis est exitus. ad hæc difficilis est & lotij suppressio. At si multi sint, & exigui calculi, sese mutuò impediētes, remorantur: aut si vnus sit magnus, locorum angustis intrusus inhærescit. Atq; si vtroque in rene hæc fieri vsu veniat, interclusa vrina, distentisque locis, paucis diebus superstites ægri moriuntur. Rectè sanè natura renum ventrem oblongum, & vrinae canalibus magnitudine æqualem fabricauit, exiguis quidem calculis ampliorem, quò superius concretus calculus expeditissimum in vesicam iter inueniat. atque ideo lapilli oblongi generantur. Plerunque enim propè vrinae fistulas id genus lapilli cōcrescunt: & quotquot eo loco fiunt, inæqualis crassitudinis sunt. priori in parte ob canalium angustiam gracilescunt, posteriori autem crassiores fiunt: quoniam renes deorsum vergunt. in solis autē renibus oriuntur, hisque igneo

calore feruentibus. neque enim sedem
in fistulis vrinae calculi obtinent, sed a-
renulae cum lotio per eas fistulas infe-
rius delabuntur, quae & indicia & ma-
teria huius affectus sunt. Quod si ali-
quando grandior effectus lapis con-
cauo renis inhaerit, tunc dolores lum-
borum circa musculos, quos psoas Gre-
ci appellant, excitantur, & ad medias vs-
que costas perueniunt. Multis sanè do-
lor iste, perinde ac si morbi lateralis ef-
fet, imposuit. praeterea grauitas adest co-
xendicis: dorsum aegre incuruatur: dif-
ficulter annunt: tormina dolores infe-
runt graua, perseuerantia: intestinum
enim siuuosum est. cumque exuat vri-
na, & distentiones increcant, ad meien-
dum, vt in parturiginibus proritantur: fla-
tuosi sunt, sed flatus excerni nequeunt.
febres adsunt mordaces, praearide. squal-
lida quidem lingua, sicca verò est aluus,
macrescunt, à cibo abhorrent: quod si
quid assument, neque concoquere, ne-
que distribuere facile possunt. Sin au-
tem in lotij canaliculum lapis incide-
rit, concussio corporis fit, vt in rigore:
calculi

calculi progressus sentitur cōmuni simul violento. Quòd si in vesicam delapsus fuerit, lotium aquosum vberius effunditur: alius deiicit: flatus inde exhalant: extensus stomachus est: ructus eduntur: à prioribus malis quies datur. interdum quoque vlcerato canali præter lotium cruor emanat. Secunda porò calamitas est, cū per colem calculus transmittitur. Nam si amplior sit, q̃ vrinæ iter, (Græci vrethram vocant) capere possit, in eo multum temporis hæseat, atque vesica multitudine vrinæ cōpletur: tūque eius maiore cum dolore suppressio fit. nam cum vesica & canales vretes vocati veluti incenduntur. Aegerrime autē tortuosi calculi exeūt: quosdā enim & hamatos vidi, in meatibusque adnatis quasdam callosas duritias. Plerunque autem oblongi propter canalium rectitudinem figurantur. At colore nonnulli albicant, argillā referentes, talesque sæpius in pueris generantur: alij flauī sunt i nstar croci, hi verò in senibus reperiuntur, quibus & in renibus creari solēt: crebrius enim pue-

L

ris in vesica lapilli oboriuntur. Concretionis autem causæ geminae sunt: in senibus frigidum corpus, & crassus sanguis. frigidum verò crassas materias celerius cogit. indicio sunt aquarum natura calidarum fontes. hæ nāque refrigeratae in tophaceum lapidem condensantur. At in pueris multum sanguinis limum elixatum generandi calculi veluti sedem ignis habet. Igitur in calculi creatione talis est affectio. Caterum nonnulli sunt qui per quosdam circuitus sanguinem meiunt: huiusmodi affectus hæmorrhoidū profluuiio similis est: similis est quoque corporis constitutio. nam valde palleſcunt, torpent, ignavi sunt, cibum fastidiunt, cruditate laborant: & cum excretus est sanguis, lægidi fiunt, membra resoluuntur, caput verò leuius & agili⁹ redditur. At si per circuitum nihil sanguinis effluerit, capitis dolore vexantur, oculorum acies hebet, tenebræ eis obuersantur, vertiginem patiuntur. Inde alij infiniti in comitiales morbum incidunt, tumidi, veluti caligine perfusi, aquam inter cutem pa

tientibus similes: alij morbo atræ bilis, aut neruorum resolutione tentantur. Nam ex cōsueti profluuij sanguinis retentione huiusmodi mala proueniunt. Siquidē à renibus defluat sanguis mundus, lotio non permixtus, plerunque tamen cum vesicæ vrina circumfusus emanat. Nonnunquam & ex renū disruptione sanguis fertur multus collectim, verum cogitur, & in grummos densatur: utque in sanguine extra corpus effuso fieri assolet, interdum utique & in vesica congelatur: quando atrociter vrina supprimitur. Ruptionē verò vlcera diuturna, atque vix sanabilia sequuntur. indicia sunt ramentum, aut membranula araneæ instar rubida egrediens, aut pus album meiendo profusum, modo purū & sincerum, modo cum vrina permixtū. Ab iisdem & abscessus dignoscēdi sunt, si vesperi febres accesserint & rigores: dolores circa lumbos, & pruritus. At si ruptus fuerit, grummi purulenti carnisque formam representantes eiiciuntur: quin etiam & albida sanies excernitur. Vlcera verò mordacia sunt, modo

repurgata, modo sordentia: id pus manifestat: vrina quoque aut olida, aut nihil olens. Ver sanguinis profluvia & abscessus parit: hyems autem, autumnusque calculos. Quod si à calculis ulcera facta sint, insanabiles inde morbi nascuntur, cita colliquatio morsque adueniunt.

DE VESICAE AFFECTIBUS,
cap. IIII.

Vesicæ morborum nullus placidus est. quippe acuti inflammatione, vulneribus, conuulsione, febribusque acutis interficiunt. Vlcus verò & abscessus, aut resolutio, aut lapis magnus tolli nequit: neque enim potione, aut medicamento frangitur, aut circunteritur: neque præter noxam exciditur. opus est enim & tenues vesicæ partes simul cedere. id verò aut eodem die hominem perdit, aut paucis diebus conuulsionibus, febribusque consumit. Nisi excidatur autem præter urinæ conclusionem doloribus, febribusque aut liquationibus homo cōtabescit. fin

haud ita magnus fit calculus, frequen-
tius lotium cohibetur: nam facilè in cer-
uicem delapsus lotij transitum obstruit.
securius autem quàm grandiores exci-
ditur, sed vesica quoque necessariò sa-
ciatur. cùmque mortis periculum eua-
ferint, in fistulam (Græci rhœada vocāt,)
prolabuntur. quod licet periculo vacet,
ingenuis tamen hominibus non est to-
lerādum, perpetuum scilicet vrinae pro-
fluuiū, siue quis ambulet, siue dormiat,
ambulantibus verò maximè iniucun-
dum. Valde parui autem plerunque ci-
tra noxam exciduntur. Quod si vesicæ
inhæserit calculus, ex colliquationibus
patefiet: sed neque dolorum, neque gra-
uitatis expertes sunt, licet vrinam expe-
ditè reddant: sin minus, & vrinae diffi-
cultas accedet. Omnes verò calculos ex
fabulosis vrinae subsidentiis deprehen-
des: & quod istis virilia sæpius arrigun-
tur. quando enim meunt, subestque cal-
culus, dolent, tractant, attrahuntque pu-
denda, tanquam calcalum cum vesica
exempturi. Anus quoque vitij particeps
redditur pruritu laborās. Prominet ve-

rò & rectum intestinum vi, contentio-
nibus, imaginatione, perinde ac si iā la-
pis excernatur. Ambo enim inter se co-
pulantur anus, & vesica: quorum vno af-
fecto, & alterum afficiatur necesse est.
propterea inflāmato podice vrinae exi-
tus clauditur: & vesica exacerbata sedes
non deiicit, licet aluus admodum sicca
non sit. Tales utique sunt ex calculis la-
bores. At sanguinis effluiū tametsi non
admodum cito enecet, tempore tamen
procedente infinitos iugulauit. Ab eo
verò grummi creantur, lotij suppressio,
& matura mors non secus atque à cal-
culis fieri compertum est. quanuis enim
sanguis tenuis flauusque est, neque val-
de crassus, neque concretus: vesica tamē
longo tempore congregat, ac eadem ca-
lesciens & elixans cogit conspissatque,
atque ita grummi efficitur, & vrinae
interclusio, quam Græci ischuriam vo-
cant, inferendæ morti potētissima. His
accedit dolor acutus, ignis acer, lingua
arida: & ab his delirantes moriuntur. Sin
autem à vulnere dolor excitetur, vul-
nus utique mortiferum est: vlcus verò

et si non protinus interficit, febribus tamen, aut inflammatione insanabile reditur. Tenuis quidem est crassitudine vesica, nervus autem substantia. quocirca neque carnem contrahit, neque facile ad cicatricem ducitur. Accedit & vrina biliosa, acris, mordax vlcere, communis victus. Vesica enim cum repletur, distenditur: cum inanis est, subsidit. in extensione igitur & contractione eundem quem & articulus affectum patitur. In articulo verò nullum vlcus bene sanat: suppurationem autem ex abscessu contrahit. Vesicae signa eadem sunt quae & in aliis membris inflammatis. Nam et si febribus rigoribusque succedat abscessus, eadem pericula impendent. Verum si pus crassum, album, non tetri odoris eiiciat, ab his orta vlcera benigna sunt. At si depascentur, faeculentam, mucidam, graueolentem vrinam reddunt. Huiusmodi agrotantibus non tarda mors aduenit. Mordax quidem vrina est, & cum dolore est eius emissio: ad summum usque colem dolor peruenit. Ipsos utique omnia etiam contraria laedunt, & satu-

ritas, & inanitio, & otium, & exercitatio,
& lauatio, & illuuias, & saturitas, & ie-
iunitas, & dulcia, & acida: cum alia alios
laedant, alios iuuent, in vnum autem con-
uenire non possint.

DE SEMINIS PRO-
fluio, cap. V.

Mortis quidem periculo vacat geni-
turae profluuium, iniucundum tamen
est & vel auditu insuauis. Nam si intem-
peries & resolutio humida occupat, ge-
nitaliaque membra, ut à frigidis, contin-
gere solet, profluit semen: neque ipsum
vel in somnis cohibere possumus. ve-
rum seu quis dormiat, seu vigilet, con-
tinens profusio est, neque id quod fit, sen-
su percipitur. Aegrotant quoque & ta-
li morbo mulieres, sed partibus illis pru-
rientibus, & cum voluptate nonnullis
genitura profunditur: quinetiam virile
coitum impudenter appetunt. Viri au-
tem nequaquam pruriunt: nam quod ef-
fluit, humidum, tenue, frigidumque est,
sine colore, infœcundum. Qui enim ge-

nitale semen refrigerata natura emiserit? Quod si iuvenes hoc vitio laborēt, omnes senilem corporis habitum induant necesse est: quippe qui segnes fiant, resoluti, exanimas, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignaui, pallentes, albidī, effœminati, à cibis abhorrentes, frigidi, membris graues & stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis sanè id genus ægrota-tio ad neruorum resolutionem (paraly-sin Græci vocant) viam strauit. Quo-modo enim neruorum facultas non afficia-tur, cū natura ad vitæ generationem faciens refrigerata sit? Atqui & genitu-ra vitalitatem impartiens, nos viros ef-ficit, calidos, articulatos, hirsutos, voca-les, animosos, ad intelligēdum operan-dūque valentes: id viri testantur. Con-trà verò quibus non inest vitalis geni-tura, rugosi sunt, debiles, acutæ vocis, glabri, imberbes, effœminati: eunuchi id manifestant. Si quis autē vir & femi-nis profundendi abstinens fuerit, robu-stus est, audax, neque vel feras expaue-scēs: testimonio sunt ex athletis tempe-

rantes. Nam & illi qui natura quibusdā præstant, ob intemperantiam deteriores multo peiores fiunt: contrā natura deteriores ex temperantia præstantioribus longè meliores euadunt. Neque sanè ab alio quopiam, quàm à genitura robustū animal generatur. Vitalis itaque genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem, & ad generādum mirificè cōfert. A satyriasi in seminis profluuium corporis status deuoluitur.

DE STOMACHI AFFE-
ctibus, cap. VI.

Stomachus delectationis, tristitiæq; princeps est, cordi periculosa vicinia ad tenorem, animique alacritatem, siue abiectionem ob animæ consensum præcipue stomachi facultas confert. hæc mihi alio loco dicta sunt. Delectationis quidem hi fructus sunt, bona cōcoctio, carnis conueniens incrementum, floridus corporis color. Tristitiæ verò istorum contraria. nonnunquam & animi abiectionem cum alimento caret, indu-

cit, atra bile vexatur, cibū refugit. Cū itaque stomachus ægrotat, escas odit & abominatur, nō modo cū offerūtur, verū etiam si non in conspectū dentur, sed eas memoria repetāt, aut anxietate, aut madore stomachi, aut eius ostioli dolore perciti. & salivam effundūt quidam, & vomitibus lācinantur, corpūsque simul ab his vexatur. Quod si ventriculus istorum vacuus est, dolorem q̄ cibi sumptionem facilius tolerat. Sin autem interdum ad alimētum capiendum accedere cogitur, id multo peius est. Labor quidem famis est, ore conterere, in deuorādo dolor, & maior conflictatio. Cæterū non erga vſitata quidem ita se habet, erga aliena verò optimè: sed quæ naturaliter habent, in contrarium mutata sunt: & omnia grauatim ferè: fugāque adest, & odium alimentorum. In interscapulis præterea dolor inheret: sed longè maior si edāt, deuorētque, fastidiunt, animi pendent, visus hebetatur, aures sonant, caput grauatur, mēbra torpent, crura, brachiāque resoluuntur, palpitant præcordia: dorsum imaginantur

versus crura moueri, aliàs alio, huc atq;
illuc sese ferri existimant, seu stent, seu
iaceant, quemadmodũ à ventorum fla-
tu harundines, aut arbores agitãtur: pi-
tuitam frigidã, aqueam reiciũt. Quã-
do verò & in biliosis redũdat bilis, isto-
rum oculi tenebris caligant: siticulosi
non sunt, etsi à cibis sitire videntur: vigi-
lant, tardi sunt, dormitant, non vero ta-
men somnoliosi qui sopore graui (coma
Græci appellant) occupantur, similia pa-
tiuntur, macie confecti, valde pallentes,
debiles, resoluti, animæ deliquium pa-
tientes, animo consternati, meticulosi,
quieti, repente tamen irascentes, valde
melancholici. nonnunquã enim in atrã
bileni, quam melancholiam Græci nũ-
cupant, id genus ægrotantes inciderũt.
Talem vtique stomacho impartiente
animæ affectũ esse oportet. Verũ ho-
mines compatibilium membrorũ igna-
ri, in quibus hæc grauissima vitia fiunt,
stomachum esse causam opinantur. ma-
gnum autem ad ea quæ dico, probanda
testimonium cordis contiguitas est, vbi
omnium principatus collocatur. in me-

dio enim pulmone cor sedet: horum autem medium stomachum coniungit:ambo verò dorso inserta sunt. propter hanc itaque cordis viciniam & dolor ille excitatur, quæ cardialgiam Græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempè morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua verò pus multum à ventre per stomachum effusum. Familiare est etiam id vitium illis qui tenui victu, & duriore coacti sunt uti: quinetiam illis qui, ut erudiantur, laborant, & eius causa multa perferunt. quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia & vigiliis macerantur, qui doctos sermones & res graues meditantur, qui victum pleniorē & varium contemnunt, sed famem pro alimentis habent, pro potu aquā, & in somnis vigilant: quibus molle cubile est nuda humus, stragula vestis, ignobilis, tunica lacera: ipsorum verò tectum est cōmunis aer: diuitiæ autem adeptio atque vsus diuinæ sapiētiae. Hæc utique ipsis eruditionis amore bona cōparantur. Cūque cibum & illum quidem ignobilem accipiunt, id vitæ tan-

tum, non saturāda famis, neque potum
vini causa assumunt: non eos abstrahit
voluptas, non vagatio & peregrinatio,
non corporū exercitatio, nec carniū cir-
cumpositio. à quo enim disciplinæ amor
non auocet? à patria, à parentibus, à fra-
tribus, à seipsis vsque ad mortem. His
igitur corporis macies adest, decolor fa-
cies, & in iuuenta senescunt, & ob con-
templationem stupidi habentur. animo
autē seueri, non ridentes, immites sunt.
Atqui ob stomachum erga cibos male
affectum citò satiantur cibo vsitato, vili
& ad manum. variis autem dapibus non
sunt assueti, & erga omnes cibos pigri
sunt. quòd si aliquem inusitatum cibum
acceperint, larduntur, omnes alios pro-
tinus auersantes. Iste est stomachi lon-
gus morbus. Inflammationes verò, de-
stillationes, oris ventriculi morsus (car-
diogmon Græci vocant) aut dolor, sto-
machalis affectus non dicitur. Hunc
morbum æstas affert: quando & conco-
ctionis, & appetitus, & omnium est im-
potentia. Inter ætates verò senectū,
quibus & absque morbo ob vitæ finem

& appetentia ad extremum peruenit.

DE AFFECTV VENTRI-
culi, cap. VII.

Ventriculus concoctioni destinatum viscus, in concoquendo laborat, cum alui profluuium, quæ Græci diarrhœam vocant, hominem premit. & est liquidum alimenti inconcocti profluuium: nisi à recenti & proxima causa vnum aut alterum tantum diem permanente oritur. præterea & totus homo debilis redditur, quia corpus non alitur, unde longus morbus, coeliacum quem vocant, efficitur, Latine ventricularis dici potest, ob concoquentis caloris imbecillitatem, frigusque ventriculi: cum liquefit quidem à calore alimentum, sed non concoquit calor, neque in succum proprium vertit, semicoctum imperfectumque relinquens, cum perfectionem assequi non possit. id verò concoctione destitutum ad prauum commutatur & colere, & odore, & consistentia. albus est enim bile priuatus color: olida excernuntur, & lu

tulenta: liquida & inconsistens ob pro-
fligatam actionem substantia est, virtu-
tem modò atque principium coctionis
præ se ferens. Hac de causa venter fla-
tuosus est, ructus assidui, tetri odoris.
Quòd si deorsum penetrrent, stridēt in-
testina, flatus erumpunt asperi, humidi,
argillofi. videtur autem ipsis tanquam
humidum quoddam effluere. Dolor vē-
triculi grauis est, aut subinde punctio-
nes referens: gracilis verò, & emacia-
tus homo redditur, pallidus, iners, nihil
ex negocijs vsitatis valenter efficiens:
sed cū ambulat, membra labascūt, tē-
porum venæ exertæ sunt. siquidē ob a-
limenti penuriam tempora habent cō-
caua, atque in omni corpore venæ in-
signes apparent. non modo enim mor-
bus iste non concoquit, verū statim ne-
que in molem corporis distribuit. Nam
haud solum cōcoctionis, sed etiam di-
gestionis vitium mihi esse videtur. Por-
rò si in incremēto morbus sit, materias
ab omni corpore in ventriculum rursus
adducit: tūc ea iam est corporis eliqua-
tio, os est aridum, superficies squallida,
nihil

nihil sudant: ventriculus nonnunquam
vt ab ardenti carbone peruritur, aliàs
tanquam à cryſtallo cōglaciatur. inter-
dū verò ſanguis in extremo vitæ discrimi-
ne conſtitutis in deiectionibus fla-
uus deſluxit, purus, nō permixtus: vt ve-
næ oſtiolum patefactum eſſe videatur.
acredo nanque venas exedit. Longiſſi-
mum & difficulter curabile vitium eſt.
etenim ſi abſque manifeſta cauſa deſiſ-
ſe videtur, iterum inuadit, vbi & ex leui
errore iam denuo ſuboritur. Per circui-
tum igitur morbus iſte reuertitur. Se-
nibus hoc malum familiare eſt, & mu-
lieribus magis quàm viris. Pueris autē
ventris eſſluuium aſſiduum eſt ob quo-
tidianam cibi intemperantiam, ſed non
ventriculi debilitate morbus aduenit.
Ex anni temporibus æſtas hoc malum
ſæpius affert, ſecundò autumnus: deinde
hyems frigidiffima, ſi proximè ad extin-
ctionem calor deueniat. Diuturnū quo-
que morbum & affectus iſte, & difficul-
tas, & læuitas inteſtinorum conſequun-
tur. Verum & largiſſimus frigida potus
interdum hanc labem progenit.

M

DE COLICIS, ID EST

intestini plenioris morbo laborantibus, cap. VIII.

Colici sanè voluulo & stropho, id est torminibus celeriter necantur. longè plurimæ sunt huiusce morbi causæ. Signa verò hæc sunt, grauitas in ieiuno, vari affectus maximè vrget: pigritia multa adest, tardi sunt, cibos refugunt, graciles, vigiles, facie tumidi. Quòd si prope splenem ægrotet colon, id est laxius intestinum, colorem habent nigrum cum viridi mixtum: album verò cum viridi, si prope iecur. ab his enim proximis visceribus malum comunicatur. Sin autem c. hum acciperint quantunvis paucum, & flitu vacantem, mirum in modum tumulantur, & difflandi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius exitus intercluditur: superius verò ructus violenter tectati neque ipsi finem assequuntur. Siqua verò parte flatus vi erumpunt, virosi planè odoris sunt, sursum petentes, & acidos ructus excitantes. Renes & vesica in partem huius doloris adducuntur: & vrina

DE DIVTVR. LIB. II. 179

cohibetur. istis alia pro aliis accedunt. Miraculum autem his maius est, quòd in testes & cremasteras, id est suspensor, inopinatus dolor inuadit. Non paucis medicorum hæc morbi communicatio in occulto est: siquidem nōnunquam & suspensiores excuerunt, propriā morbi causam eos continere opinati. quoque & his pro aliis alia fiunt. Ab hoc quoque vitio alia prodeunt, abscessus, & vlcera non mitia, aqua intercus, & phthisis, morbi insanabiles. nam à frigore & crassis humoribus, & longè glutinosa puita propositi intestini dolor exoritur. Quinetiam & ætate, & tēpore, & regione frigida & aspera hyeme prouenit.

DE DYSENTERIA, ID
est difficultate intestinorum,
cap. IX.

Superiora intestina ad cœcū vsq; tenuia & biliosa sunt: atque inde Græcè cholades nominātur. post hæc inferiora vsque ad intestini recti initium crassa & carnosæ sunt. In omnibus vlcera fiunt.

M 2

dysenteria verò est horum vlcerum species:
iccirco & varij existunt morbi. Ali-
qua etenim superficie tenuis intestina ra-
dunt, excoiationem tantum facientia,
& innoxia sunt: sed longè innocentiora,
si in inferioribus intestinis consistant:
alia paulò etiam profundiora vlcera.
verum neq; hæc immitia sunt. Alia pro-
funda, non vno loco manentia, sed ex-
dentia, glandulosa, serpentina, & sphacelū
inferentia, mortifera sunt. Venule quo-
que in hisce vlcerum passionibus circū-
rosæ apparent: & in his vlceribus stilla-
tiones sanguinis largiores cernuntur.
Alia est species vlcerum, quæ oris tu-
mentibus aspera sunt, inæqualia, cal-
losa, vt in ligno gemmā dicimus. id ge-
nus vlcera vix medicabilia sunt. neque
enim cicatricem facilè contrahunt, & fa-
cilius aperiuntur. Dysenteria causa
plurimæ sunt: principes autem crudita-
tes, refrigerationes assiduæ, acriū cibo-
rum assumptio, opsonij, quod Græci myt-
toton vocant, Latini moretum diceret:
cæpæ ipsius, alij, carniū vetustarū, a-
crium esus: à quibus postea cruditas su-

peruenit. Super hæc humidum aliquod inusitatū, vt mixtura illa, quæ cyceon Græcè dicitur: aut potio ryteō appellata: aut qualia in singulis regionibus loco vini fiunt contra sitim remedia. plaga præterea, & refrigeratio, & frigida potus intestina exulcerāt. Excrementa verò, & quæ cū vlceribus sunt, alia atq; alia in aliis atq; aliis reperiuntur. Nam si in superficie sint, ex superioribus quiddē tenuia, biliosa, inodora, præter eum qui ab intestinis fit, odorē: ieiuni autem intestini excrementa puriora, crocea, mali odoris: aliqua verò & cum alimento liquato quidem, sed aspero exeunt. at modo grauis odor ab vlcerum putredine fit, modo vt à solo stercore prouenit. Ab inferiorum autem intestinorum vlceribus aquosa, tenuia, sine odore feruntur. sin profundiora vlcera sint, saniosa effluunt subrubida, vinosa, aut instar aquæ, in qua caro lota sit: & hæc modò sola, modò cum stercore. hocque liquidum est circūfuso humore dissolutum, non infectum bile, inodorum: aut compactum, siccūque, sed ob humorem

circūfluentum lubricum deiicitur. Cæ-
terum si maiora leuioraque vlcera sint,
& in superioribus intestinis, eorum ra-
tione, à quibus, & per quæ transeunt, bi-
liosa effunduntur. sedē enim vellicant:
nam bilis acris est, cōque magis si ab vl-
ceribus effluat. bilis verò & instar vn-
guinis pinguis est. Ex profundiorib⁹ au-
tem vlceribus, sed inferioribus cruenta
manāt, crassa, pituitosa, carnosā, nō val-
de pinguis, ramētosa: vtpotē quæ ab in-
testinis abstrahātur. quinetiā & integræ
intestinorū partes commixtæ sunt. Ex-
cernuntur quoque & albida, crassa, mu-
cosa, adipis concisæ similia, humore cir-
cūfusa. hæc vtique à recto oblongo in-
testino feruntur. Nonnunquā sanē mu-
cosa tantūm vellicantia, parua, teretia,
mordaciāque egerūt, crebro surgere
cogētia, & deiiciendi cupiditatem cum
voluptate afferentia: sed quæ deiiciun-
tur valde pauca sunt. tenesmus huic vi-
tio nomē est. A cæco autem carnes lon-
gè rubicundæ, & grandes excernuntur,
circūscriptionē multò maiorem habē-
tes: in ipso enim maiora fiunt vlcera,

crnor etiam crassus, fæculētusque emanat: & hæc omnia multò quàm antè dicta fædius olent. Cæterùm postquã serpunt, & exedūt vlcera, & nullo remedio vlllo in loco coerceri possunt, à superioribus quidem nō solum exquisite biliosa, sed & crocina, spumea fecem vini referentia, & nigra, issatidis, & porri succū representantia, antedictis crassiora, atq; instar putredinis graueolentia deiiciuntur. Alimentum nunc minus cōcoctum est, solūm vt à dentibus voracius cōtritum. At si inferiora intestina vlceribus erodentur, guttæ cruoris atræ, crassa, carnosæ, rubidæ, grummosæ, nonnunquã nigra, multis modis variantia, olida, nō ferēda per sedem expelluntur: humiditatumq; exitus inuoluntarij fiunt. Nōnunquam oblōgum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deiicitur: & ignaris rei suspiciōē præbuit intestini. At negotium ita se habet, intestinorum tunicæ perinde ac ventriculi geminæ sunt, & altera alteri obliquè superiniecta est. Igitur cū earum cōnexio dissoluitur, interior tunica se-

cundum longitudinem abfistens foras egreditur: exterior sola intus remanet, & carnofa efficitur, & cicatrice solidatur: fanefcuntque homines & viuunt. id verò inferi⁹ intestinum folum patitur. in caufa eft tunicarum carnofa fubftantia. Quòd fi ex quopiam vafculo cruor emanet flauus, aut niger, purus, uò cum cibo aut ftercore mixtus effunditur: verum concretum quiddam latis araneolis fimile extēditur. in grumum enim, cū refrixit, obduratur: neque fanguinem excretum eſſe credideris. ob fonū autem multum cū fpiritu maior quàm pro effētu, excretionis eſt apparentia. Interdū & in pleniore intestino purulentus abſceſſus efficitur, nulla nouitate ab aliis internis vlceribus differens. etenim figna, & pus, & vlcerum medicatio penitus eadem ſunt. Si res duræ, carnoſæ, contritis aſperisque corporibus fimiles excernātur, abſceſſus non benigni moris ſignificatur. Nonnunquā ex laxo intestino aqua multa dyſenterix modo profluit, idque plurimos ab hydropico morbo liberauit. Vlcera

quidem intestinorum (vt paucis dixerim) huiusmodi sunt. Cæterum & ipsorum formæ, & ab ipsis purgamenta tot sunt, quot supra comprehendimus. Quæ singulis quoque ægrotantibus accidunt, explicabimus, seu placida, seu noxia ulcera sint. Itaque collectim dictum esto: si exulceratio superficietenus fuerit siue supra, siue infra, febrem non habent, nec dolorem: ac sine decubitu tenui victus ratione diuersis modis sanescunt. Sin vicus altius descenderit, in superioribus quidē mordacia tormina & actria sunt tanquam à pauca calida bile. aliis atque aliis temporibus suppurant intestina: plerunque verò suppurant, aut coctiones dimidiatæ sunt, cibos tamen nō horrent. Si inferiora ulcerata sint, lōge superioribus sunt salubriora. hæc enim humiliora intestina multò carnosiora sunt aliis: sin caua & depascentia ulcera in superioribus grassentur, febres acutæ concitatur, non emicantes, in visceribus demersæ: extrema refrigerantur, cib⁹ fastiditur, vigilia adest, ructus male olēt, nauſeabūdi sunt, bilis vomit⁹, vertigo. cūque

multa expelluntur, (ea verò biliosiora sunt) tormina, atque alij dolores magis perseverant. His accedit viriū consumptio, genuūmq; resolutio: ardore estuāt, fitibundi sunt & anxij, atra per nauseam reiiciunt, lingua est arida, pulsus pusilli, debiles. atque his germana sunt, quotquot de perniciosis vlceribus mortifera expesui. oris etiam ventriculi dolore vsque ad animæ deliquium torquentur. Quidam verò neque ex eo deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu vitam finierunt. Huiusmodi calamitates & inferiorum intestinorū corrosionibus communes sunt, si depascātur vlcera, neque eorum depastionem compescere valemus, præterquàm quòd tormina dolorésque sub vmbilico inferius, vbi vlcera sunt, percipiūtur. Formæ autem excrementorum tales sunt, quales supra posuimus. Verùm si inter initia parua vlcera sint, in longūque tempus depastio producat, alia aliis vlcera superueniunt, aliquibus mitescentibus, aliquibus in summum excrescentibus. quales enim sunt in mari fluctus,

talis est in vlceribus tépeſtas. Cæterùm ſi quando natura reſiſtere potens fuerit, ſimúlque & medicus ſubuenierit, depaſcentia compeſcitur, mortísque timor remouetur: inteſtina tamé dura, tumida, cicatricofaque remanent, & non niſi longo poſt tempore ſaneſcunt. Verum enim verò cùm ab inteſtinis cruor erúpit, ſi ex magna vena, aut arteria exeat, matura mors aduenit. neque enim aut manum intromittere, dolorémque attingere, aut medicamétum ipſi vlceri adhibere poſſumus. Quinetiã ſi medicamento ſanguinis profluuium coercetur, nõ propterea tuta eſt, ac vera mortis euafio: quãdoquidem nonnullis magna cruſta, (eſcharam Græci vocant,) decidens, venæ oſtiolum patentius efficit. Vbi verò & grūmi intus concreſcūt, intúſque remanēt, ineuitabilis morbus eſt. Incipientibus igitur ſanguinis eruptionibus ſuccurrere oportet. plerūque autem cùm futuræ ſunt, licet nõ admodum clariſ ſignis, tamen ſeſe indicant. anxietas enim adeſt, & animi ambiguitas: grauitas ea in parte eſt, quæ rúpitur:

& facies rubet, si nondum ruptura facta est. Sin autem vena proximè rescissa est, plurimum venter mollitur omnino: si satis temporis præterit, difficilius atque tardius soluitur. Huiusce qualitatis sunt intestinorum vlcera. Præcipuè nascuntur æstatis tempore, secundò autumni, minus vere, minimè hyeme. Pueris quidem, & adolescentibus ventris profluvia contingunt: difficultas autem intestinorum viris & iuuenibus. Senectæ verò agrè medicabilis est, & ad ducendam cicatricem longum tempus requirit. At vlcera exedentia senibus inusitata, sanguinis verò profusio senectæ est conueniens.

DE LAEVITATE INTE-
stinorum, cap. X.

SI à torminibus, & ab latis, valdeque profundis superiorū intestinorū vlceribus cicatrices crebre, crasse, solidaque contrahantur, stercora ex his deorsum liquida, ab alibili indiscreta prolabuntur. Intestinorū enim raritas, per quam

furfum verſus alimonia diſcurrit, à cica-
trice intercluſa eſt. Homo igitur nutri-
cationis inopia laborat, & pallor adefſt,
& infirmitas. Affectus iſte qui ab cicatri-
ce fit, lienteria cognomen accepit, ab
intestiſ ſcilicet, quæ Græci enteria vo-
cāt: & nūc quidē à cicatricibus morbus
exoritur. Aliàs verò inteſtina cicatricis
expertia ſunt, ſed conſuetudo & exerci-
tatio inteſtina profluuium pati edocēt.
In iſtis enim calidum quandoque refri-
geratū eſt: vt neque concoctionē, neque
digestionē molitur: ſed præ imbecil-
litate retinere non poteſt, omnēmq; elab-
orationē alimentū ſubterfugit. Quòd
ſi ex tēpore, & nō ſtabilis, ſed levis mo-
uētī purgatio fiat, ſimplex à cibis vomī-
tus mortū ſoluit. Sin autē aliquo tēpore
prorogetur, & in ſede firma iſtorū cauſa
permaneāt, nihil opis vomitus affert.
Morbus quoque longus, & malus habi-
tus qui decumbere nō cogit, lienteriam
peperit. Aqua intercuſ nonnunquam in
hanc ægitudine feliciter commutata
eſt, in malū ſcilicet ex malo: ſed melior
eſt ſucceſſio.

MVlieribus vterus ad purgationē & partum bonus est, sed morborū infinitorum, malorumque aceruum congerit. neque enim vlceribus tantum, & inflammationi, & fluori obnoxius est, verū etiā si totus repentē sursum versus moueatur, celerem interitum affert. Alibi quidem scriptū est, qui nam ipsius morbi perniciosi acuti sint. Diuturni vero hi: fluor duplex, duritia, vlcera aliqua innoxia, aliqua maligna, exitus totius aut partis. Fluor sanē ruber, aut albus est, forma declarat. Ruber quidē si sanguis flavus emanet, & huius species: vel liuidus, vel niger & tenuis, vel crassus & concretus, vt grummi. Albus, vt aqua, aut flavus cum pallido mixtus, vt bilis: crassus verò aut subtenuis, aut tenuis liquor, quem Græci ichora vocāt, & male olens. albus item, vt pus: sed exquisitē albus, vt album serum. quin etiam gutta cruenta nonnunquam cum pure simul effluit: mille aliæ sunt secundum ratio-

DE DIVTVR. LIB. II. 191

nem maioris & minoris istorū species. Circuitus verò modo est mēstrua purgatio, sed non ad pristinum præsriptū diem reuertitur. non multus quidē sanguis, sed per multos dies effluit. paucorum autem dierum fit interpositio, sed omnino pura. Alter est circuitus modus, sed ad certum diem: neque plurimi sanguinis est plerunque prima purgatio. bis autem ac ter purgantur per totum mensem. Tertia est quoque floris species, indefinens quidem effluuium est, & singulis diebus modicum: sed in totū mensem summa fit non admodum modica. neque enim vterus ostium claudit, sed hiat, ad effluxum humiditatis relaxationem patiens. Verum si neque intermittatur, neq; parum effluat, ob sanguinis effusionem moriuntur. Signa utique hæc sunt, præter humiditatis effluentis colores, ipsius hominis color: peruigilāt, cibos oderunt, anxietate vexantur, dissoluuntur in rubro profluuiio magis, & dolore torquentur, & in ambobus quod effluit, mali odoris est: sed modo magis, modo minus. Album enim pro-

Fluuium peius olet, siquādo maior adest
putredo. aliās autem rubrū, cūm læuius
debaechatur erosio. Breuibus sanè dictū
esto, ater fluor omnium pessimus est, de-
inde liuidus. Pallidus, albus & purulen-
tus, diuturniores quidem sunt, sed mi-
nus periculosi. Ex his ipsis pallidus dere-
rior quidem est, sed longe melior est il-
le qui cū vſitato colore mixtus est: vſi-
tatus autem est ruber, eiusque species.
Quin etiam & ipsis minus noxijs sunt
vſitati: sed re vera senioribus infestiores
sunt rubri fluxus, minimè autem puel-
lis, quibus magis albi nocent. Item alte-
ra est albi floris species, menstrua pur-
gatio, exalbida, acris, & pruriginem cū
voluptate afferens. In istis verò humor
alb^o, crassus, genituræ similis prouoca-
tur: hanc speciem gonorrhœam, id est,
fluxum seminarium muliebrem appel-
lauimus. Est autem vuluæ refrigeratio:
quam ob rem humorum tenax esse nō
potest: quin etiam sanguinem in albi-
dum colorē transmutat: vim enim ignis
rubrificam non habet. Id genus vitij &
stomachus patitur, ideo & pituitā euo-
mit.

mit. Simili affectu & intestina laborāt, cum profluuiū Græce diarrhœa vocato, agrotant. In vtero præterea vlcerā suboriuntur, aliqua lata, pruriginosa, tāquam sale inspersa: hæc sunt quædam superficiēi excoriatio. pus habent crassum, inodorum, paucum. vlcerā huiusmodi mitia sunt. His cauiora sunt vlcerā & deteriora, quib⁹ dolores parui accidunt, pus paulo plus, grauius olent: nihilominus tamen hæc quoque placida sunt. Quod si altius penetrent, & labia dura asperaq; fuerint, & sanies quædam olida exeat, & quā in superioribus dolor sit maior, exedit vuluam vlcus, & nonnunquam caruncula quædam separata egreditur. neq; ad cicatricem vlcus id ducitur, sed longissimo tempore hominem tollit: nam maxime diuturnū est. huiusmodi Græco vocabulo phagedæna nuncupatur. Nempè mortifera vlcerā sunt, si præter ipsa dolor exacerbatur, & mulier valde contristatur: & res putrida ab vlcere neque ipsis ægrotis tolerabilis emanat, efferaturq; manuum attrectatione & medicamentis, & quo-

N

libet genere medelæ exasperatur: venæ autem in vtero turgent, & proximæ simul partes distenduntur. id verò perspicacibus medicis tactu deprehenditur. neque enim aliter liquet. ceterum ignis & anxietas totius, & duritia simul, vt in feris vlceribus insunt, quæ & ipsa mortifera sunt, necnon & cancri appellationem obtinent. At cancer neutiquam vlcus est, sed tumor durus & indomitus, qui vnà totum vterum distendit: dolores quoq; & reliqua omnia quæ in vlcere insunt, cancerum comitantur. Hæc eadem verò cancerosa vtraque sunt, & diuturna, & perniciofa. Vlcerat² autem cancer non vlcerato longè improbius est, & odore, & doloribus, & vita, & morte. Nonnunquam integra vulua de fede sua egreditur, & mulieris fœminibus infidet. incredibilis calamitas: sed neque inaspectabilis est vterus, neque ingenerabilis causa. relaxantur enim mēbranae ilibus appensæ: quæ vteri sunt ligamenta nervosa: quæ in fundo sunt iuxta lumbos gracilia, quæ in ceruice hinc atque inde iuxta ilia, maxime nervosa,

DE DIVT. R. LIB. II. 195

lataque sunt : qualia nauigiorum vela
cernuntur. Omnes igitur hæ membra-
næ remittuntur, cùm vulua foras proci-
dit. plerunque sanè huius exitus mortē
affert . Accidit enim ex abortu, & ma-
gnis concussionibus, & violento partu.
At si non interficit, diu hæ vitam produ-
cunt, non visibilia videntes, extra alen-
tes vterū, atque fouentes . Videtur autē
nonnunquā duplicitatis vteri interius
succingens tunica, quando à contiguo
diuellitur. Geminae nanque membranæ
tantum sunt differentes à tunica . hæc
verò abscedit & fluxione, & abortu &
violēto partu, quando ipsa secundis in-
hærescit. Nam cùm ipsæ vi extrahūtur,
simul & vteri tunica extrahitur: verū
nisi pereat mulier, reuertens eadem tu-
nica vtero adhaesim connectitur, aut
paulum extra prominet : contegit au-
tem foeminibus mulier. Nonnunquam
vteri osculum solum ad ceruicem vsque
procidit, sed rursus intrò se recipit, si
vterus suffimenta mali odoris olfaciat.
ipsum quoque mulier attrahit, si grata
odoraamenta naribus subiiciat. *Quin-*

N 2

etiam obstetricis manib⁹ paulatim intrò recurrit, si placidè & sensim prematur: & prius remedia mitigatoria, quæ Græci hysterica vocant, id est vterina, ei adhibita fuerint.

DE ARTHRITIDE ET ischiaide, id est articulorum & coxendicis dolore, cap. XII.

C Ommunis omnium articulorum dolor est arthritis: sed pedum dolorem podagram vocamus, coxèdicum ischiada, manuum verò chiragram. Nempè aut ex tempore dolor est, si ex aliqua parum duranti causa consurgat: aut latèter meditationibus longo tēpore contractus est morbus, cum ab exigua occasione dolor & morbus accenduntur. Est autem omnium simul nervorum affectus, si auctum malū omnibus ingruat. Initio verò nervi articulorum vincula, & quæcunque ex ossibus exorta sunt, & in ossa inferuntur, dolere incipiunt. At istorum magnum est miraculum: non dolent quidem vel minimum, etiam si

DE DIVTVR. LIB. II. 197

quis secet, aut collidat: at si quis ab ipsis
doleat, nihil aliud est eis ad dolorem
citandum potentius, non ferramenta
adstringentia, non vincula, non vulne-
rans gladius, non exurens ignis. nam &
hæc assumuntur tanquam maiorum do-
lorum remedia. Quòd si quis ipsa dor-
lencia ossa præciderit, sectionis dolor,
ut exiguus à maiore obscuratur. Sin
autem iste præualeat, eos voluptas ca-
pit, priorum malorum obliuionem af-
ferens. id sanè patiuntur dentes & ossa.
Causam quidem veram soli Dij nouo-
runt, probabilem verò & apparentem
etiam homines. Est autem (ut simplici-
ter dicam) huiusmodi: Quod præden-
sum est, contactum vulnerationemque
non sentit, idcirco & ex tactu vulnera-
tioneque non dolet. Dolor enim est res
aspera sensui: densum autem non exa-
sperabile, ideo quoque est indolens. At
rarum bono sensu præditum est, & vul-
nere exasperatur. Cæterùm quoniam
& densa ingenito calore viuunt, per
hunc eundem calorem etiam sentire
possunt. Siquidem efficiens causa sub-

N 3

stantialis fit, vt gladius, aut lapis, substantialis patientis corporis pars nō dolet: natura enim densa est. Sed si caliditatis insitæ intemperatura corripitur, sensus fit permutatio. cumque ipsorum ex se ipsa dolet caliditas, ab interna sensus pulsione excitatur. natura autem in maius excedente, vel ex abundantia dolores proueniunt. At aliàs in alios articulos morbus articularis inuadit, quibusdam in coxendices, (eaque parte plerunque claudus remanet) & in alia quedam membra nonnunquam exiguis. quandoque nec in paruas particulas transit, pedes & manus. nam si maiora membra occupauerit morbum ipsum capere valentia, instrumenta illa non supergreditur. Sed si ab exiguo membro initium coeperit, mitis est, & inopinata inuasio. Ischiadis quidem a fœmore posterius, aut poplite, aut tibia initium est. Aliàs verò in coxæ cauo (cotylam Græci vocant, Latini acetabulum) dolor apparet, rursus in clunem, aut lumbos impetum facit, & omnia potius esse videtur, quàm coxendicis morbus. Ve-

rùm etiam articuli ita ferè dolere incipiunt, magnū pedis digitum dolor occupat: rursus calcē in priori parte, qua nitimur, deinde in concavum subit: malleolus autem postremus intumescit. Doloris causam non legitimā afferunt, aliqui novæ crepidæ attritum, aliqui longam obambulationem: alius plagā, aut calcationem, nullus intestinam domesticāque causam explicabit. Quin etiā ægrotis verum audientibus incredibile esse videtur. quam ob rem in insanabile affectum inciderunt. quoniam principis, cum debilissimus morbus est, medicus non resistit: qui ut temporis spatio vires acquisivit, nihil medici diligentia proficitur. Quibusdam in pedum articulis usque ad mortem residet morbus, quibusdam in omnis corporis ambitu vagatur, plerunque à pedibus in manus profilit. neque enim multum interest in pedibus ne, an fiat in manibus: cum utrique eiusdem naturæ sint, graciles, excarnes, externo frigori proximi, à calore interno remotissimi. Itē cubiti flexura, & genu cōveniunt. post hæc coxa-

rūcauitates, quas cotylas Græci vocāt,
& vocatus peristroph°. Trāsitus quoq; in
dorsi, thoracisq; musculos fit: incredi-
bilēque est quā malum serpat. Verte-
bræ dorsi, cervicisq; dolent, & in sum-
mo sacri ossis dolor inhærescit: simūlq;
omnium bos, asinus, & proprius cuiusq;
dolor. Verū etiam tendones & mus-
culi cum distentione dolorem patiūtur,
necnon maxillarum, & temporum mu-
sculi. Item communicatur renibus & ve-
sicæ. Orem admirabilem: post omnia
nares, & aures, & labia afficiuntur. Nam
quoquo versus nervi & musculi in capi-
te feruntur, dolent capitis future, & quid
doleat agrotus ignorans indicat futu-
rarum species, obliquam, rectam, trans-
uersam, posterius, ac prius. Tenuem au-
tem dolorem & in ossibus defixum cō-
queritur: vniuersam enim ossium com-
pagem morbus populatur haud secus
atque pedis, aut manus articulum. In
articulis quoque tofacea quædam coa-
lescent: ab initio quidem veluti absces-
sus occupāt: postquā verò magis spis-
santur, etiam cōcreto humore difficiles

sunt inflexiones: demum tōi solidi albi consistunt. In toto autem membro tubercula exigua, quales sunt ionthi à Græcis appellati, vari à Latinis, & maiora exurgunt. humiditas verò crassa, albicans, grandinosa est: nam & totius morbus frigidus instar grandinis est. Videtur autem caloris, aut frigoris differentiam præ se ferre: siquidem modo ex calore, modo ex frigore voluptas percipitur. At mihi placet vnicam esse morbi causam, insitam frigiditatē, vnicūque esse affectum: verū si protinus increseat, & caliditas apparuerit, refrigeratione opus est, ac talibus delectatur: & huiusmodi affectum calidum vocāt. Quod si dolor in intimis nervis demoretur, & articulus non calens collapsus sit, neque extumeat, frigidū hunc esse dixerim: in quo ad caloris reuocationem medicamenta calida requiruntur. multis autē valde acribus opus est. Caliditas enim collapsas partes in tumorem excitat, & internum calorem ad superficiem euocat. quo tēpore frigida medicamina proficient. Huic rei fidē id

facit, quòd iisdem eadem non condu-
cunt. nam quod modo profuit, id aliàs
noxium fuit. atque (vt compedio dicā,)
calore in principio, frigiditate in fine
opus est. Haud facile quidem continua
podagra gignitur: sed nonnunquā lon-
go interuallo temporis intermittitur.
tenuis enim est. Et in ludis olympicis
podagricus morbo sedato cursu victo-
riam adeptus est. Viri facilius in hunc
morbum incidūt, & ex mulieribus agi-
liores. Mulieres autē, licet rarius quā
viri, difficilius tamē hoc vitio laborant.
Quod enim neq; visitatum, neq; fami-
liare est, id si aliqua urgente causa po-
tētius euaserit, violentū cū sit, maiore
calamitatem infert. Aetas autem huic
morbo subiecta est à quinque annis su-
pra triginta. celerius quoq; , aut tardius,
prout cuiusque natura, aut victus ratio
postulat. Atroces sanè dolores sunt, sed
dolores comitantia atrociora: defectus
animæ, ad manuū cōtactum immobili-
tas, ciborum auersatio, sitis, vigilia. Si
discrimen euaserint, tanquam ab inferis
elapsi, laxiorem vitam degunt, inconti-

nentes, simplices, hilares, auari, & in victu molles ac delicati. Idcirco verò tanquam mortem rursus subituri licentiosè præfenti vita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra concessit, quibusdam in depravatam spirationem, asthma Græci vocant, Latini anhelitum. Hæc verò successio immedicabilis, atque inevitabilis est.

DE ELEPHANTIASI,
cap. XIII.

Elephanti morbo & feræ elephanti cōmunia multa sunt, & specie, & colore, & magnitudine, & victu. Verum neque ulli alij similia sunt, neque affectus affectui, neque animal animali. Nā Elephas fera longè ab aliis differt. primum quidem ingentissima crassissimæque est. magnitudo enim tanta est, ut magnū animal super aliud animal turris instar imponere queas. Crassitudo quoque tanta, quātam plura crassissima animalia inter se coniuncta vix æquare valeant. Cæterum neque specie cuiusquam admodū similē inuenias: siquidē omnes

exquisite nigro colore toto corpore
obscurantur. Nam equorum alius can-
didissimus est, quales Rhesi equi Thra-
cij: alij albis pedibus, qualis Menelai
Podargus: alij flauī, quales centum &
quinguaginta: alij cœrulei, vt illud Ho-
meri, factus equo similis concubuit
Cœruleos habens crines. ita boues se
habent, ita & canes, ita quælibet re-
ptilia, & animalia quæ super terram de-
pascuntur. Elephantēs autem soli nigri,
tenebricoso colore, nocti & morti simi-
les. Specie verò tali sunt: capita quidem
& facies fœdas habent, figura non eui-
denti, super breui ceruice, vt caput in
humeris confidere videatur: atque ideo
non euidens est. aures enim grâdes sunt,
latæ, alarum similes, ad iugula vsque &
pectoris ossa. Hæ ceruicē armosq; tegūt,
sicut nauigia velis cōteguntur. Cornua
verò mirandū in modum candida ni-
griori colori internitētia possidet ele-
phas. alij hæc dentes appellant. Hæc so-
la autem candidissima sunt, quale nihil
in vllō alio quauis candido animali
reperitur. & hæc ipsa non super frontē &

DE DIVTVR. LIB. II. 205

tēpora, qualis cornigeris natura est, sed in ore superioriq; maxilla sita sunt, prorsum versus spectātia, recta nō admodū, sed paulum in superiora retort, quo à recto detorqueri liceret, & in simis detribus pōdus extollere. Grandia utiq; cornua sunt, longitudinē extēti brachij, orgyiam Grēci vocāt, æquant mediocria. alia his multo lōgiora, duplo longiora sunt. prominentiā habet superior maxilla à labro enascentē, longā, exossem, tortuosam, serpētis similē. Duo verò in summa prominētia foramina sunt: & hæc in pulmones vsq; pertinentia natura te-rebrauit, duplicis tibie imaginē referētia. Hac sanē fistula tanquā nare ad respirationem, necnon & vice manuum id animal vtitur. poculū etenim, cū velit, hoc processu corripit, cōplectiturque, & valide retinet: neq; ab eo quispiā vi eripere posset, nisi alius sit potētior elephas. herbā etiam ad pabulū hoc quærit: neq; ore minorib;que dentibus carnes edēdo vitam ducit. prælongi enim pedes longe à terra distans animal sustinent. quinetiam breue (vt diximus) collū est.

ore igitur humi pabulari nō potest. Nō-
nunquam & cornuum ab ore processus
herbam os tangere prohibet. Itaque hac
prominentia magnum pondus haurit:
deinde quotcunque venatur, hac cōple-
xus ventri futura alimentū in os detru-
dit. Ritē igitur primi illi proboscida hāc
vocaerūt. nā πρò, id est ante se animal,
hac βόσκειται, id est pabulatur. Verūm
enimverò neque ex palude aut flumine
ore bibere ei licet. Eadem in causa est,
quòd si sitiāt, proboscidis extremā narē
in aquā demergit: deinde tāquam respi-
rās, vice aeris, multū aquæ attrahit: vbi
verò impleuit narē ceu poculū in os flu-
minis instar effundit: deinde iterū attra-
hit, iterūmq; effundit, quoad ventrē tan-
quam onerariā nauem cōpleuerit. Co-
rium habet asperum, crassissimūmq;
tumoribus inæquale, fissuras habens, ceu
semitas prælongas, aliās diuisuras cōca-
uas trāsuerfas, aliās verò obliquas valde
profundas. Totū tripodonio per simile
est. Pili autem aliis quidem animalibus
natura, aut setæ sunt, elephāti verò for-
dida lanugo est. Infinite sunt & aliæ dif-

DE DIVTVR. LIB. II. 207

ferentia inter elephātem & cætera animalia. Etenim retro versus quandoque secundum genu flectitur, quemadmodū & homo, & mammas prope axillas habet, vt mulieres. Caterum non in præsentia mihi opus est de animalis huius natura tractare, nisi quatenus ex eo & morbus elephas vocatus patefiat, quotq; ægrotantis forma huius animalis naturæ similia obtineat, agnoscatur. Morbū quoque hunc leonem vocauerūt, ob extremarū frontis rugarum similitudinē: quam partem Græci episceniū nomināt. De ea posterius suo loco dicetur. Satyriasis etiam appellatur ob malarum ruborem, atque inexplēbile impudentēque cocundi libidinem. Necnō & Hercules dicitur, quoniam eo nullus maior est, neque valentior. Magnus est quidem potētia morbus. ad mortē enim inferendā est omniū longē efficacissimus. est etiā visu fœdus, & in omnibus terribilis, quemadmodum & elephas belua. Inevitabilem quoque affert interitum: quandoquidē à mortis causa ducit originem. Ea ingeni caloris frigiditas est

non exigua, vel potius congelatio, ceu
quedã sæua hyems: cùm aquã in niuem,
aut etiã grandinem, aut chrySTALLũ, aut
glaciẽ cõuertit. hæc est cõmunis mortis
ac morbi causa. Veruntamen neque vllã
insignem coniecturam morbi principiũ
obtinet: neque vlla noua atque inusita-
ta labes hominem incescit: neq; in cor-
poris summis partibus representatur, vt
protinus videre quis possit, & incipienti
malo resistere. sed in visceribus tanquã
domo Plutonis delitescens ignis iã suc-
cenditur, internorumq; victor rursus
in superficie aliquando exardescit. Ple-
runque sanè à facie hæc pestis incipiens
tanquam ignis de specula procul con-
spicius effulget: nonnullis verò ab ex-
trema cubiti curuatura, à genu, à ma-
nuum pedumq; articulis. Iccirco au-
tem huiusmodi hominum salus despe-
rata est, quoniam medicus ad morbi de-
bilissima initia artem non adhibet ne-
gligens, & ægrotantiũ calamitatis igna-
rus. Tardi enim sunt, vt ab aliquo leui &
vulgari causa, somniculosi, quieti, sicca
aluo. Hæc etiam sanis haud valde inu-
sitata

fitata sunt. In morbi autem clementis respiratio graue olet ob interni spiritus exhalationē. Huiusce rei aer, aut quippiam aliud extrinsecum causam præbere videtur. Lotium crassum est, album, turbidum, quale iumentum reddit. vernerem appetunt, crudorum & inconcoctorum distributio fit: neque istorum est sensus & meditatio. neque enim concoxerint necne, percipiunt: & cruditas hæc concoctioni similis est. nam ipsis haud frequens est in optimum aut familiare concoctio. Digestio verò facilè fit, tanquam in suum ipsius alimentum raptim morbo attrahente: propterea valde siccitate inferioris ventris laborant. Tumores alij iuxta alios exurgunt, nondū quidem continui, sed crassi & asperi: & interstitium tumorum discissum est, vt elephantis corium. Venæ latæ sunt, non sanguinis redundantia, sed cutis crassitudine. Non multo post autem & sedes declarat vniuerso corpore in æqualem tumorem distēto. Pili in omni corpore præmoriuntur, in manibus, fœmoribus, tibiis: item in pube, in mento rari sunt:

O

rara quoque in capite cæsaries. quod verò maius est, intempestiui cani, & caluitium affatim subitòque ingruunt. non multo post autem pubes & mentum glabrescunt. Quod si qui pauci pili remaneant, hi magis dedecent, quàm qui defluerūt. Capiti cutis altius rescissa est: rimæ autem frequentes, profundæ, asperæ sunt. Tumores in facie duri, acuti: nonnunquam fastigio albido, basi viridior. pulsus pusilli, graues, tardi tanquàm per cœnum vix se mouentes. venæ temporum distentæ sunt, & sub lingua: ventres biliosi. lingua grādinosis varis exasperatur. Neque inopinabile est & omne corpus talibus scatere tuberculis: quandoquidem & in victimis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autē valde ab intimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit, impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritúsque cū voluptate scalpetur. Ambit verò impetigo & mentum nōnunquam in orbem: rubent malæ cum tumore haud ita magno: oculi caliginosi, ænei

DE DIVTIVR. LIB. II. 211

coloris sunt: supercilia prominētia, crassa, glabra, deorsum versus pondere vergentia: contractis glabellis eminens tumor insurgit: color lividus, aut ater est. episcenium vehementer contrahitur, ut oculos contegat, quemadmodum irascentibus, aut leonibus accidit: unde & leonina hæc ægritudo vocatur. Igitur neque leoni, neque elephāto solum, verum etiā nocti tenebræ æquales sunt. Hypopia, id est sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebræ, extantēque sunt. labiorum prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit, nasus tumet, dētes nō albi sunt, sed nigricare vidētur. Aures rubent admixta nigritia, obstructæ, elephāticæ, ut grandiores consueto esse videantur. Ulcera in basi aurium sunt: sanies defluit, pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: necnon & altè descēdunt scissuræ veluti nigri in corio sulci. propterea & elephas huic morbo nomen est. Plantarum & calcaneorum vsq; ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augeat malum, tumores malarū, mē-

ti, digitorum, genuumque ulcerosi sunt. ulcera foetida sunt, & insanabilia: alia enim super alia exurgunt, super alia aliamitescunt. siquidem membra hominem diu morte praeueniunt, quoad de corpore excidant nasus, digiti, pedes, genitalia, atque totae manus. Neque enim haec labes prius perimit, à turpi vita, fruiisque cruciatibus liberans, quam membratim dilaceratus homo sit. At longæva est, quemadmodum & elephas, animal. Sin autem membrorum recens dolor sit, longè acerbius affligit. Aliiter atque aliter paratorum ciborum appetentia est, non obtusa, sed gustatus qualitatis experta est: nullaque edendi ac potandi delectatio. omnia verò ob doloris cruciatum oderunt: alimento priuatur corpus: rabiosa inest cupiditas: spontinae sunt lassitudines, singulorum membrorum species hominem grauitate inusitata premit, quantumlibet exigua membra sint. quinetiam corpus omnia grauatim fert: non balneis delectatur, non illuue, non cibo, non ieiunio, non motu, non quiete: ab omnibus enim morbus alie-

nus est. somnus tenuis, vigilia peior mala sua cogitans: spirandi vehemens difficultas: suffocationes fiunt, ac si laqueo strangulétur. Hoc igitur pacto nonnulli vitam perdiderunt, inexcitabilem somnum in mortem dormientes. Itaque tales cùm sint, quis non aufugiat? aut quis non auerfetur, licet filius, aut pater, aut etiam germanus frater sit, cùm metus est, ne morbus communicetur? Propterea multi in solitudines & montes, sibi charissimos abduxerunt: aliqui eorū egestati, quoad viuerent, subuenientes, aliqui verò minime, cū eos vita defungi mallent. Fama est eorū quendam qui in solitudinē expositi erant, ex terre latebris reptantē viperā intuitū, aut fame coactū, aut morbi tædio inductū, ut malo malū cōmutaret, viuentē viperam edisse, neq; prius è vita migrasse, q̃ omnia ipsius mēbra cōputruerint atq; exciderint. Alterū præterea ferūt, viperam in musti doliū irrepsisse cōspicatū, cū mustum ad satietatē ingurgitasset vomuisse, multūque veneni simul cum musto reiecisse, quoniam in musto fera


extincta fuerat: iterumque hominē multum largissimè epotum, vitæ pariter ac morbi finem quærentem. vt verò satiatum iuxta inebriatusque fuit, primū quidem humi prostratus instar morientis iacebat. posteaquā deinde graui sopore experrectus est, ebrietatēque discussit, in primis comæ defluerunt, præterea digiti & ungues, deinceps omnia in ambitu corporis membra contabuerunt. quoniam verò adhuc in semine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem natura veluti ex cera creauit. alios enim crines enutriuit, ungues nouos, & nitidam carnē instaurauit, ac vetus corium ceu serpentis senectam exuit, & tanquam alter homo ad vitæ munia reuocatus est. Ita habet fabula nō admodum quidem vera, neque valde fidē excedens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam verò ex residua vitæ scintilla hominem redintegrasse, haud ita à ratione abhorret, vt monstrum simile esse videatur.

ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM ACV-
torum curatione,
Liber I,

IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

- Curatio phreniticorum, cap. I.
- Curatio lethargicorum, seu veteru-
rum, cap. II.
- Curatio tabis, cap. III.
- Curatio apoplexiæ, cap. IIII.
- Curatio accessionis morbi comitialis,
cap. V.
- Curatio tetani, seu rigoris, cap. VI.
- Curatio anginae, cap. VII.
- Curatio vitiorum columellæ, cap. VIII.
- Curatio pestilentium in faucibus vitio-
rum, cap. IX.
- Curatio pleuritidis, id est morbi costa-
lis, seu lateralis, cap. X.



Cutarum ægritudi-
nū medicamina spe-
ciebus signorū con-
tigua sunt, quę supe-
rioribus libris à me
comprehensa fuere.

Quæcunque sanè in
februm curatione fiunt secūdam ipso-
rum differentiam, & secundum morbo-
rum speciem, & in ipsis diuersitatē eorū
plura in tractatione de Febrib⁹ explica-
buntur. Quotquot autem cum febris
acuti morbi sūt, qualis phrenitis est, aut
sine febris, qualis apoplexia: eorum
duntaxat medicamina commemorabo:
vt ne aberrem, neque verbosior sim alia
in aliis describens locis. Idem verò prin-
cipium quod & de morbis feci, eundem
etiam finem faciam.

C V R A T I O P H R E N I -
ticorum, cap. I.

A Egrotum cubare cōuenit in concla-
ui mediocris amplitudinis, aeris tē-

perati, hyeme tepidi, æstate frigidioris.
vere autem & autumnno secundum tem-
porum naturas coniectura vti decet.
Deinde quiescere iubendum est & ægro-
tos ipsos, & omnes domesticos. Acute
nanque audiunt phrenitici, & strepitibus
irritantur, necnon & ab his in furorem
aguntur. Parietes læues sint, æquales,
neque supereminentes, neque festucas,
aut aliquid exertum habentes, neque pi-
cturis exornentur: pictura enim parietū
mentem turbat. nam præ oculis falsa
quædā simulachra obuersantur, & quæ-
dam non eminentia tanquam eminen-
tia manibus contractant, omnisque oc-
casio citra causam manuum agitationem
prouocat. Cubilis longitudo & latitudo
moderata sit: quò neque in ampliori vo-
lulari iactariq; possit, neq; à nimis an-
gusto delabi. Stragule vestes glabræ sint,
vt ne floccos colligendi in mentē veniat.
In molli lecto decubant: nā durum stra-
tum nervis ingratum est. Non minime
autē inter ceteros ægotantes phreniti-
ci nervis laborant: facile enim conuel-
luntur. Amicissimi eos inuisant: fabulæ

& sermones animum ne vellicent: cū delectabilia omnia esse oporteat, illis præcipue, quorum iracunda insania est. Vtrū in tenebris an in luce habēdi sint, ex morbi natura coniicere debemus: nā si ad lumen efferantur & quæ non sunt cernunt, & quæ nō adsunt cogitant, aut pro aliis alia cognoscunt, aut quasdam novas & vanas imagines accipiunt, atque in summa lucē, aut quæ in luce sunt, extimescunt, obscuro loco eos continere præstat: sin secus se habeāt, lucido. bonum est autem ad lucem resipiscere, placarique insaniam. Ne diu à cibis abstineant: cibi verò humidiores sunt, paucioresque, & cōtinui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in vtriusque remissionibus, febris videlicet, atque delirij. Quòd si ab inedia furant, & non desinat febris, cibos dare non valde febrim lædētes utile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quò exhibendi cibi opportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis

CVRAT. AC VT. LIB. I. 21,

nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio vnà cum febre à principio inuaserit: vena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum secanda est. Quòd si non nisi tertio, aut quarto die, delirium accedat, vsque ad primum decretoriorum dierum circuitum venę sectio differēda est. At si vltra cōueniens tēpus, vt puta sexto aut septimo die superueniat, venę sectio dimittēda est. multo enim ante iudicationes in acutis morbis euacuandum est, aut purgandū, aut aliis irritationibus vtendum. Venę quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio sectet. phrenitis nanque malum est in syn- copam facile mutabile. Sin autē ægro- tus valde repletus sit, & iuuenis plurimo cibo, & largissimo vini potu saginatus, hæ ad phrenitidem rationes non perti- nent: verū istis & citra delirium mul- tum sanguinis hauriendū est: longè au- tem minus auferendum, si iidem phre- nitici sint. Verū tamen audacius vena soluēda est, si à præcordiis, non à capite morbus oriatur: ibi enim vitæ principiū

est: caput verò sensus neruorumq; originis locus est, sanguinémque potius à corde trahit, quàm aliis distribuat. Igitur si membrum hoc affectum sit, venam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis vitiis inanire vasa oportet, à quib⁹ nō modica noxa prouenit. Quòd si vires patiantur, vt quantum sanguinis satis est, euacuetur, semel auferendum est: ne dum repetendo tempus coneritur, exhibēdi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuæ febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latētes subleuationes. Cæterum si ante mediocritatem defecerit æger, ad secundam remissionem differendum est, nisi longo tempore post vētura sit. Quòd si non sit, vires instaurando odoramentis, faciei tractatione, & pedum cōpressione protinus sanguis detrahendus est: quantum verò mittendū sit, facultas ostēdet. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maxime: aridiores enim sunt, quàm si sola adesset febris. neque mulsa danda, nisi biliosi sint: nam faci-

le à biliosis naturis concoquitur. Far lo-
tum cum aqua, aut mulla conuenit.
Bonum quoque est ex his sorbitiones
simplices præbere, quales satureia, aut
apio, aut anetho incoctis fieri solent. hæ-
nanque bonam spirationem conciliant,
& vrinam cient: conducit autem phre-
niticis lotij excretio. Omnia olera pro-
funt: sed maluar potissimum lentor bo-
nus est, & ad lingue arteriæque leuorem,
& ad stercorum descensum. optima est
beta, blitum, coronopus, cucurbita, &
quicquid suis temporibus optimū fue-
rit. Ordei verò mundati cremor li-
quidissimus quidem in primis nutribi-
lior est: sed tanto etiam spissior cras-
siorque sit, quanto plus temporis mor-
bus progressus fuerit. Verum in iudica-
tionibus & paulo ante iudicationes ci-
bus subtrahendus est. Si morbus lon-
giori tēpore producat: cibos ne sub-
trahito, sed triticea exhibeto, quò suffi-
ciat ægrotus: quādo extremorum & vo-
latilium carnibus in cremore liquefa-
ctis plerūque opus est. oportet enim hæc
in elixando valde dissolui. Ex piscibus

saxatiles aliis præstantiores sunt: atque omnino regionis illius optimos deligit. quippe aliam regionē alias piscium species procreare creditum est. Vinosæ naturæ fructus subtrahito: quoniam caput & mentē percutiunt. Verūm si necessitas urgeat, viribus aut ore ventriculi labantibus, mala in mulsa elixa, aut in adipe tosta exhibeto, aliorum singula calida aqua dissoluito, si roborandi dūtaxat oris ventriculi causa exhibeas: sin autem vires quoq; instaurare opus sit, non vsque adeo vinosa facultas dissoluenda est. Cibi quidem (vt semel dicā) huiusmodi sunt. Irrigandum verò caput est refrigerandi causa, oliuæ acerbæ contritæ vinguine: nam caput in phreniticis calefieri non amat. Quod si vigilie & cogitationes ægrotum agitent, rosacei parem modum in principio misceto: adhuc verò plus rosacei addēdum, quod magis extra intrāq; caput roboretur ac refrigeretur. At si mens labefactetur, & locutio euariet: serpylli comā oleis incoquito: aut hederę succum, aut sanguinalis affundito. Si mentis verò aliena-

tio vehementius hominem turbet: peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & aceti parū instillato: hæc enim halitus & caliditatē diffiant, crassasque humiditates, quæ & ipsæ deliramēti causæ sunt, discutiunt. Cauere autem conuenit, ne in ceruicem ac tendones madefactio descendat. tēdonibus enim atque neruis inimica est. Nempe irrigandi semper occasio est, præterquam exacerbationis initio: rarius quidem in incremento, omnimodum verò frequentissime vigēte morbo, cum maxime insanunt, tum maxime irrigandū est humore frigido: atque æstiuo tempore multo magis refrigerato, hyeme verò tepido. Ut mitescat autem delirium, posca, aut conyzæ decocto cum spongia facies fouenda est. Deinde ænanthino, aut crocino vngvine linēda: quinetiam nares, & aures iisdem imbuendæ. Hæc enim somnū alliciunt. Si quando isti pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi atque instar cornu rigentes, iactantur autem, & è lecto profliliunt, his somnus & quies conciliandi

sunt: primum quidē caput rosaceo mē-
ro irrigando, aut amaracino cum succo
hederæ, aut serpylli, aut etiam fertulæ
decocto. Magis autem soporiferum est
papauer in oleo elixum, capitis sincipiti
superdatum, aut in aqua faciei per spon-
giam impositum. ipsæ quoque integræ
herbæ (si proximè lectæ fuerint) virides
cervicalibus subiiciendæ sunt. crassant
enim, madefaciuntq; spiritum aridum
tenuémque: & caliginem quandam sen-
sibus obducunt: graue autem & torpens
est caligo: id verò est somni principiū.
At si valentiorib⁹ auxiliis egebūt: & ip-
sa papaueris lachryma ex aqua frōs in-
ungenda. quinetiam nares ea linendæ,
& in aures infundenda est. Contrectatio
pedum suavis ex oleo: capitisque att-
actus efficax est, sed potissimū si tempo-
ra aurēsque scalpantur. nam & ferarum
iram furorémque aurium & temporum
mollis attrectatio coercet. Cuique ve-
rò vñtata somnum accersunt: nautis
in cymba decubitus, & maritima na-
uigatio, & littorum sonus, & vñdarum
murmur, ventorūque bombus, & ma-

yie

ris nauisque redolētia: musico tiliarum
 exercitatio quietem affert, aut lyrae can-
 tus, aut citharae, aut meditatio puerorū
 canentium: ludi autem magistro pueri-
 lium fabellarum enarratio. Atque ita
 aliis alia animū demulcentia somnum
 insinuant. Cæterum præcordiis ac ven-
 tri madefactiones & cataplasmata adhi-
 beto, si phlegmone sublit, atq; durities,
 flatūsque distendat: oleum quoque ex
 oliua bene matura nequaquam acerba
 iniicito: id enim crassum est, & viscidū,
 & calefaciens. Hæc utique in inflamma-
 tione facienda sunt. Iniiciatur verò in
 ipsa anethum, aut conyza: bonum quoq;
 est si simul omnia. Quod si adsit etiam
 inflatio, cumini & apij semina adiicito,
 & quæcunque lotium flatūsque prole-
 ctant: necnon & nitrum cribratum in-
 spergito. Verum si in iecore vitium do-
 lorque fuerit: lanas ab oue sordidas ac-
 cipito, oleum verò acerbū, aut rosaceū,
 & sapam Græcā, aut Creticā admisce-
 to: fertulāque incoquito, atque omni-
 bus in vnum succū permixtis iecur irri-
 gato. Ad lienē verò oleum cū aceto be-

ne facit: aut si magis quàm prius turbet: posca, & pro lanis spongia mollis adhibeatur. nam mirum in modum his gaudet mitescitque lienis. Porro si præcordia interius sint, sursumque trahantur, & circumtenta cutis sit, optimum hoc remedium erit loco vnguinis, aut vnà cum ipso crasso tantūdem opportunum est. cunila verò & ros marinus incoquantur: anethū quoque nō iniucundū erit. Quòd si cataplasmatibus tempus erit idoneum, oleis quidē iisdem, in iisdem affectibus vtendum est. Materia sit autem lini semen, fœnum Græcum, ordeï tenuis farina. Bonum est autem & faba, & eruum, si venter intumescat: pariter & milium torrefactum in sacculo positum leue mollēque fomentum est: pin situm verò & aqua inter cutem laborantibus: cum melle & oleo & lini semine cataplasma bonum est. Flores autem & herbæ & semina quæcunque à me in irrigationibus posita sunt, & in cataplasmatibus eadem sunt. Mel verò & cum ipsis bonum est, vt arida cogantur, misceanturque squalentia, atque vt calor

diutius permaneat: ipsum quoq; solum bonū est pro cataplasmate semicoctum, & ad irrigandum, si cum aliquo humore liquetur: mollit enim, calefacit, flatus lotiūque euocat, & ardores obtundit. Nam hæc quoque mulsa epota præstat: hisque plura & meliora, si interius arteriam, pulmones, pectus, & ventrem subeat. Assidue verò aluus irritanda est, glandulis, aut illitionibus (sæpius enim siccescit) vt à capite materia detrahantur, & à pectore halitus disflentur, & alui purgamenta excernantur. Quod si multis diebus venter suppressus fuit: ipsum mulsa, oleo & nitro subluere opus *non solum.* est. Verum si non satis phlegmones exhalationes defierunt, cucurbitulam affigens incidito, qua parte phlegmone extumuit, & maior apparet: vnam autem, aut duas affigito, prout phlegmone significauerit, & vires præceperint: & sanguinis detrahendi copiā ab his coniectare oportet. Excessus enim syncope autor est. Primo quidem, aut altero die madefactio eadem esto, tertio verò ceratum cum aliquo ex oleis ad irri-

gādum aptis imposito. Deinde epithemata in inflammatione si facultas sit, ex hyssopo, fœno Græco ex mulsa decocto, terebinthi arboris resina, & cera: olea verò in iisdē eadem. Quòd si nihil istis delirium remittat, tōdere caput necesse est: si longissimi crines sint, primum dimidij: si breuiiores, ad cutim. Postea prius resectis viribus cucurbitula vertici capitis affigenda est, sanguisque hauriendus: verum prius inanis cucurbitula interscapulo adhibeatur. Cæterum quoniam thoracem in omnibus acutis morbis medicari oportet (nam prorsus ipse cum corde & pulmone laborat) primum quidem ob spiritus modo calidi, modo frigidi necessitatem, præterea ab ardenti febre, & tussi, & humorum prauitate, & neruorum cōmunionē, & oris ventriculi noxa, necnon succingentis membranæ, & septi transversī vitio (cor enim si maiori aliquo malo oppressum sit, nunquam sanescit:) in phreniticis utique & hæc in primis mitiganda sunt. si quidem nonnullis mentis alienatio ab aliquo eorum quæ in pectore sunt, vi-

tio exoritur. ea verò sunt, spiritus calidus & siccus, fitis acris, ignis intolerabilis, qui vndique in thoracem confluit, & prauitas quidem à domestico calore cōmutato & maior & molestior prouenit. Ab aliis etiam membris in thoracem contributio fit: extrema nanque frigida sunt, caput, pedes, ac manus: super hæc autem thorax est. igitur humectandi refrigerandique auxilio eget. Humectatio quidem fit ex oleo, in quo chamæmalum, aut nardus incocta fit. Aestate verò & sapa Græca benè faciet. At si epithematibus vti deceat, palmulæ vino austero maceratæ, deinde contusæ in placentam cum nardo, polenta, atque ænanthe suaue pectori cataplasma fuerint. Refrigerant quoque mala pinsita cum mastiche & fertula: quæ omnia cera & nardo excipiantur. Sin autem & os ventriculi torpeat, & à cibis abhorreat, succum absinthij, aut comam vnà cum his terito, ipso etiã in oleo incocto præcordia irrigato: & aquã, in qua maduit, aut ipsius succũ ante cibum propinato, duos scilicet aquæ illius cyathos, aut suc-

ci ad amaræ fabæ magnitudinem ex aquæ cyathis duobus. At si os ventriculi ardor malè habet, non ratione morbi, sed ipsum duntaxat ab acribus falsisque humiditatibus, siue à bile mordetur, atque siti perarefcit: lac aquæ admixtum in cibis exhibendum hemina videlicet dimidium vno aquæ cyatho temperatum: atque ita huiusce lactis plurimum. sorbeat: nonnihil etiam cum pane assumat. Verùm tamen si ardor hominem torqueat, & sitis, & anxietas, & furens insania, & frigida cupiditas: propinanda quidè frigida est, sed nō tanta quāta in ardore morbo absque phrenitide propinatur. In istis enim timendū neruis est: itaque danda est, vt ori ventriculi subueniatur. pauca verò satis est. parum enim potant phrenitici. Cæterum si in syncopam prolabantur (nam & hoc incidere solet, viribus euanescentibus, in sudorem liquefcente homine, omnibus humoribus extrorsum impetum facientibus, tenore ac spiritu fatiscentibus) tunc cura delirij posthabetur. sed cū metus sit, ne in vaporem, humiditatē-

que homo dissoluatur, vnicum subsidium vinum est. celeriter enim substantiam alendo instaurat: & quoquo versus ad extremitates vsque permeat: tenori tenorem apponit: & spiritum torpentem experget facit: frigiditatem calore temperat: laxantē madorem astringit: extrorsum erumpentia atque diffuentia coercet: olfactu suaue delectat: vires demum fulcire ad vitam prorogandam potest: atque in insania ad animum demulcendum optimum est. Hæc omnia epotum vinum simul præstat. iracundia nanque mollescente animo conquiescit: atque ipsimet ad recreandas vires cibos accipiunt: quinetiam se ipsos ad voluptatem replent. Nempe si iam plus temporis morbus extrahitur, & febris ignaua est, & deliriū in fatuitatem vertitur, & præcordia non vsque adeo læsa sunt, aut tumore, aut inflatione, aut durtia, sed in capite potissima morbi causa est: audacter lauare oportet, atq; sæpius caput perfundere. habit⁹ nāque sanabitur, & caput disflabitur, & omne corpus exhalabit. Atq; ita siccitas

obtunditur : & sensus caligo discutitur :
& mēs stabilis atque inconcussa firma-
tur . Hæc utique sunt tollendi morbi
præcepta.

CVRATIO VETERNO-
forum, cap. II.

V Eternosi in luce & ad solis radios
collocentur : morbus enim nihil a-
liud est quàm tenebræ . & magis in loco
calido habeantur : ipsius enim causa est
inlita frigiditas . cubile agitabile sit . fra-
gulæ vestes , parietum picturæ , omnia
sint varia , quæcunque visum prorritare
queunt . multus habeatur sermo : pedes
premendo tractentur : vellantur pili : mē-
bra scalpantur . Si altus sopor obtineat ,
vociferandum est . iracundè increpādus
est æger : his quæ timere confucuit , de-
terrendus : quæcunque prius optabat ex-
pectabátque , annuncianda sunt : omnia
ad soporem discutiendum contrà atque
in phreniticis , molienda . Quòd ad ve-
ternosorum euacuationem attinet , hæc
nouisse oportet , si alteri morbo , utpotè

CVRAT. AC VT. LIB. I. 233

phrenitidi succedat veternus, venam ne
soluito: neque alicunde multū sangui-
nem educito: sed ventrem subluo, non
solū stercoris educendi causa, sed etiam
vt aliquid à superioribus partibus reuel-
latur, & à capite deriuetur. igitur multū
insit salis, & nitri. Optimum verò sit, si
sublutioni castorium inspergas. inum-
enim intestinum veternosis frigidū est,
& ad excretionē emortuum. Si non per
successionem, sed suo pte ingenio veter-
nus incipiat, & ager plenus esse videat-
ur: si sanguinis, vena in cubiti curua-
tura secanda est: si pituitæ aquosæ, aut
aliorum succorum, purgare opus est, cui
ce ex ordeï cremore, aut nigro veratro
ex mulsâ inter initia, si mediocriter pur-
gare velis. Sin autem copiosius, medica-
menti, quod hieram id est sacrâ vocant,
pondo drachmas duas ieiuno dato cum
mulsæ cyathis tribus: atque tâtisper ex-
pectans, quoad purgatio cōfecta sit: tunc
cibos, si opportunū sit, exhibeto: sin mi-
nus, in posterū diem alimentum differ-
to. Nonnunquam sanè & vesperi hieræ
drachma cum aquæ, aut mulsæ cyathis

duobus dissoluta in tēpore datur. Nempe inedia malum est, malum est & cibi multitudo. Igitur exiguo cibo uti singulis diebus oportet: neque subito ac penitus ieiunandum est. os enim vētriculi per totum diem refecione calorēque indiget. Quinetiam cibus esto attenuans, & aluum leniens in iusculis magis quā leguminibus, gallina, cēchride. herba verò mercuriali assiduē vitor: acetūque affundito, & succis ini-cito, si forte succo pōtē sanā utendum sit. Bonum autem spiritum reddit, vrināque citat fœniculum, apium, olera, aut horum semina. Item porrum acrimonia sua proficit, & brāssica cum oleo & garo. optimē facit & cuminum dulce cum brāssica ad flatūs digerendos & lotium euocandum. Vesica enim atque venter in quolibet morbo irritant atque infestāt. Irrigationes capitis tales fiant, quales & in phreniticis. Vtrisque enim sensus pleni halituum sunt: quos refrigerādo, adstringendōque rosæ atque hederæ succo propulsare necesse est: aut digerere per transpirationem extenuan-

CVRAT. ACVT. LIB. I. 235

tibus, exempli causa serpyllo, aut aceto cum rosaceo. Si nerui doleant & totum corpus, sed multo magis extrema frigescant, caput ceruicemq; castorio cum anethino oleo inungito, atque irrigato. quinetiam spinā eodem Sicyonio, aut gleucino, aut veteri oleo admixto perfundito: necnon & manus ad humeros usque, & pedes usque ad inguina perungendi sunt. Nonnullis quoque vesica est humectanda: quæ tanquam nervus patitur, & tanquam urinæ iter laborat: insuper humorum acredine vexatur: biliosum enim lotium est. Sin autem maior tremor adsit, & conuulsionem minetur, necessariò & Sicyoniū oleum capiti superfundendum: sed brevis eius usus esto. Quod si præcordia inflammata sint, cutis verò tumida, inflata, distentaque, aut introrsum vergentibus præcordiis concava efficiatur: madefactiones & cataplasmata eiusmodi sint. cuiusmodi in capite de phreniticis comprehendimus. Cucurbitula minimè utilis, si à phrenitide in hanc labē incidit: audacius verò cucurbitula uti poteris, si

ab initio morbus iste inuaserit. Si autem atra lingua sit, & tumor in praecordiis appareat, cucurbitulā affigere necesse est. postquam verò interuallo temporis sensus purgati fuerint, & alia facilius feret, capitis vertici applicare. quandoquidem ea parte euacuare sine vlla virium molestia possumus: et flatus supra infraque eliciendi sunt. Veterrus enim flatus colligit: & in ventriculis, & in toto corpore ignauia, marcor animaeque defectus conspicitur. Motus autē ac vigilia discutiendi facultatem habet. Rutam igitur viridem cum melle & nitro contritam illinito: sic enim magis flatus digerit: cum his verò & terebinthinae resinae pars vna misceatur. Fortius quoque flatus prouocat aut cum sordidis calentibusque lanis, aut cum asperis paniculis veteribus atque attritis: aut cum spongia ex aqua, vbi hyssopum aut origanum, aut pulegium, aut rye incocta sit. Euocant autem flatus & quaecunque ante cibos propinantur: quae utique pituitam bilēque ab intestinis & stomacho educunt. Hyssopū in mulsa elixum,

dictamum Creticū, organū, acria quidem sunt, sed eductoria. Adiantum, gramēque flatus & lotia erūpere faciunt. Si manus & caput cōtremiscant, castoreum dimidiæ drachmæ pōdere ex mul-
sæ cyathis tribus ad plures dies bibendum est: si bibi verò nō possit, ad demolendam calamitatem cum olei cyathis tribus, in quo ruta incocta sit, duplum inimum intestinum infundatur. idque per plures dies faciendum. Ultra verò utilitatem, quæ ex hoc prouenit (nam supra infraque flatus expellit, & nonnullis vrinam, stercūsque detrudit) si fortè in omne corpus dilabens penetrat, si mi-
atque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidū sic. ūmque permutat: morborūque constitutiones conuertit. Optime etiam proficit si in nares inspi-
etur: nam & ea ex parte spiritus sternu-
amentis educit. Et quemadmodum per vesicam vrinam expellit, ita & per na-
res mucum. Hos autem effectus hoc loco suauī caliditate præstat, & melius quàm alia sternutatoria, scilicet quàm piper, veratrum, radicula, euphorbium,

Nam hæc ad primum atque vltimum
attactū immitia sunt, & caput sensum-
que perturbant. Castoreum verò pau-
latim adhibitum calefacit, cum & alio-
qui capiti conducatur: quandoquidem ner-
ui vndique ex capite oriantur: morbis
autem nervorum castoreum medetur.
Ceterum ipsum cum aliquo aut aliqui-
bus ex supra comprehensis admiscere
non ingratum fuerit. nam si admixtum
sit, non protinus quidem caput medio-
criter conturbauerit, diutius verò cali-
ditatem accenderit. Nares pruritatio-
ne humidæ reddantur, odoramenta ap-
plicentur, acria quidem ad sensum, sed
facultate calida: quale ipsum castoreū
est, aut thymbra, aut pulegium, aut thy-
mum, viridia aut arida aceto perfusa.
Acribus pharmacis pedes genuaque il-
linantur. Materia esto calefaciens, & ex
adiectione mordens. nam utroque ve-
ternosis opus est ad calorem excitan-
dum atque vigiliam. Primum igitur vr-
tica crura verberato. tenuissimæ nan-
que vrticæ partes adherentes non diu
perseuerant: sed pruritus & dolorem

CVRAT. ACVT. LIB. I. 239

non grauem inferunt: mediocriter vero stimulat & tumefaciunt, & calorem excitant. Quod si hæc vehementiora fieri volueris, lemnestidis atq; euphorbi pares portiones cum vngue gleucino illinito. Optimum quoque est scillæ crudæ laminis perfricare: sed à membris omne oleosum detergere oportet: quodlibet enim acre minimè mordax est admixtum cum vngue, nisi id medicamentosum sit, quale est cyprinum, aut gleucinū, aut Sicyonium. Si præter hæc altus adhuc sopor occupet, proderit syluaticum cucumerē ex aceto tritum, & æque sinapis portioni admixtum imponere. acre verò est id cataplasma, celeritèrque ruborem concitat: celeritèr quoque calefacere potest. verum ne pustulas vulneraque efficiendo periculum inferat, frequenter detrahendum est cataplasma, atque nunquid horum acciderit, inspiciendum. Hæc utique ad ipsius torporem, ac veluti demortui languorem discutiendum quolibet morbi tempore præter exacerbationum inuersiones molienda sunt. Quod si iam

sensum recuperet, pondus tamen aliquod in capite insit, & sonus aut bōbus obstrepat: etiam per os pituita elicienda est. Mastichen in primis mādendam exhibe, vt continenter expuat: postea rursum vuam taminiam, granū gnidium: sed omnium maxime sinapi, & quoniam vsitatum est, & quoniam inter alia magis pituitam educit: ac si quis sponte ipsum deuorauerit, quæ in ventriculo sunt, disicere potest: potest etiā aluum madefacere, & flatus excernere. Etenim aliquando casu hæc mihi euenerunt: cū homo quidā me cōsentiente ipsum deuorasset. Bonus autem magister est experientia, opus est v. rō & ipsum periculum facere. Imperitiā rāque timoris & cautionis causa est. Caput quoque postquam ad cutim detonsum fuit, nisi magnopere proficiat: vt transpiret radendum est: quinetiam ad vsum acrium medicaminum, vt eius qui ex limbestide constat, aut hydar, aut thapsia, aut sinapi, humidum ex aqua cum dupla panis portione in linteolo veteri illitum capiti superdandum est: cūque horæ
spatio

spatio ibi permissum fuerit, spongiis calidis fouere opportunum fuerit. Item ex usu erit & lauatio omnibus iam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente, vbi & gestatio proderit, & frictio, & quælibet lenis corporis agitatio.

DE CVRATIONE TABIS, cap. III.

IStos sanè si & tabes male habet, ocyus succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medela est, & nutritio, & ventris calefactio, & vesicæ lenitio. Quin etiam eadē huic vitio, quæ & catocho, expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum vtique illis opportunius est atq; lenius & potui datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autem qualia his similia ab vtero vitia oriantur, in libro de Muliebribus morbis à nobis disputabitur.

Q

DE CVRATIONE APOPLE-

xiæ, cap. IIIL.

APoplexia validus planè morbus est. nā in omnibus exanimis sunt, quorum & corpus & mens stupet. Si agrotus senex sit (quibus familiare id vitium est) non liberatur, & morbi magnitudine & ætatis miseria oppressus. Quibus autem notis morbi magnitudo coniectanda sit, antea à nobis positum est. Si iuuenis æger sit, debilis est apoplexia, non tamen facile remouetur. tentanda igitur curatio est. AEquale sanè adiutoriū vt pote magno affectui magnum remedium missio sanguinis est: nisi quis plusquàm conueniat, mittendo delinquat. modum autem coniectare difficile est: nam si paulò plus detraxeris, hominem planè strangulasti. ad vitā enim tuendam his vel paucus sanguis efficacissimus est: cum sit vitæ corporisq; alimentum fomes. si minus detraxeris quàm causa postulat, nihil magni per magnū auxilium contuleris: adhuc enim causa permanet. Sed præstat minus detrahen-

do delinquere : nam si minus detractum esse visum sit, aliqui verò optimi successus apparuerint, iterum venam rescindere congruens fuerit : scindenda est autem vena in concauo cubiti. hæc enim in sinistro fluida est. Simul quoque in pusilla apoplexia, & resolutæ partes considerandæ sunt, in sinistro ne, an in dextro latere resolutio sit : à salubribus enim partibus (ut dicere mos est) sanguinem haurire oportet. hæc enim sanguis facilè delibitur : hæc etiam à læsis partibus materia deriuatur. Igitur si absque euidenti causa attoniti reddantur, sic de secanda vena ratiocinandum est. At si ab ictu, aut delapsu, aut compressione in hanc labem inciderint, in aliud tempus res differenda est : nonnullis verò ad medelam atque vitam id solum satis fuit. Cæterum si frigiditate multa, & torpore, & sensuum abolitione hominem occupante vena minime scindenda videatur, subluenda alius est, quò multitudo ab intestinis extrahatur : plerumque enim ex voracitate & crapula in

Q.

morbum talem prolabuntur: utque humores caput occupantes reuellantur. Sublutio planè acris esto, pituitam, bilémque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere, (qui eluendæ aluo modus vſitatus est) & cucurbitę agrestis interanea, aut centaurij comæ decoctū ex oleo, aut aqua. Optima quoque sublutio fuerit, mellis cōſuetæ portioni ruta adiuncta, & cum vngvine elixa, & terebinthi arboris refina, & ſal pro nitro, & hyſſopi decoctum. Quòd ſi per hæc ſubſidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut ſenſum ab illo marcore ſuſcipiens, aut arteriæ bono pulſu reſtituto, aut facie vtcunque meliora ſignificante, ſpes ſalutis concipienda eſt, audaciùſque ſubueniendum. Interim igitur roboratis viribus, purgatorij medicaminis, quod ſacrum vocant, ieiuno maxime quidem integra potio danda eſt: ſi vires prohibeant, dimidium cum mulſa. & æger in lectica ſupinus collocatus agitandus eſt, ſenſim eum qui ferunt geſtantibus, frequenter verò, quò

CVRAT. ACVT. LIB. I. 248

lafsitudo arceatur, interquiescat, & si
alius liquida fit, libens admittito: si
cus, aquæ, aut mulse cyathos duos potui
dato. Sin autem & dum purgatur, nau-
seabundus fit, id ne prohibeto. nam & il-
la distentio ad expergefaciendum vigo-
rem quendam præstat, & pituitæ vom-
itus morbi causam euellit: sensum verò,
& caput, & nervos repurgat sacrum quod
vocatur medicamen. De qualibet itaq;
ab initio administranda purgatione sa-
tis differuimus. Totum verò hominem
lanis inuolutum oleo Sicyonio perfun-
dere oportet, aut gleucino veteri, aut sin-
gulis seorsum, aut simul mixtis. Sed o-
ptimum fuerit ad cospissanda olea ce-
ræ parum colliquare: atque ista nitri ac
piperis mixtione valētior reddenda est:
sint verò tenuiter contrita & cribrata.
At miram habet vim ad resolutos ca-
storeum, & illitum cum aliquo ex ante-
dictis oleis: sed longe potentius est, si cū
mulsæ potui detur: portio verò tanta fit,
quantam in veteriosis nouimus. Conie-
ctare autem oportet & ætatem ægrotan-
tis, & mentem, an pluribus diebus bibe-

re sit paratus. Nempe inunctiones irrigationibus præstant, facilius feruntur, & magis proficiunt: neque enim dilabentes lectum & stragula inquinant, ægrotis verò id inutile est: illæ autem inherentes corpori in colliquatas partes à calore sorbentur. quinetiam & ipsarum perpetuitas conducibilis est. nam irrigatio diffluit. Inunctionum autem materia est, quæcunque à me supra dicta sunt: cum ipsis verò castoreum. Accipitur itaque resina terebinthi arboris, euphorbium, limnestis (hoc est adarce) pyrethrum æquis portionibus: piperis, galbani dimidium, nitri Aegyptij triplum, ceræ quantum ad liquida conspissanda satis sit. Cæterùm medicamina multo magis quàm hæc, varia, & multo plura seorsum loco suo tradita sunt. epiplasmata quoque duris distentisque partibus superdanda. Horum sylua est, lini semen, fœnum Græcum, farina ordeï, mel: oleum, ubi ruta, aut anethum incocta sint: althææ radix pinfita, & in malsa vsque ad ceræ molli tudinem decocta. Sunt verò & tractabilia,

& temperatura suauia. Siquidem adhuc febre vacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facienda sunt. At si febres acutæ sunt, & reliquus morbus his leuior esse videtur, febres verò in discrimen adducunt, ad has & victus rationem, & reliquam curationem conuertere oportet. Alimentis itaq; summe tenuibus, & facilis coctionis vescendum est, atq; oportunitas nunc magis obseruanda. Et per totâ curationē in exacerbationibus subtrahere, atq; penitus in febres animum intendere oportet. Cum morbus autem diu trahitur, & caput in causa est, cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim quàm venę sectio, proficit, & vires nequaquã labefactat. Sed prius inter scapulas inanē cucurbitulam admoueas: vt in contrariū eius quæ in occipitio est, succos reuellat. Nempe interdū & gula resoluta est, in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis, & medicaminibus transmittendis. n. q; enim inedia fami q; tantūmodo periculū instat, verū etiam tussis,

difficilis spirationis, atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibū infundat, in arteriam subterlabitur, cum neque tonsillæ ad impulsū ciborum concidāt, neque epiglottis in proprium locum subsidat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est mulsam, aut succum longa mystila infundentem, supràque arteriam attolentem in gulā demittere: id quoque enim ad deglutiendum inseruit. Verum enimuero si ægrotus iam mortī proximus sit, ipsius adeò ceruix spiritusque congelascunt: ideo ceruicem & mentum calefactoriis illinito & foueto. Frustra verò laborant, atque imperiti illi sunt quicunque sub mento cucurbitulam, ut gula dilatetur, affigunt: quandoquidē non dilatatione ad impositionem ciborum, sed ad deglutiendum compressione opus est, dilatat autem cucurbitula: & cum deuorare velis, prohibet reuellens ac retrahens, cum remittendū potius sit, quò in deuorando constrictio fieri possit. Insuper arteriam repleti, ut strangulatio fiat periculum est, neque etiā si hac,

& illa in parte gutturis affixeris, quicquam prodest. musculi nanque & nerui & tendones & venæ ante ipsum positi sunt. Vesica vtiq; & laxum intestinum inter se proxima interdū ad excernendum debilitantur, resoluuntur, recrementorūq; semper plena reperiuntur: vesica verò & in maximam molem extumescit. Interdum autem ita resoluuntur, vt purgamenta cōtinere nequeant: per ipsa enim tanquam inanima superuacua delabuntur. Tunc igitur instrumentum, quod cathetera vocant, in vesicam demittere haud sanè tutum est: ne corrumpatur enim vesica, atque homo conuellatur, discrimen impendet: sed præstiterit cremore haud multo aluum subluere: cumque stercus ab intestino eiectum fuerit, iterum iniiciendum est cum oleo castoreum. Spes autem vnica omnium pariter resolutorum, separatimque singularum partiū eo vitio laborantiū in oleum insecutio fuerit. quomodo verò ipsa administretur, in sermone de Diuturnis morbis exponetur.

DE COMITIALIS AC-

cessionis curatione,

cap. V.

COMITIALIS morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit, nonnunquam enim & vno die hominem perdit. Periculosæ etiā sunt per circuitus exacerbationes: vnde factum est, vt in acutorum numerū comitialis morbus poneretur. Quòd si malo assuescat homo, & morbus tenaciter adhaerens occupet, non solū diuturnus, verū etiā nonnullis perpetuus efficitur. nā si ætatis florem vigoremque excedit, conuenescit cum ægro, commoriturq;. Quotquot igitur medicamina vt diuturno morbo cōueniunt, in sermone de Diuturnis comprehenduntur: quotquot autem ad mortis celeritatem euitandam facienda sunt, horum plura in sermone de Attonitis tradidimus, venesectiones, alui sublutiones, inunctiones, cucurbitulas. hæc enim vt homo expurgiscatur, valentissimè efficiūt. Quotquot autem prolapsu peculiaria adiutoria inueniū-

CVRAT. ACVT. LIB. I. 252

tur, ea in praesentia docebimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex vehementi refrigeratione inusitata haec labes incessit, vomitus aut cibi, aut pituitae, aut aliorum quorundam succorum prodesse consuevit. pennae autem irino vnguento delibutae nauseam excitant: veruntamen & irino non usque ad conuulsiones tonsillae sunt illinendae. Comprimere quoque leniter ilia opus est, puerum in ventrem suspensum conuertendo. haec enim figura ad vomitum habilissima est. At si vellatur, aut distorqueatur inferior maxilla, aut manus & crura iactentur, aut vna cum toto corpore oculi distendantur, manibus perunctis tractando demulcere conuenit: obtorti oculi dirigendi sunt: rectae partes ne torqueantur, suauiter continendae: frigida membra lanis antiquis sordidis, attritisque panniculis fouenda, sed etiam praeterea melle cum rutaceo oleo inungito, aut cum nitro, aut resina liquida cum his mixta: haec quoque leniter intra anum intruditro. flatus enim proliciunt. flatuum autem excretio

huiusce morbi in pueris medela est. Porro si deglutire valeant, pharmacum istud exhibendum est, cardamomi pars, æris cōbusti ꝑ. hæc ex mulsa propinato. aut enim euomunt vnà cum humoribus vētriculum infestantibus, aut alius subducitur. Optimum quoque est huiusmodi linctuarium, cardamomi, sinapis, hyssopi comæ par modus, iridis radicis pars cum nitri duplo, piperis tertia pars: omnia cum melle permisceto, & maxillā diducēs in os infundito: interius etiam, quàm vbi sunt tonsillæ, quò deglutire valeant, iniicito. Hæc adeo pueris expedit. Iuuenib⁹ autē & hæc quidem profunt, verum etiam potentiora his medicamina ad vomitum deligenda sunt, vt narcissi bulbi, sinapis, & hyssopi pares partes, æris & piperis dimidio minus quàm priora, cum melle miscens exhibe. Hæc profecto ad leuandam exacerbationem abundè fuerint: quæ verò ad propulsiandum morbum facient, in sermone de Diuturnis morbis persequemur.

CVRAT. ACVT. LIB. I. 253
DE CVRATIONE RIGO-
ris, quem tetanum vocant,
cap. VI.

IN præsentia lectum mollem, tractabi-
lem, lauem, suauem, calidumque esse
necesse est. neruos enim inflexiles, du-
ros, rigētesque morbus efficit: quin etiā
cutis tota squalens asperaque corpori
obtentata est: palpebræ natura versatiles
vix oculos conuiuendo protegunt: ocu-
li intenti sunt, in profundo conuoluti:
necnon & artus sunt deligati, ob disten-
tionem immobiles. A Egroti domiciliū
calidum esto, si æstas sit, citra sudorem,
aut resolutionem: ad syncopam enim
morbus inclinatur. Neque verò ad alia
magna remedia cunctanter accedendū:
haud enim differendi datur occasio.

Quapropter siue ob refrigerationem
absque manifesta causa rigor inuasit,
siue ex vulnere, siue ex abortu mulieri
incesserit, venam in cubito rescindito:
curans in deligando brachio laxiorem
compressionem fieri, sectionemque le-
niter & facilè expediri: siquidē ista ner-

uorum conuulsiones cient. Semel etiam
cruor citra defectum animæ frigusque
extremorum mediocriter effundatur.
Neque inedia æger maceretur: res enim
frigida siccaque fames est. Propinetur
itaque mulsæ spissæ, meracior, & ptisanæ
cremor cum melle. Ista nanque & ton-
sillis comprimendo minimum dolorem
inferunt, & gulæ deglutendo lenia sunt
& facilia, & ad molliendam aluum mol-
lissima, & ad vires instaurandas valen-
tissima. Omne corpus lanis inuoluito
oleo gleucino, aut crocino madetibus,
in quibus aut rosmarinus, aut conyza,
aut artemisia incocta sit: atq; omnia &
facultate & ad tactum calida sunt.
Oblinere autem corpus vngvine con-
uenit, quod ex limnestide, (quam adar-
cem esse putamus,) quod in stagnis na-
scitur, & euphorbio, & nitro, & pyre-
thro conflatum est: his verò & multum
castorei adiiciatur. Bene quoque fuerit
tendones lanis contegere, & secundum
aurem & mentum loca perungere. nam
partes hæ maximè patiuntur ac disten-
duntur. Præterea leuibus calefactoriis

fouenti sunt tendones & vesica per sacculos milium torrefactum includentes, aut bubulas vesicas olei calidi semiplenas: quò locis quæ fouentur, secundum latitudinem applicari valeant. Interdum coegit necessitas, vt capiti fomenta adhiberentur: quod neque sensibus vsque adeo tutum est, neque nervis salutare. sensibus enim quandam caliginem effundit multis halitibus ipsos petentibus: nervos autem replet. Quo circa modo fouendi quam tutissimo vtendū est, atque materia haud ita multum fœdè olens deligenda. vtique materia esto oleum in vesicis in duplici vase citra nidorem feruefactum: aut sales tenues in sacculo. milium enim ac lini sementa ctu quidem lenia sunt, sed halituosa & graueolentia. Ratio vero fouendi huiusmodi esto: tendonibus resupinato ægro fomenta vsque ad verticem subiicienda sunt: vltius vero ad synciput ne procedito. Iste namque locus omnibus sensibus communis est: ab ipsoque, tanquam ex fonte omnia adiumenta, omnes noxæ scaturiunt.

Quòd si epiplasmata tēdonibus super-
danda sunt, erectum occipitium esto: nā
si magis sursum versus imposueris, ca-
put exhalationibus complebis. Materia
fit autem epiplasmātū lini & fœnigræci
semina. Post epiplasmata verò utilis fue-
rit cucurbitula occipitio ab utroque
spinæ latere adhibita. Sed parce admo-
dum flamma accendatur: nam quæ ab
labris cucurbitulæ fit circumpressio, do-
loris conuulsionisq̃ue autor esse solet.
Igitur diutius trahere præstat, ac mol-
liter magis, quàm plurimum breui tem-
pore. sic enim tibi in conuexum locus
sine dolore attolletur, qui concidendus
est. Scop⁹ autem modi sanguinis extra-
hendi tibi vires ægrotantis proponan-
tur. Hæc utique rigoribus, qui sine vlce-
ribus fiunt, remedia conueniunt. At si ex
vulnere conuulsio facta sit, perniciosum
profectò id est, ægreque de salute spera-
ri potest: nihilominus tamen opem fer-
re decet: quādoquidem nonnulli & ad-
hibitis remediis mortem euitarunt. O-
portet sanè vltra cæteram medelam &
vulceribus consulere cum calefacienti-
bus,

CVRAT. ACVT. LIB. I. 257

bus, quæcunque à me iam dicta sunt, irrigando, & fotibus, & cataplasmatibus, & medicamentis, quæcunque & facile calorem excitent, & humectando pus abundè moueant. Vlcera enim in rigore sicca & squallida sunt. Accipito ergo thuris mannam, polij comam, terebinthi pinique arborum refinam, althææ radicem, & rutam conyzamque herbam: hæc in cataplasmatibus commiscere cõpus est, alia liquando, alia quæ puluerca sunt, inspergendo, alia in oleo prius macerando. althæam verò in mulsâ ante contusam decoquito. Inspergendum est etiam vlceri castoreum: neque exiguus inde in totum corpus calor emanabit. Horrores enim ab vlceribus prodeuntes malefici sunt. Perungendæ quoque sunt nares castoreo cû crocino vnguento permixto: quin etiam castoreum trium obolorum pondere assiduè bibere expediet. verùm si ab hac potione gula laboret, interiicienda est laserpitij radicis exhibitio ponderis tanti, quanti & castoreum dandum esse diximus: aut myrrhæ dimidio minus quàm laserpitium.

R

sed omnia cum mulla potanda præ-
beatur. Quod si Cyrenaici laserpitij la-
chrymæ copia tibi fiat, hanc opus est
melle cocto inuolutam ad erui magni-
tudinem deuorandam dare. ita enim
optimum factu est, quod palatum præ-
teriens agrotum lateat. acris est enim,
ructumq; insuavis ac fœdè olēs excitat.
si neque hac ratione deuorari possit, in
mulla eliquata propinetur. Omnibus e-
nim potionibus, quæcunq; calefacere,
humectare, distentionem laxare, & ner-
uos remollire aptæ sunt, hæc haud du-
biè valētior est. Cæterum si nihil egro-
ti deglutiant, in anū castoreū cum oleo
dandum est: hoc etiā anus cum vngvine
aut melle illinendus: hoc item vesica ir-
riganda, & cum cera, vt crassius redda-
tur, perungenda. Sin autem flatum ster-
cūsque educēdi tempus adsit, purgatorij,
quod hierā, id est sacram, vocāt, drach-
mas duas cum mulla, & oleo in fedē in-
iicito. Nam præterquam quod illa euo-
cat, intestinum etiam & inferiorem vē-
trem calefacit ac fouet. varium nanq;
& calidum medicamentum hiera est.

DVæ anginæ species reperiuntur, al-
tera cum caliditate, & magna ton-
sillarum inflatione, & extrorsum ver-
sus tumefactione: quin etiam lingua,
gurgulio, & omnes adiacentes particu-
læ in tumorem efferuntur: altera istis
locis collapsis & submissis efficitur: sed
interius compressio maiore strangu-
latu discruciat: vt interna inflamma-
tio ad cor vsque pertinere videatur.
Huic quàm celerrime occurrendum
est. nam & hac celerrime ægroti ra-
piuntur. Igitur si crapula, & ebrietas
in causa sunt, eodem die inferius hu-
morem iniicito: isq; duorum generum
fit, alter vsitatus, quò stercora educan-
tur: alter eiusmodi, vt aliquas à tonsil-
lis pectoreq; humiditates euellere pos-
sit. neq; tamen in cæteris efficacior me-
raciorque esto: sed centaurij & hyssopi
decocta infundenda sunt. hæc enim &
pituitam educere solent. Si tenuis au-
tem victus præcesserit, scindere cubiti

R 2

venam expediet: & latior sectio, quò maiore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Huiusmodi namq; profusio minime quidem ad caliditatem mitigandam satis est: sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminueri valet. Haud ignobile quoque ad iumentum præstat, si ad animæ usque defectum ægrum perduxeris, usque eò tamen, dum ne anima deficiat. quandoquidem nonnulli secta vena ab animi deliquio vita excessere. Item vinculis supratelos & genua constringentes opitulabimur. Optima quoque sunt vincula supra brachialia versus cubitos, & supra cubitos versus humeros. At si deglutienti via expeditissima sit, elaterium & cum mulsa, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeatur. aliis enim purgatoriis elaterium in his ægrotis præstantius est. Conferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: siquidem hæc ambo ventrem repurgant. In quibus verò inflationes deuorationem impediunt, linguam ad palatum reflectens, ipsius venas rescindito. quòd si

promptè multusq; sanguis defluat, inter alia remedia hoc magis proderit. Irrigationes utique locis inflammatis primum quidem adstringentes, quò retrorsum materiæ labantur, conueniunt. quã ob rem lanæ sordidæ cum œsypo vino madentes, aut oleo ex immaturis oliuis expresso accipiantur. Quin etiam cataplasmata irrigationibus similia sunt, exempli causa palmulæ vino madefactæ tunfæque cum rosarum foliis. quò sit autē viscidum & molle cataplasma, etiam ordeï farina admisceatur: aut lini semen, & mel, & oleum: ut omnium mixtura fiat. Quòd si ad suppurationem veniat, calida admouenda sunt: quibus & in altera anginæ specie utendū est. adesto igitur fœnigræci farina, & manna, & resina, quæ liquari possunt: & polij coma inspergatur, necnon & fomentum calidum adhibeatur, spongiis in decocto lauri baccarū hyssopi que madentibus. Ad mouendum pus autem efficacissimū est columbinus fimus tenuiter per criseram, id est lineum sacculum, instar pulueris transmissus, ac superinspersus.

R 3

idem & caninus eodem modo præstat. Ex mulsâ verò cum lentis, aut hyssopi, aut rosarum, aut palmularum, aut simul omnium decocto collutiones fiant. Illinendum præterea totum os est usque ad intimas fauces, simplicibus quidem, ut mororum, aut malorum punicearum aqua maceratorum succo, aut palmularum decocto: compositis verò medicamentis, ut diamoro, quod vocant, aut eo quod ex besasa, id est ruta sylvestri, & succo rhoi componitur: aut diachelidonio, id est ex hirundinibus confecto medicamento. Sin ulcera crustosa sint, collutiones & gargarismi fiant ex hyssopi in mulsâ, aut pinguium ficorum in aqua decocto: præter hæc amyllum percolatum in mulsâ, aut in ptisanæ tragive cremore. Si angina cum concidentia, quæ erat altera species, occupet, ab interioribus extrorsum omnia euocanda sunt & humores, & caliditas, & omnis caro, ut totum foras extumeat. Proinde calidæ irrigationes sunt cum ruta, & anetho, nitro insperso: & cum his superius memorata cataplasmata. Pro-

ficit etiam ceratum ex nitro & fina-
pi ad calorem excitandum superdare:
calor autem exterior huiusmodi vi-
tium tollit, sed in collo tumor extube-
rat. Tumor autem foràs in sublime ela-
tus à pulmonis inflammatione libe-
rat, intus verò abditus anginam patien-
tibus perniciosum malum est. At qui-
cunque strangulationem ab angina ve-
rentes, quò laxius spiritus duceretur, ar-
teriam secuerunt, non sanè experimen-
to rem comprobasse videntur. Quip-
pe caliditas inflammationis maior ex
vulnere efficitur, strangulatum adau-
get, tussimq; commouet. Quin etiam,
si alioqui periculum id euaserint, vulne-
ris oræ in vnum coalescere nequeunt:
ambæ enim cartilagineæ, atque inter se
inglutinabiles sunt.

DE CVRATIONE COLV-
mellæ. cap. VIII.

Vltiorum, quotquot columellam inse-
stant, aliqua per succisionem curare
necesse est: sed de eorum chirurgia dis-
putare ad præsentem locum nō attinet.

R 4

aliqua, vtpote acuta, medicamentis sananda sunt. nam facile strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est utique, quāvuam, & quā columnam dicimus: vtraque enim cum inflammatione, crassitie, longitudinéque suboritur, ita vt in arteriam pendulæ fiant. AEquabili sane crassitudine à basi ad summum vsq; palatum columna, inæquali verò vua constat. huius enim ad palatum basis gracilis est, in extremo teres & crassa, rubens aut liuida. iccirco & vuæ appellationem id vitium sortitum est. Quapropter his maturè opem ferre decet: celerrima namque à strangulatu perniciēs impendet. Proinde si ægroti iuuenes sunt, à vena cubiti sanguis detrahendus est: vtque largius euacuetur, maiore plaga vena aperiatur. siquid enim huiusmodi sanguinis detractio à strangulatu, tanquam à laqueo ægrotantem liberat. Subluenda quoque alius est mitiori lotione primū: deinde aliàs, atque aliàs acriore, vsque eò dum aliquid à superioribus partibus deriuetur. Circudentur & vincula ad-

stringentia extremis crurib⁹ supra maleolos & genua: necnon & humeris supra brachialia atque cubitos. Quod si strangulatio invalescat, cucurbitula occipitio atq; pectori adglutinetur, & istarum aliqua incidatur: omniaque administrentur, quaecunque à me in capite de angina praecepta sunt, cum eadē in vtroque vitio sit mortis ratio. Iisdem praeerea intra os medicamentis & adstringentibus & mollientibus, & exteriori fotu, & cataplasmatibus, & oris inunctionibus utendum est. Circum columnam verò, aut circum vnam adstrictorium rhoi succum, acaciā melle aut aqua dissolutam, hypocystida, terram samiam, Lemniāue, aut Sinopicam rubricā, atque omphacium ponito. Si ulcerosa sit vna, gummi & amyli rosarum aut palmarum decocto liquefacta: item ptisanæ aut tragi cremor adhibeantur. At in columnæ curatione aliquanto plus valentiorum medicaminum adicito, quæ ex myrrha, costo, atque cypero componantur. Nam id genus acria columna tolerat. Verum si nonnullis locus iste

purulentus effectus est, atque palati ossa computruerunt, hi longo temporis intervallo vitam finiunt. Sed horum auxilia nobis alio loco præcipientur.

DE CVRATIONE PESTilentium in faucibus morborum, cap. IX.

HOrum vitiorum curatio cum aliis tonsillarum affectibus quâ communis est, quâ propria. In inflammatione & strangulatu purgatio per clysteres, venæ sectio, irrigationes, cataplasmata, fustus, deligationes, cucurbitulæ, omnia demum eadem, atq; in his, conueniunt. Illitiones autem acriorum medicamentorum faciendæ sunt: neque enim vlcera quiescunt, neque crustæ in superficie fiunt. Verum si ab his sanies ad interiora destillet: celeriter partes, etiam si integræ erant, vlcerantur: celerrimèque vlcera interius depascendo serpunt, atque hominem perimunt. Porrò igne vitium adurere, cum in superiori parte sit, imprudentis esse propter Isthmum

CVRAT. ACVT. LIB. I. 267

iudico . Sed medicamentis igni simili-
bus, quo & depastio coerceatur, & cru-
stæ decidant, vtendum præcipio, Ea ve-
rò sunt, alumen cum melle, galla, balau-
stium, arida cum mulsâ. Hac eadem ca-
lamo, aut penna, aut crasso & oblongo
caule, quò medicamina ad vlcera per-
ueniant, inspiranda sunt. Optima sanè
est & chalcitis vsta cum trita cadmia
ex aceto. esto autè cadmia portione du-
pla : & rhei radix cum aliquo humore.
Præterea ne vlcerum compressio fiat,
cauendū est: ab ea nanq; & humescunt,
& magis exedunt. Hac de causa opus est
pinna medicamenta arida inspergere:
liquida verò liquentissima reddentē in
gurgulionē infundere. At si crustæ iam
resoluuntur, & vlcera rubida fiunt, tunc
consulſionis maximè periculum sub-
est. resiccantur enim plerunque vlcera,
& cum his nerui distenduntur . Itaque
lacte cum amylo, & succo ptisanæ, aut
tragi, aut lini seminis, aut fœnigræ-
ci remollire madefacereque conuenit.
Quibusdam & columella vsque ad pa-
lati os exesa est: quin etiam tonsillæ ad

basim vsque & epiglottida . ac propter cicatricem deuorare neque solidū quicquam, neque liquidum poterant . Sed & ipsum quod bibebat, interdum reperi sum hominem fame necauit.

DE CVRATIONE PLEV-
ritidis, seu morbi lateralis,
cap. X.

NVlla moræ atque dilationis in pleu-
riticis, quin protinus valēti remedio
succurramus, datur occasio. Febris enim
peracuta ad perniciem properat : dolor
quoque succingentis membranæ in pe-
ius vrget, necnon & tussis pectus caput-
q; concutiens vires proterit . Quocirca
eodem potissimum die vena cædenda
est. Sin autem ex ingurgitatione cibo-
rum potusq; ægritudo prouenerit, ine-
dia diem vnum ægroto imperāda. post,
sanguinem à vena mittito, quæ in cauo
cubiti est, non eius qui secundum rectū
incessum inflammatis costis opponitur:
præstat enim maximè procul abducere.
Sanguinem verò ne vsq; ad animæ de-

CVRAT. ACVT. LIB. I. 269

liquium fundito. nam si refrigeratū corpus animo destituitur, pulmoniam inuadere periculum est. Humores enim exteriori caliditate attractioneq; priuati, in penitiores partes relabuntur. Item pulmo rarus, calidus, ad trahendumque valentissimus est: costis etiam proxim^o, earumque doloris est particeps. Verū morbi pulmonis pleuritidi succedentes non vsquequaque salubres sunt: pleuritidis verò à pulmonis vomica exoriens benignior est. Quapropter cū mediocriter sanguis effluerit, interiecto ad recreandum hominem temporis spatio, iterum detrahere opus est: si bene quidem habeat, eodem die, cū longa remissio sit: sin minus, postridie. Quòd si neque febris remittat (sæpe enim diem vnum febris occupat, & augetur) tertio die in secunda remissione, in qua & cibi dandi sunt, sanguinem mitte: totum hominem vberius perungens, costisq; oleū molle infundens cum calido vngue ex rutæ anethive decocto. Ipsum verò latus admodum leniter irrigandum est. sed nonnullis & dolor & inflammatio

erupit, vt eorum locorum affectus esse videretur: cū tamen id interiorum vitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia, quemadmodum & de vniuersa curatione, quò nihil in ea delinquatur, sermonem habeamus. in alimentis enim medicamenta ponentur: quin imò in alimentis medicamenta sunt. Itaque genere calidus humidusque; cibusesto, lenis, æquabilis, migmatodes, id est bene permixtus, dissolutorius: pituitam soluendi, extenuandi que potestatem habēs. Proinde cibariis omnibus ptisana anteponatur, initio quidem, quò ipsius crassamentum solidumque reiiciatur, in cremorem percoletur, soloque cum melle condiatur. ab ipsa verò vilitata ad voluptatem varietatemque parandam medicamina remoueantur. in hac enim egritudine solus cremor satis est. Quippe humectare, calefacere, pituitam soluere & detergere, per superiora sine molestia, quacunque euocanda sunt, euocare, facile quoque ventrē ducere sola ptisana potest. Ipsius verò lenitas blāda est & ad deuo-

randum habilis. ipsius etiam lentor caliditates mitigat, membranas mundat, tusses concoquit, omnia emollit: tales ordei virtutes sunt. Halica verò secundum gradum occupat: quæ cum pauca quædā cum ptisana cōmunia possideat: ob ea probatur, optimaq; censetur. Lentor enim, lenitas, suauitasq; in deuorando vtriq; cōmunia sunt: in cæteris omnibus halicam ptisana antecellit: sed ea quoque simplex cum melle solo conficiatur. Tragi præterea boni sunt. Deterior ipsis oryza est: quoniam siccatur & exasperatur: potiusq; costarum purgationem supprimit, quàm facilem reddit. Optimus quoque est panis aridus, contusus, per subcerniculum transmissus, bene temperatus, concoctu facilis: cum mulsa, quantum satis est, alimenti præbet. Nempè si iandiu morbus produciatur, cum dictisq; cibariis homo labare cœpit, ptisana ex ordeo præbeatur bene trita, bene cocta: cōdiatur verò anetho, sale, & oleo tenui, puro, nō viscido, non exasperante. At non multum olei cum ptisana coquere præstat. nā & sorbitio-

nem pinguem reddit, & prauitatē oleū deponit: longa enim decoctione in cremorem ordeī absorptum amplius non apparet. Item porrum cum sua coma, & amygdala amara cum cremore incoquantur. Ita nanque ferculum ad spirationem expediendam commodum medicamentosumque ab his efficitur. Porri autem cum cremore comesti vtilitatem iuxta delectationemque summam afferunt. Iam verò & ouorum bonum succum creantium opportunitas adest. ac si humida copiosaque per os materia feratur, sulfur ignem non expertum, nitrumque in oua inspergito. Sed mirifice profunt oua nuper à gallina edita ex igne igne carentia: quippe à matre caliditas inest igne quidē humidior, sed ægrotanti familiarior, vtpote animali ab animali. Sin autem pituita glutinosa ac tenax sit, in oua oleum infundito, ac resinā siccā pineā, quò sulfur melius reddatur, inspergito: necnon & terebinthi resinā eliquato. Piper præterea in ouis, in ptisana, in omnibus epulis, & quęcūq; piperi similia sunt, benè proficiunt. Inter
carnes

carnes extremi pedes in cremoribus eliquati, colūbe, gallinæ elixæ, porcorū cerebra cū omēto quidē tosta, sine illo verò nidore vacantia. Si inter spirandum æger strepitum non reddit, dandi sunt etiam marini pisces aut saxatiles, quicquid optimum regio ferat. Verū vt neq; cupiditate delinquat, neque victus tenuitate contabescat, ex fructibus malū cōcedito in aqua, aut mulsa elixum, aut cum adipe assatum: sed corium & interiora aspera cum seminibus abiiciātur. Tempore quoque illo, quod horā Græci nominant, fici, & alij id genus fructus concedantur: quatenus scilicet innoxij sunt, quin potius adiumentum præstant. Hæc sanè de alimentis abundè sint. Lateri autem lanæ superduntur sulfure fumigatæ, vngvine imbutæ, in quo anethum rutæue incocta sit. Igitur his latus madefaciendum, cataplasmatisque ante cibi assumptionem tegendum est. præter vsitata cataplasmata fertulam in mulsa elixam accipito, cui papaueris carnem incoctam cōmisceto, mannæ quoque puluisculum inspergito. At si humi

dius spiritum copiosumque reicitur: lollij farina, aut irionis cōmiscenda est, & nitrum inspergendum. Cæterum si morbus productior sit, dolor est pertinax, & humida sit expurgatio: tunc purulētum hominem fore speratur. itaque sinapi & cachrys cataplasmatibus admiscēda sunt. Sed si penitiores locos ægroti frigidos esse persentiunt, acetum affundito. illud autē efficere operę precium est, ut cataplasmatū calor diu efficax permaneat. melior est enim id genus caliditas, quā cataplasmatum innouatio. Proinde calefactiones in sacculis ex huiusmodi, utpote ex milio fiant, aut ex calenti oleo in vesica incluso. Omnis verò fatus machinatio, ne pondera dolori dolorem adiciant, levis esto. his enim leuibus & assumpto cibo, cum dolor infestat, uti nihil prohibet. Iam verò post hæc etiam adinouendæ cucurbitulę occasio adest: sed hoc post septimū diem facere optimum fuerit: ante ne festines. haud enim placidi morbi sunt, quicūque ante septimum cucurbitam requirant. esto autem magna, omni ex parte lata, dolentem

locum ambire valens. quippe cū haud
interius descendat dolor, sed in latitu-
dinem diffusus sit. At flamma sub cu-
curbita multa esto: quò non solum at-
trahat, verum etiam ante ignis extin-
ctionem calefaciat. Extincto igne scari-
ficandū est, tantūque sanguinis, quan-
tum vires permittunt, detrahendū. mul-
to verò plus esto, quā si alia de causa
de præcordiis sanguinem haurires. nam
maximè perspicuum est, quod in lateris
morbo vexatis à cucurbita percipitur
adiumentum. Sal quidem, aut nitrum
in scarificationibus mordacia sunt ac
dolorifica, sed salutaria. Quapropter
considerandæ sunt hominis vires & in-
genium: nam si forti animo ac tolerans
sit, sal inspergendus est, non ipsis vulne-
ribus ita, vt ipsa contingat: sed super lin-
teolum oleo madidum inspergatur. id
verò super locum scarificatum exten-
dito: humiditates enim ex salis colli-
quatione manantes minus quā sal,
mordaces sunt. Sed multo oleo perfun-
dendum linteolum est, quò huius leni-
tate morsionis dolor retūdatur. Secun-

do die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: vt ex vulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. id verò priore cucurbita multo est efficacius, multoque magis vires conseruat. neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atque id quidem facito, cum prius vires exquisitè perpenderis. Die tertio ceratū cū cyprino oleo & rutaceo imposito. Quod si vltius purgatione sputa indigeant, in ceratis resinā eliquato, aut sulfur ignem nō expertū admisceto, atque iterum fotum loco adhibeto. Porro modus cucurbitæ talis esto. fictile vas habendum est, leue, lateri congruens, latū: aut æneum. Id pronum in labra dolentibus locis circumponito: flammam verò multam cum oleo subiicito, quò viuens flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad difflationem transitus aliquis esto, quò minus suffocata flamma extinguatur. diutius verò illam accendere expedit: nam intra vas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris prouocatio. Neque verò

medelā inferioribus partibus adhibendam negligere oportet: viris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in vterum infundendum est. Perpetuò sanè quæ bibuntur, ac deuorantur sunt, mulsæ cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit: vt in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbendi tempus adsit, aliquod compositum, quod picerium Græci dicunt, accipiat ex variis constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem fabæ magnitudinē æquant, turbinatosque dare oportet sub lingua continēdos, huc atque illuc iactandos: vt nō deuorabile, sed eliquabile sit. Suaue quoque est id quod ex papauere cum melle ac fertula campana medicamen conficitur lene, atque somniferum. Hæc vtique & ante cibi assumptionem, & assumpto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt: sed ieiuno medicamentosa exhibeantur: quale est, quod hæc accipit, vrticæ, lini seminis, amyli, nucis pineæ, cuiusque contriti cyathū, amygdala amara numero vigintiquinque, to

tidem & piperis grana. oportet autem hæc torrere, ac trita cū melle ad eclegmatis temperaturā permiscere. horum detur mystillā vna. si liquida crudāque excreat, myrrhæ pondo drachmas duas, croci pondo drachmam vnam, piperis grana quindecim, cum mellis pondo libra subigito. id sanè medicamentum & ante cibi acceptionem mystillæ dimidiatæ mensurā dari debet. bene facit in longo lateris morbo, quando & oxymel dare cōuenit, si spirandi vrgeat difficultas. Frigidam verò aquam quicunque medici pleuriticis concesserunt: neque qua ratione id fecerint, assequi valeo, neque experimento cōfirmare. quippe si qui à frigida periculum euitarunt: hi profectò mihi non laborare pleuritide visi sunt. Verùm apud vetustiores etiam medicos species quedam concursus pleuritis, seu lateralis morbus vocabatur: cū bilis esset excretio, cum dolore lateris, & exigua febre, vel etiam sine febre. Huiusmodi sanè affectus nomen quidem pleuritidis, rem verò non obtinet. Quinetiam spiritus nonnun-

quam in latere conclusus sitim, dolo-
rem prauum, mollémque caliditatem
excitat: id quoque vitium ignari homi-
nes pleuritim nuncuparunt. His nempe
frigida aqua remedio esse poterit, cum
prospera vtentis fortuna extincta sitis
erit, bilis ac spiritus per inferiora sub-
ducetur, & dolor & caliditas exhala-
bunt. Verum in lateris inflammatione
& succingentis membranæ tumore non
solum frigida aqua, sed etiam frigida
respiratio noxia est. Itaque si ex prius
tradita medendi ratione incolumes red-
duntur pleuritici, paulum tamen adhuc
tusiunt, & caliditas subinde repetit, at-
que infestat: ad hæc penitus discutien-
da maturandum est. aut enim quæ re-
linquuntur, recidiuas faciunt, aut ad sup-
purationem conuertuntur.

ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM ACV-
torum curatione,
Liber II,

IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

- | | |
|--|------------|
| Curatio pulmonariæ, | cap. I. |
| Curatio reiectionis sanguinis, | cap. II. |
| Curatio cardiaci affectus, | cap. III. |
| Curatio cholerae, | cap. IIII. |
| Curatio voluuli, | cap. V. |
| Curatio acutorum iecoris affectuum, | cap. VI. |
| Curatio acuti morbi venæ & arteriæ dorsi, | cap. VII. |
| Curatio acuti renum morbi, | cap. VIII. |
| Curatio acutorum vesicæ vitiorum, | cap. IX. |
| Curatio vuluæ strangulatus, | cap. X. |
| Curatio satyriasis, | cap. XI. |

CVRAT. ACVT. LIB. II. 281
CVRATIO PVLMONARIAE,
cap. I.



Eracutū letalēq; malū est inflammatiō repletiōq; pulmonis: quas strāgulatus breuis cōsequitur. Igitur æquis resistētia viribus, maturēq; ferenda subsidia sunt. protinus in cubito venę aperiātur, siue vtraq; in dextra videlicet, ac leua manu, idque potius: siue vna tātum, & ea maior: quò ab vtraque pulmonis regione humiditatum reuulsio, nō tamen vsque ad animi deliquium fiat: strangulatū enim animi deliquium auget. Cæterū si vel paulum respira-uerit: tunc suppressendus sanguis est, ac denuò postea mittendus. nam si à sanguine morbi causę prouenerint, eas venę sectio tollit. Atqui seu pituita, seu spuma, seu quæuis alia humiditas tumefaciat, venarum inanitiones ampliorem pulmonis locū ad respirationis transitum efficiunt. opus est autem humores

& flatus post venæ sectionem deorsum
versus trahere, nitro, melle, ruta, resina
terebinthi liquida sedem oblinēdo. sed
missionis sanguinis loco, si quod maius
impedimentum sit, acrem succū per cly
sterem in sedem immittito: vt puta sa
lem cum nitro, aut terebinthi resina
cū melle. Ruta quoque in oleo, & hyf
sopum in aqua decocta, item cucurbitæ
syluaticæ carnes interiores in aqua ex
coctæ conueniunt. Præterea inanes cu
curbitulæ egregiè faciunt, si tergo, dor
so præcordiisque vbique adhibeantur.
quod si cubi pectus carnulentum sit, quod
minus circum ossa cutim cucurbitula
incumbēs affligat, ibi eam affigito. nam
si ad quancunque partē corporis humo
res distrahantur, & spiritus ad extima
euocetur, quib^o pulmo opprimitur, ali
quod mali solamē inuenias. omni enim
ex parte pulmonaria obsidenda. impu
gnandaque est. Verū neque vllum ex
his medicamentis, quæ ore sumpta con
ducunt, despiciendum est. quippe ea est
natura pulmonis, vt siue recte valeat, si
ue ægrotet, ad se humores alliciat. Quo

circa eiusmodi medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpirandum attenuent, lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant. Propinetur quidē celeriter iuuandi causa nitrum cum hyssopi decocto, aut muria cum aceto & melle, aut sinapi humidum cum mulsa. singulis autem iridis radicem & piper inspergere auso bene cedit. itē hæc arida cribrato, & cum melle exhibeto.

Quod si interdum insomnes sint, & noctem quoque totam peruigilent, ne hominē furor corripiat, metus est: variisq; somnificis medicamentis, nisi ægritudo remittat, uti decet: quod medicamēta in tempore data morbi acerbitatē leniant & obtundant. multa verò soporifera sunt. At si in strangulationis impetu, iamque aduentante interitu medicamē præbeas: apud tuos contribules mortis eius auctor appellaberis. Alimēta pariter eiusmodi esse debent, acria, videlicet, tenuia, crassitudinem dissipantia, extergendique facultatem habētia: inter olera porrū, aut cornicis pes, aut vrtica, aut brassica in aceto incocta. Inter

frumentacea verò ptisanæ cremor parum origani aut hyssopi, necnon piperis, sed plus nitri loco salis accipiens. Alica præterea mulsæ incocta prodest. Omniâque per elixationem flatum abiciant: flatus enim vomica pulmonis laborantibus infesti sunt. Vinum, si febre vacant, quod haud ita multum adstringat, potui detur: quippe densat corpora adstrictio: istis verò membra potius laxanda sunt, sputiq; educationi studendum. Sed in totum potus modicus esto, cum pulmoni madefactio inimica sit: quoniam à gula atque ventriculo trahit. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale cõtegatur. Optima inunctio est ea quæ ex adarce fit. Sinapi etiam aridum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa, & humores, & calor, & spiritus foras educendi sunt. huic rei opitulantur acrium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio hæc facienti nisi morbus cedat, de hominis valetudine actum est.

DE SANGVINIS

reiectionis curatione,

cap. II.

Omnes sanguinis effusiones, haud
mite vitium sunt, non modi solum
ratione, vt si per fracturā aut erosionē,
verum etiam si per rarefactionem effun-
ditur. neque si ex pectore aut pulmoni-
bus, aut stomacho, aut iecore fertur, pe-
riculosum est: è capite verò si defluit, mi-
norem noxā affert: sanguinis enim exi-
tus est: sanguis autem omnium est ali-
mētum, omnium calor, omnium color.
terrorēque incutit, sanguinem ab ore
vtrunque manantem intueri. malūq;
est, si à primario viscere: peius verò si ob
fracturam, aut erosionem profunditur.
Huius itaque vitij medicus ad opem fe-
rendam maturet necesse est. In primis
quidem aerem frigidiorē ad respira-
tionem deligito, cōclaue non titubans,
cubile firmū, quo nullam in partē qua-
tiatur, inhabitet: concussiones enim ma-
lum exasperant, stratum solidum, haud
multum cedens, neque profundū, neque

calidum esto. positus figurave corporis erecta sit, ne sermocinetur, neve sermones audiant. animi absit perturbatio, sed contra oblectamenti leniatur: siquidē id genus agrotos magna animi cōsternatio corripit. quis enim vomēs sanguinem mortē instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine referti sunt, & venas prominentes habent, in qualibet sanguinis profusione venam pertūdito. nam siue ex fractura, siue ex erosione profluit, sectio venæ conducit. Sin rarefactio in causa est, ne multitudo venam effringat, metuendum. cædenda est autem caua in cubito vena. Etenim ex hac facile sanguis effluit, & ipsa sectioni exposita est: utque per plures dies sanguis innoxie decurrat, cōmodè aperta seruetur. in omnibus autē omnium (ut ita dicam) præcipuorum viscerum hæc est sanguinis via. vena utique hac superior, necnon & hæc vnus in brachio venæ ambæ propagines sunt. quare nihilo plus superior quàm media emolumentū affert. nā propaginū ignari sunt, quotquot stomacho & iecori superiorem ve-

nam copularunt. Sin à liene sanguis fertur, sinistrae manus venā illam quae inter minimum anularēque digitum sita est, rescindito: quandoquidem medicorum nonnulli eam ad lienem vsque pertinere arbitrantur. verum & haec ipsa inter cubiti venas inferioris propago est. cur itaque potius eam quis propè digitos, quàm in cubiti curuatura profcindat, cū hoc in loco amplior sit, & ad effluxum habilior? Prorsus quidem ante animae defectum sanguis cohibendus est, atque haud ita multus auferendus: nā & ipsa cruoris per os effusio satis hominē labefactare potest. assiduè verò post paucum detractū sanguinem iterū detrahito & eodē die, & postridie, nec non & perendie. At si aegrotus tenuis, & inops sanguinis sit, venam ne scindito. haec de sanguinis missione abundè sint. Succurrendum est etiam extremorum deligaturis, pedum quidem supra malleolos & genua, manuum verò supra brachiale & cubitum. fascia ipsa lata sit, quò sit validior, neque dolorem moueat cōstrictio. Nempè locis, vnde san-

guis erumpit, lanas ouium succidas im-
ponito, & humore perfundito, vt pote
austero vino, & roseo aut myrtino oleo.
Si cruoris effluuium vrget, lanarum vi-
ce spongiæ admouendæ sunt, & pro vi-
no acetum infundito, locumque myrtino
subungito. in omnibus autem spongiis
acaciæ, aut hypocystidis, aut etiã aloes
succu aridi sint. optimè facit & ompha-
cium aceto liquatum. Quod si irrigatio sor-
dida fit, agræque feratur, emplastris vt
conueniet: cutim enim circutendunt, ac
veluti manu corripunt, quinetiam ip-
sorum facultates refrigerare, exiccaræque
magnopere valent. Infinitæ verò alię a-
liis experimento cognitæ vires insunt:
sed optima emplastra ac tutiora sunt,
quæcunque acetum habent, & salicis fo-
liorum succum, necnon & bitumen, & æru-
ginem, & alumen, & thus, & myrram, & æs
ustum, & æris squammam: atque in sum-
ma quæcûq; huiusmodi emplastra sunt:
emplastris sordidæ lanæ, aut spongiæ pau-
co aceto perfusæ superdantur. sin empla-
strorum distentionem ferre nequeunt,
id genus epithema, facito, palmulæ pin-
gues

CVRAT. ACVT. LIB. II. 289

gues nigro vino austero maceratae ad
 maze, id est placetae crassitudinem conte-
 runtur: postea acacia trita, & mali coria
 inperguntur, haec omnia panniculo trito
 ac veteri illita pectori inducuntur. Item
 polëtam vino aut aceto perfusam, nec-
 non lëtis farinam tenuem per incerni-
 culum transmissam cerato ex vnguen-
 to roseo facto excipiens imposito: cum
 quo & symphyti radicem tusam & cri-
 bratam admisceto. Aliud epithema haec
 recipit, prunorum damascenorum quae
 brabila Graeci vocant, agrestium radi-
 ces in aceto incoquito, ad speciem pla-
 centae contundito, ac rhoi, commis, myr-
 ti paulum misceto. ex his utique alia aliis,
 prout medicaminum efficacia, lenitate,
 odore opus est, miscenda sunt: siquidem
 & agrotantibus gratificari decet. Haec
 nimirum exterius applicanda remedia
 sunt. At his praesentior medela in po-
 tionibus deuorandisq; consistit, ut pro-
 xima vulneratis partibus medicamina
 sint. Porro triplex istorum forma est, ut
 vel fluxionis ductus liget, cogendo va-
 scula & comprimendo: vel defluentem hu-

T

morem crassum compactumque efficiant, quò licet transitus pateant, ne destillet: vel exiccent incursum in sede antiqua sanguinem retinentes, ut ne effluuio loci exhausti ita permaneant, exudatioque ibi sit, quò facta est effusio. In venarum quidem rarefactione adstrictio satis est: ipsæ nanque ceu situla noua imbecilla in rarefactionibus perfluunt. Diuisionibus verò, ut labia committantur, adstrictio quoque medetur: sed maioribus valentioribusque medicamentis vtendum. Verum enim verò si sit erosio modus, neque per adstringentia vlcus oræ cogantur, sed vulnus dehiscat, neque ex compressione in vnum redire valeat, sanguinem atque calorem congelare necesse est. nam istorum immobilitate concretioneque profluuium coercetur. Postea igitur rarefactis adstringendum satis est: neque enim sanguis effluens purus est, sed ipsius sanies per ostiola parua dilabitur. atque huiusmodi postea neque adeo multa neque frequenter egemus. nonnullis & exterius admodum remedia abunde fuerunt. Quinetiam palmula-

rum, aut filiquarum esculentarum decoctum potui datum solū quosdam liberauit. esto autem acetum ex vini adstringentis genere, quod si non medicatione, tempore saltem acre adstringensque euaserit. Verum in vulnerum dilatationibus præter poscam medicamenta primum simplicia adhibeantur, ut plantaginis, aut sanguinalis herbae, aut seridis succus, singulorum portio æqua cū posca: quod si adhuc plus effluat, hypocythidis, aut acaciæ siccorum, cuiusque pondo drachmam in tres poscæ cyathos inspergito. optimè verò facit & vuæ acerbæ succus. At si calamitas hæc semper in peius irritetur, gallam tritā, & rubi radicem arefactā, & lapidem ex mari, corallium quod vocant, aridum tritūque cōspergito. verūm rhei radix ad refrigerandū, siccandū, adstringendū, omniaque faciēda his efficacior est. sed hæc quoque cum posca sola præbetur. Sin auxilia maiora requiruntur, radicis huius pondo tres obolos seridis atque plantaginis succis, qui triū aut quatuor cyathorum mensuram com-

T 2

pleant, iniicito. In erosionibus autem
prorsus adstringentia adhibere tenta:
quò dilabentem sanguinem cōretum,
compactumque reddas, & suscipientia
membra constringas: vt procul à vul-
nere venæ concidant, & occludantur.
quinetiam quæ bibuntur, tenacia sunt,
concretionem efficere valétia. Succum
igitur coriandri ex aceto propinato,
item & leporis, aut inuli, aut hœdi coa-
gulum. Sed multum ne concedito: nam
• illorum aliquod nonnunquam plus q̃
conuenit datum, hominem iugulauit.
coriandri quidem succi ne minus semi-
cyatho cum tribus poscæ cyathis præ-
beatur: coaguli verò tres oboli, summū
quatuor. Ad hæc huiusmodi fluoris san-
guineis speciebus & terra Samia efficaci-
ter subuenit, & erethrias, & aster quæ vo-
catur, valde candida, & rubrica Sinopi-
ca, & sigillum Lemnium. Istorum pon-
dus minimum drachma, maximum
drachmæ tres cum decocto aliquo præ-
beatur, vt palmularum, aut siliquarum
edulium, aut rubi radicum. Si arteria
exasperatur, propterea quæ tussiunt: in

Cretica sapa id genus terræ inspergantur. egregiè ad arteriam leniendam & amyllum facit: nam cum læuore & glutinandi potestatem habet. Si profusio sanguinis vrget, semel in die ante cibi assumptionem dandum est: sin minus, & secundo & tertio sub vesperam. Ex medicamentis quoque siccis catapotia fieri possunt ex melle ad consistetiam decocto, qualis est galla trita. optimus est etiam rhous, quo in obsonijs vtimur, vinacea, acuti rumicis semen, per se singula & simul omnia. Hæc vtique & sub lingua ad perpetuam eliquationem habenda sunt. Gummi etiam cum planta porri & spinæ lachrima profunt. Variorum sanè medicamentorum infinita est experientia, varij etiam vsus: vt pastilli ex AEgyptia spina, & pastilli ex electro, & eius qui croceus appellatur, quorum apparatus proprio loco expositus est. Porro cum febris abest, omnia in medicamentis audenda sunt, & multa & multoties exhibendo. Si febre vexatur (plerumque autem corporum inflammationibus febres superueniunt) neque affatim eruptio

supprimēda est, neque in accessionibus
medicamenta potui danda : quoniam
multi celerius febre , quàm sanguinis
effusione consumuntur. Alimenta varia
sunto, speciēque medicamentis similia,
quinetiam in cibis medicamenta repe-
riuntur . neque enim in vno duntaxat
cibo omnia alimenti bona inuenire fa-
cile est. Atqui si non vnus cibus ad me-
dicationem sufficit , non vno propterea
vti ob satietatem facile est: sed per varia
eundum : iam enim diuturna valetudo
facta est. Itaque adstringentia sint ali-
menta, & facultate refrigerantia , & ad
tactum quoque frigida esse debēt. calor
enim sanguinem prolicit. Alica lota,
oryza in posca: sin acetum tussim ex-
asperat , palmularum decoctum : panis
assus, præaridus, contusus, atque in fari-
næ speciem reductus & cribratus: atque
ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat.
item thymbra sale condita, & rhous ci-
bis aspergatur . Quod si aliqua in re æ-
grotanti morem gerere placeat, coriā-
drum, si gratum sit , delectationis causa
concedito: aut aliquod ex seminibus vri

nam mouentibus, facilémque spirationem reddentibus. lens utique, si profluvium sanguinis vrgeat, cum plantaginis succo præbeatur: si non vrgeat, à succo abstineto: quippe qui nec concoctu facilis, neque gustatui iucundus est. istis verò minimè omnium egrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusionē mortem instare verearis, tunc iniucūda cōcoctu difficilia, quin etiam immania sint licet ea quæ salutē afferunt: propterea galla arida trita lēti sicce & frigida adspargatur: ova coquendo crassiora effecta cum mali punici corio, aut galla exhibeto. tale utique necessariò in medicamine alimentum est. Potus omnino parcissimus esto: nā sicco victui humor inutilis est. Hęc nimirū adhibenda sunt, si adstringere ac refrigerare statueris: si verò sanguinem ac spiritum crassiorem efficere, lac, amyliū & alica profunt: modo cū amylo, modo cū alicalac misceto. horū téperatura, ut ne sit liquida sorbitio, ad concretionē perueniat. Cæterum si adhuc magis crassare adstringeréque cupias, alicam cum palmulis decoquito,

ad spissandum autem amyllum lacque optima fuerint, & far Tyrrhenū cum lacte: crassum cū sit, viscidum & glutinosum. Hædi verò coagulum in decocta liquida, causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, vt ad recentis casei temperaturam deueniat: his crassius est milium, vt far, in lacte decoctū. inspergatur autem galla & mali corium. Verū exiccantium, aut crassantiū mediocritates coniectura assequi oportet: id genus nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellētia nonnullis & venas lacerauit. Si bene cedit curatio, sanguisque compescitur, in contraria paulatim adiiciendo fiat mutatio: atque (vt dici solet) ne quid nimis. huiusmodi enim vitia facilè reuerti solent, ac maligno ingenio prædita sunt. Iam verò hominem instaurare, carnēque replere, & nouas cicatrices solidare necesse est gestationib⁹, mollibus frictionibus, peregrinationibus, animi oblectamentis, cibis variis atque vsitatis. Hæc vtique facienda sunt, si à sanguinis exitu vulnus coaluit, & congruenter locus sana-

tus est: si vlcus relinquitur, purulentumq; fit, altera deliberatione opus est: siquidem & iterum profusio sanguinis redit. verum de hoc affectu in sermone de Diuturnis morbis disputabimus.

DE CVRATIONE CARDIACORUM, aut syncopæ,
cap. III.

IN syncopa medicum prouidentia sedulo nauare operam necesse est: futuram enim si prospexeris, & presentia tibi festinanter opem ferent, & ipsam ante quam inuadat, propulsabis: presentem verò non facile euadunt ægrotantes. Solutionem nanque naturæ syncopam esse diximus: instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur maxime quidem futuram arcere: si minus, saltem nuper incipienti resistere debemus. præscienda verò ea sunt, quæ de acutis morbis differuimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens initium est: febrem ardentem signa pes-

suma consequuntur, ariditas, vigilia, caliditas viscerum, qualis ab igne provenit. extremae partes frigent: manus pedesque extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo longa est. siquidem frigidi aeris, quoniam ignem expirant, avidi sunt. arteriae motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaque sumpta coniectura, & ab aliis quotquot à me inter signa comprehensa sunt, ipsi ab initio syncopae occurrendum est. Quapropter nisi haec omnia impedian, habitus, aetas, anni tempus, hominis timiditas, vena caedenda est. Quod si multa prohibeant, quae numerum insignem, & magni faciendum constituent, utpote lingua aspera & sicca & nigra, (omnia enim interiora signa nescuntur) in omnibus facultas perpendenda est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem non defectu tantum, verum etiam strangulatu prosterinitur. At ubi praemultitudine syncopa fiat, & inflammatio aliqua insignis in praecordiis, aut iecinore appareat, nequaquam procrastinare expedit. Secunda

est igitur vena caua in cubito: per minutas sectiones, id est scarificationem, etiam sanguis detrahendus est, quò facultas haud ita insignem iacturam faciat. copiosum enim ac subitum naturam vitiat. quin etiam multo minus sanguinis, quam in aliis occasionibus, hauriendum est: nam in syncopa si vel minimum erroris committitur, ad interitum ducit. Protinus igitur ad vires instaurandas alimentum dare conuenit. Natura enim priorum repulsa, & nouorum adiectione latatur. Vtique si missionem sanguinis facultas non sustinet, inflammationesque infestant, cucurbitula tunc multo ante morbi iudicationem ei admouenda est. in iudicatoriis enim diebus syncopa incidere solet: in iisdem verò circuitibus & naturæ iudicant, & morbi interimunt. Si vini potandi necessitas homini incidit, diligenti consideratione opus est. neque enim vsque adeò tuta est in inflammationibus vini potio. siquidem vini potio inflammatione laborantibus dolores auget: inflammatione vacantibus,

naturæ incrementum affert, sed ant
quàm semel, aut iterum cucurbitulan
affixisti, & ad membra relaxanda, & a
sanguinis facilem exitum utilis est: nō
nullis & post cucurbitulæ secundam af
fixionem benefecit. Hoc verò in casu &
parsimonia vtendum est. nam & in cu
cubitulæ usu nimix sanguinis effusio
nis idem periculum adimus: euacua
tionibus autem per clysterem duntaxat
ad inueterata stercora eiicienda opus
est: sed facultatis rationem habeto. Ca
pitis irrigationes frigida, quotquot mi
hi in sermone de Phrenitide relatę sunt,
paulum mediocritatem excedentes ad
hibeantur. Aer mundus, ad inspiran
dumque frigidior deligendus: vitus plā
tarum, picturæ, aquarumque aspectu
oblectandus: & hæc omnia iucunde sua
uitérque intuenda. amicorum præsen
tium locutiones sint ioculares atque ri
dicolæ. Summa sit in ægrotantis cor
pore quies, in animo hilaritas. odora
menta suauia, quæ capitis sensum non
grauent, adhibenda. quinetiam grati o
doris alimenta naribus offerantur, qua-

CVRAT. ACVT. LIB. II. 301

is polenta est aqua aut aceto respersa,
aut panis calidus recentissimè coctus.
Nèpè vino haud copiosè os colluatur,
neque prorsus denegetur. Potum fre-
quentiorem, quàm aliis, & magis ass-
duè his concedito. Esca per totum diem
sit levis, concoctilis, plerunque triticea,
necnon ægrotanti iucunda, licet paulo
deterior: istis enim magis q̃ aliis grati-
ficandum est: quandoquidem haud mi-
nimè ad stomachi resolutionem id mor-
bi genus aptum est. Inedia verò aut fa-
mes nequaquã prodest. sati enim mor-
bus ipse omnia consumere & exhaurire
potest. Porro cùm iam circuitus ad iu-
dicationē peruenit, humiditas verò iu-
gulum frontēque irrorat, extrema al-
gent, arteriarum pulsatus minimus est,
frequentissimus veluti repens, ac tenore
debilis, tum paulum quid alimenti tri-
ticei sumendum, vinūque euidenter
degustādū est. Sed caput irrigationibus
præmunire oportet pariter & vesicam.
Hęc verò auxilia in tractatu de Phreni-
tide à nobis memorata sunt. Vinum uti-
que non pleno ore, neque ad saturita-

tem vsque ingurgitandum est. Aliqui
sanè importunè repleti, postea inappe-
tentia, atque cibi potúsque accipiendi
impotenti a vita excessere: multis autem
satis largè vescentibus, natura iam re-
soluta ad mortem euitandam alimen-
torum copia nihil profuit: in ventriculū
quidem cibis delabentibus, sed ad re-
creandas vires à ventre non ascendēti-
bus. Alii mēta sanè varia sint oportet, ple-
runq; triticea, quò sorberi potius, quàm
mādi apta sint: si solida sunt, lubrica sal-
tē efficiantur. Oua neque valde cōcreta,
neque torrefacta sint, sed omnino soli-
ditatis expertia. Panis buccellę vino ma-
dentes & calefactæ duæ trēsue initio
præbeantur. Post autem omnia frigida
ministrentur, nisi forsan interius phleg-
monæ delitescant. Vinum odoratum,
haud ita multum adstringēs, quàm mi-
nime crassum deligatur, ex Gręcis Chiū
aut Lesbium, & quotquot alia insulana
tenuis sunt téperaturæ: ex Italicis autē
Surrentinum, aut Fúdanum, aut Faler-
num, aut Signinum, nisi vehemēter ad-
stringat. atque ex his omnibus illud vi-

tandum est, quod peruetustum, aut valde nouum sit. Nempè detur primo calidum non minus cyathis quatuor ante iudicationem, neque plus cotyla, siue hemina, quanuis bibax homo sit. deinceps cibo exhibito, si inflammatio permiserit, iterum frigidum vinum, quod siti medeatur, propinandum. At si necessitas vrgeat, vino non solo, sed cum cibo vtendum est. verum ne mētem vinum lædat, cibus ante sumendus est, & post hæc abstinendum. Si post aliquod temporis interuallum dormire velit, quies concedenda est. Verùm si multus sudor emanet, arteriæ iam micare desinant, vox acutior reddatur, & pectus calore destituatur, vini quantum potare possit, concedendum. in solo enim vino refrigeratis spes vitæ posita est. Vinum itaque sit vſitatum, & modò id ægrotus tantum bibat, modò cibum cum vino assumat: id autem per interualla fiat ad tollendam lassitudinem, quæ tum ex morbo, tum ex cibo prouenit. nam qui exiguas vires habent, & post assumptum cibum valde laborant. Igitur &

ipsum decet forti esse bonoque animo,
& medicum suavi oratione eum ad bo-
nam spem cohortari, varioque alimen-
to & vino opitulari: necnon & alia effi-
caci medela vti opus est, & ad sudores
coercendos, & ad vires instaurandas, vt
penè extinctæ reuiuiscant. Quapropter
pectoris sinistrae māmæ palmulae in vi-
no maceratae cum aloe mastiche su-
perdentur: ceratum verò cum nardo fa-
ctū ista excipiat. quòd si istud durū sic-
cūmq; fiat, aliud epithema imponendū:
mala cotonea extracto s mine, & quic-
quid durum est, contusa polentę odora-
tæ admisceto: postmodum absinthij &
myrti comam, acaciam quoque & man-
nam cribratas permisceto: simulque o-
mnia subacta cēnāthino cerato excipito.
Si per hæc sudor non supprimatur, vuæ
acerbæ succus miscellæ addēdus est. suc-
cus igitur iste quē Græci omphacion vo-
cāt, cū maximè acerbus est, & acacia,
& gummi, & rhous esculētus, & alumē,
& palmulae, & rosarum succus benè o-
lens, simul omnia cū nardo & labruscæ
pinguiori parte pectori superponantur.
huiusmodi

huiusmodi nanque epithema iuxta refrigerat & adstringit. Decumbat verò æger in aere frigido, aut & ad vrsam. domus vergat. at si & frigida boreæ aura afflabit, malè spirantem animum excitabit. Moretur autem & prope virentia prata, fontèsque, & obstrepentes riuos: nam & ab his emanans bonus halitus, & mentis delectatio, animam fouet, & naturam suscitatur, vitæque restituit: quin etiam cibi potionisque desiderium lacessit. Cæterum si quis ob inopiam hæc assequi nequeat, imitari oportet & auram frigidam ramorum benè olentium voluptariis flabellis, & tempus vernum foliis ac floribus præsentibus humū stermentes. Operimentum quoque leue sit & obsoletum, vt aerem quidem accipiat. calorem autem pectoris exhalare permittat. optimum verò est vetus linteū. Ceruices quidem & iugula & pectus polenta conspergito, vt odoris suauitate nutriat, siccitate coerceat. item & pollicem quidem corporis raras partes contigito: necnō & faciem terra Samia lineo sacculo cribrata, & raro linteolo inclu-

fa respergito, vt minutissimus puluis in frontem & malas excutiat. calx præterea extincta, & gypsum exustum per lineum paruum sacculum, quem Græci criseram vocant, transmissa sudore mudentibus iniiciantur. Compressit sudores nonnunquam & spongia ex frigida faciei admota: dilabentes enim humores coguntur, & cutis raritas conspissatur. Prodest etiam sedem inungere, vt frigidus flatus, & ab alimento exortus effundatur. Item reuocandus excitandusq; est extremorum calor illitu gleucini olei, aut Sicyonij, quod ex agresti cucumere efficitur, cum pipere, castorio, nitro, & cachry: modicum ceræ in eis eliquando, vt inunctio membris inherescat. Illitio quoque ex adarce (limnestida vocant) euphorbio, & lauri bacca calorem exuscitat: pariter, & bulbi crudi, illi inquā qui exigui & rubri sunt, cū pipere & aceti fæce læuigata valētissimum pedib⁹ cataplasma imponitur: sed intrahoræ spatium illud frequentissimè auferendum est. instat enim periculum vlcis & vesicarū. Porro ab his spes af-

fulget ita agrotantem perniciem euasurum. Quod si omnia secundum rationem medicus præstet, recteq; omnia cedant, cum syncopa si inflammationes quoque adsint, discutiuntur: sudor nusquam effluit: calor in quamlibet corporis partem ad extremos usque pedes, & summas nares diffusus reuiuiscit: facies vegeto colore decoratur: pulsatio in magnitudinem efferuntur, nihil tremuli, sed vehementes: vox autem consueta reuertitur, & canora est: ipseque prorsus viuus efficitur. lassitudinem quidem haud exigua percipit, verum dormire etiam conspicitur. atqui si ipsum somnus occupauerit, cibaria plane concotuerunt, sensus mali obliterabitur, naturæque vis egerminabit, & reuifescet: cumque à somno expergiscitur, bene spirat, levis est, expeditus & robustus: reuocat autem in memoriam morbum ceu quoddam somnium. At nonnulli sunt quibus febres obscuræ, tanquam morbi reliquæ, remanent: nonnunquam & inflammationes modicæ, & lingua arida, & sudoris priuatio: præterea rigent, torpent,

dissoluuntur . hi sanè in tabè prolabuntur . Tunc verò tempus terendum nō est quiete & victu tenui , sed ad motiones æger traducendus per gestationes , frictions, & lauacra, quò vitæ residuum à morte vindicetur , augeatur, ac recreetur . Propinandum verò est etiam lac, maximè mulieris quæ proximè peperit, puerumque nutrit. hi nanque alimento vt nuper in lucem editi pueri, egēt. si lactis humani copia non datur, alinæ quæ non pridem peperit, lac accipito: tenue est enim ac fluxile huiusmodi lac . Post hæc ad resumptionem & ad consueta æger ducendus est.

CVRATIO CHOLERAE,
cap. I I I I.

IN cholera eorum quæ eiciuntur, suppressio mala est: cruda enim sunt quare nos oportet ea facilè spontèque ex euntia libenter permittere: si non exeāt, incitare aquam tepidam sorbitioni dantes, assiduè quidem, sed paucam, ne tentiones inanes in stomacho fiant conuul-

fioni similes: si torquentur intestina, & pedes frigescent, irriganda est aluus calido vnguine, in quo ruta, cuminumque incocta sint: vt flatus digerentur dissipenturque. lana quoque imponenda est, & pedes inungendo molliter fricare oportet, contrectando magis quam premendo. sed genibus tenus hæc fiant: vt caliditas quæ abierat, reuocetur. Hæc verò tantisper facienda sunt, donec stercora per inferiora deiiciantur, & superius biliosa efferantur. Sin autem omnia antiqua stercora deiecta fuerint, & biliosi humores transierint, biliosusque vomitus & distentio adsit, fastidium, anxietas, viriū labefactatio, tunc frigida aquæ cyathi duo, aut tres propinandi sunt ad ventris adstrictionem: vt retrogradus humorum cursus cohibeatur: vtque stomachus ardens refrigeretur: assiduè verò id, cum potam aquam vomuerit, facito. facile quidem frigida in ventre incalescit: verum cum stomachus euomit, à calida pariter ac frigida dolore affectus, semper autem frigidum potum expetit. Porro si arteriarum motus ad paruita-

tem lapsi fuerint, necnon assidue & frequenter micent arteriæ, sudor circa frōtem & iugula, & qualibet corporis parte stillatim effluat, alui profluvium nō sistatur, & ventriculus adhuc euomat cum distentione & animi deliquio, parum vini odorati & adstringentis aquæ frigida infundendum est: vt præ odore sensus excitetur: ob eiusque potentiam roboretur, & corpus ob nutritionem recreetur. vinum enim celeriter sursum petit, vt retrogradum humorum fluxum coerceat. tenue verò est, vt facile diffusum naturæ ad sanitatem recuperandā opem ferat: validum quoque, vt vires dilabentes fulciat, atque sustineat. In-spergenda est etiam nonnunquam recens & benè olens polëta. Verum enim-uerò si omnia vrgeant, sudor & tentio non stomachi modo, sed etiam nervorum, singultus inanis, & pedes contendātur, & aluus multa excernat, & homo caliget, & pulsatus arteriarum ad immobilitatem vergant, tunc huiusmodi ægroti statum prævertere opus est. Quòd si iam adsit, frigida ac vini multum præ-

bendum est, & nequaquam meracius, ne fiat ebrius, ac ne lædantur nerui, sed cū cibo, & panis buccellis madefactis. Præbere quoque aliam escam conuenit, qualis à me in capite de Syncopa tradita est, item fructus mollioris corticis, oporam Græci vocant, adstringentes, sorba, mespila, mala cydonia, vuam. Cæterum si omnia euomit, & stomachus nihil retinet, ad calidas potiones & cibaria recurrendum: nonnullis enim hæc mutatio vomitionem compescit: calida verò calidissima sunt. Sin horum auxiliorum nullum proficit, cucurbitula in interscapulo affigenda est, atque infra umbilicum. verum assidue cucurbitulæ mutandæ sunt: nam si diutius permaneant, dolorem ciunt, periculumque est, ne vesiculas excitent. Profuit interdum & auræ motus suavis, ut & spiritus reuiuifcat, & cibus in vetriculo remoretur: utque melius ægrotus spiret, meliusque arteriæ micent. At si hæc in peius labantur, vetriculiq; talia imponenda sunt, qualia & ad syncopam supra memorauimus: palmulæ vino madefactæ, acacia, hypocystis,

hæcroseo cerato excepta, linteoloque
illita ventri imposito: pectori autē ma-
stichen, aloem, absinthij comam tritam
cū cerato nardino superdato: aut cēnā-
them toti pectori inspergito. Pedes ve-
rò & musculos, si cōuellātur, Sicyonio,
gleucino, aut veteri oleo cum exigua
cera perungito, castoreo quique re-
spergito. Porro si frigidi etiā pedes sint,
vnguine ex adarce & euphorbio inun-
gito, & lanis obuoluito, & manuum pal-
patione foueto. quin etiam dorsi spinā,
tendones, & musculos, necnon & maxil-
las iisdem inungere expedit. Quod si
post hæc sudor & venter suppressi fue-
rint, & stomachus cibos admittat, neque
euomat, pulsus magni & validi sint, & cō-
uulsio desinat, sed calor ubiq; increseat
& extrema infestet, somnus verò omnia
concoquat, secundo die aut tertio soluē-
dus est æger, & ad consueta mittendus.
At contra si omnia vomitu reiiciat, su-
dor perennis effluat, frigeat laborās, & li-
uidus fiat, pulsus etiā propè extincti sint,
& vires cadāt, cū ita inquā se habuerint,
inde honestā fugā capescere bonum est.

IN voluulo dolor est perimens ob intestinorum phlegmonem, distentio adest, & inflatio, celerrima ac fidissima perniciēs impendet. nonnulli enim desperata salute ægrotantes mortem evidentem tantummodo formidant: aliqui verò in voluulo ob cruciatus acerbitatem mortem expetunt. quocirca neque remedium vllum morbo inferius, neque debilius medico adhiberi opus est. Verum si morbi causam inflammationem esse inuenerit, venam in cubito magna sectione aperiat, quò multus subito sanguis inflammationis alimentum, vel usque ad animæ deliquium effundatur. Etenim hoc vel sedandi doloris, vel stuporis ac sensus priuationis initium est. In voluulo autem recreatio est ac respiratio, vel ad breue tēpus (licet præ ignorantia) tormēti dilatio. quandoquidem hominibus ita viuentibus mori beatum est: medico autem cuiquam mortem inferre nefas ducitur. Sed fas est interdum,

cùm præsentia mala euadi nō posse manifestè prouideat, grauitate capitis torpida ægrotum sopire. Sin absque inflammatione ob corruptionem, aut ingens frigus voluulus prouenerit, venæ sectio dimittenda est: reliqua autem omnia facienda. Consulendum est igitur, vt à potu aquæ tepidæ frequenter euomat, oleū bibat, deinde rursum euomat, flatus inferius irritamentis educendi. irritatoria quidem sunt cyclamini succus, & nitrū, aut sal: flatus autem euocant cuminum, & ruta. igitur his omnibus cum resina terebinthi sedem oblinere oportet, & spongiis fouere: aut hæc per clysteres infundere cum oleo, melle, & hyssopo, & cucurbitulæ syluestris carnis decoctio. Quodd si sterCUS excretum sit, iterū oleum calidum cum ruta iniiciendum: id enim si intus moretur, fomentum intestinis propitium est. præterea dolentes locos oleo, in quo ruta & anethum abundè incocta sint, perfundere conducit. Adhibeantur & foci ex lentibus figulorum aut fabrorum ferrariorum, aut ex milio & sale vstulatis. Cataplas-

mata verò præter vulgata funto, lolij farina & cuminum, & hyssopi aut origani coma. Cucurbitulæ quoque leues quidem, sed frequentes, alia iuxta alias abdomini & ilibus ad inguina vsque admoveantur: quin & à tergo coxendicibus ad renes vsque & dorsum : vbique enim quisque omnia dolorem leuantia faciens iuuat. Præbibat autem cumini, aut rutæ decoctum, & Sinonis, aut vnâ cum his aliquod ex anodynis appellatis medicamentis: infinita autem alia ab aliis probata experimento inuēta sunt. Bonum verò est & ex viperis medicamentum plus consueta portione potui datum. Cæterum si neque dolor remittitur, neque flatus, neque sterc^o deiecitur, purgatorium pharmacum, quod hieram vocant, necessario dandum est: aut enim simul cum pituita & bile pharmacum vomitu expellitur: aut descēdit, flatum, dura stercora, pituitam, bilem ipsius malifomenta secum educens. Alimenta exhibeantur aluum ducendi vim habentia, iuscula gallinarum, ostreorum insigni pulchritudine præditorum,

ordei cremor cum multo oleo decoctus, quod à principio ante decoctionem infusum sit: habeat verò cuminum, nitrū, porrum cum coma. Aut medela adhibeatur cum aliquo iure ventrem subducente, cochleæ valde elixæ, & ipsarū succus. Itellinæ aqua potui detur, si febricitet, cū assaro, aut nardo, aut cachry excocta: nam hæc flatus eliciunt, vrinam cient, & spirandi potestatem facilem reddunt. At si dolor absit, & vinum bene facit, vt intestina calefiant, vtq; vires labantes confirmantur. prodest etiam fœniculi radicis decoctum, si bibatur, & adiantum, & cinamomum. si ad abscessum inflammatio conuertatur, huic opẽ ferre satius fuerit medicamentis abscessui conuenientibus vtentem: ea verò in libris de Lõgis morbis descripta sunt, vbi colici affectus sanatio traditur.

CVRATIO ACVTORVM
iecoris vitiorum, cap. VI.

IN iecore sanguinis creatio est, & in totum sanguinis à iecore emanatio: ac

omnino iecur est veluti sanguis gelat°. ideo phlegmonæ hoc loco acutissimæ sunt. hac enim in parte alimentum residet. Sin vsquam alibi phlegmone constiterit, non vsque adeo acuta est: adueniens enim sanguinis accursus. in iecur autem non opus est aliunde effluere. nam si obstructio aliqua exitus occludat, iecur effusione priuatim repletur abundatq; sanguine: alimenti verò ad iecur transitus adhuc patet. aliud est enim iter alimenti à ventriculo & intestinis in omne corpus. Quocircà euacuare facile oportet venam cubiti secando, multum quidem sanguinis, sed non semel totum detrahendo. Inedia primum rubēda est, postea cibi paucitas, vt & medicamentis ingredientibus iecur inane pateat. Insuper medicamētis exterius appositis, quæ in iecore aceruata sunt, discutere oportet. igitur illinatur aloë, aut nitro, lanæ æsypo sordentes admoueantur. Refrigeratione quoque opus est. iecur enim sanguine accenditur: nam sanguis calidus est. Huiusmodi ergo cataplasmata sunt, accipiatur farina loliacea, aut

irionis, aut ordeï, & feminis lini: ex humoribus autem vinum acidum, cydoniorum succus, capreolorum vitis, labruscæ maturæ, aut oleum cum ea. Item cum spongiis fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentisçi, pulegij, iridis. per ista mitigato morbo cucurbitula maior applicetur, vt ex omni parte hypochondrio circundetur: atque altius concidenda cutis, vt multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirundines quàm scarificationes magis placet. nam eius bestiolæ morsus altius penetrat: verùm erosiones quoque maiores facit: vnde & sanguinis effluuium ægrè supprimitur: cūq; sanguinis potu saturata hirudo ceciderit, cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quod si satis euacuatū sit, vulnera medicamentis sanguinē coercentibus morfuq; carentibus obtegēda sunt, vt araneorum telis, manna aloeq; inspergēda: panis cum ruta aut sertula aut althææ radicibus elixus superdandus. tertio verò die ceratum cum myrobalano aut absinthij coma & iride conue-

nit. Quin etiam & malagmata vocata
medicamenta talia esse debent, vt ex-
tenuare, aut rarefacere, aut vrinam cie-
re valeant. optimum sanè est medica-
mentum ex seminibus cōstans: quorum
omnibus medicis experientia perspecta
est. bonum est & illud in quo aut sam-
pſucus, aut fertula ponitur. Cibi tenues
sunt, labiles, lotium mouentes, pene-
trabiles: alica cum mulsā, & sorbitio
ex ea cum sale & anetho. Ordei verò
cremor & detergēdi facultatem habet:
at si & dauci seminum nonnihil adda-
tur, ad vrinam lacessendam præstan-
tior est: subducit enim per alueolos, qui
à iecore in renes pertinent. opportunus
verò est à iecore effluentibus illuc tran-
situs & vasorum laxitate, & itineris re-
ctitudine. Idcirco & cucurbitulis ea nos
trahere oportet eo loco, vbi renes sunt,
secundum os coxendicis applicantes.
Cæterum & hi vngvine cum ruta, aut
odorato iunco, aut calamo aromati-
co irrigandi sunt. per hæc vtique
ægotum posse mortem effugere spe-
randum est. Sin ad suppurationem,

conuertatur, pus mouentibus medicamentis vtitor, quotquot à me in sermone de Colicis, literis prodetur. Cum pus autem iam genitum fuerit, quo modo incidendum, quo modoque medendum sit, alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt, si quando & inflammationis acutæ calamitas eum inuasit.

CVRATIO ACVTI MOR-
bi dorsalis venæ & arteriæ,
cap. VII.

VENÆ concauæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem maiores nostri appellauerunt. nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur, ignis acutus & acer, fastidium, sitis, anxietas, pulsus palpitans in præcordiis, & in auersa parte quam Græci metaphrenon vocant, & quotcunque à me in volumine de Signis relata sunt. Nempe & in syncopam tendit ignis, quemadmodum & in ardoribus: siquidem venæ radicatio

dicatio(vt ita dicam) iecur est: arteriæ
 verò principium cor. haud ab re igitur
 existimes eorum viscerū supremas par-
 tes maximè ad vitam facientes ægrotare.
 Etenim cor arteriæ calorem imper-
 tit, venæ autem sanguinem iecur infun-
 dit. Amborum verò magnorum visce-
 rum magna sunt germina, ipse videlicet
 phlegmonæ. Venas itaq; in cubito pro-
 tinus cædito, multumque sanguinis, sed
 non semel totum mittito. imò & bis, &
 ter, & alio die, quò interim vires instau-
 rentur, repetito. Deinceps cataplasma-
 tis vtitor, & cucurbitulam præcordiis,
 vbi est arteriæ transitio, necnon & inter
 scapulas (nā ibi quoq; pulsationes sunt)
 affigito, liberiusque scarificato, & mul-
 tum sanguinis detrahito: haud enim ita
 facilè ex horum vasorum inanitione in
 animæ defectum homines cadunt. Ve-
 rùm & alius præter consuetudinem val-
 de suppressa ad lubricitatem per clyste-
 rum molliores infusiones est reuocan-
 da, acribus autem minimè vtitor: nam
 hi facilè in febrim incidunt à muria &
 nitri liquatione. ideo lini seminis & fœ-

ni Græci succus esto, & radicū maluæ decoctum ad prouocandum, & ad mordendum satis est. Extremas partes, pedes videlicet & manus gleucino oleo, aut Sicyonio, aut ex adarce vngvine excalfacito. nam partes istæ in ipsis valde frigescent. Præterea ante cibos potui dato quæ lotium euocant, meon, asfarum, absinthium. nitrum quoque inspergito. sed omnium valentissima est cucurbita, & cinnamomum, si quis eius copiam habeat. Lac istis & alimenti, & medicinæ vim præbet: etenim refrigeratione indigent, cum in eorum visceribus veluti quidam ignis exæstuet, & dulci alimento, necnon & multo in parua mole: has nimirum virtutes alimenti lac obtinet: esto autē mulieris quæ proximè peperit, & duob⁹ lactis cyathis vnus aquæ admisceatur. lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur. Cibaria concoctu facilia præbeantur, plerique succi, fœniculi radix, & apij semē indatur & mel: aqua verò quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam sudores elicere, & vbiq; distillationes hu-

CVRAT. ACVT. LIB. II. 323

midas & fluxas facere. Caput sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori & sinistrae mammae, quale in synopa, superdetur. Cubile rectus decubitus: ut omnia his similia sint, quae in ardentibus febribus fiunt. Exercitatio modica ad sudores euocandos, necnon & balneum, si iste interius exardescit. neque enim iudicationibus huiusmodi vitia soluantur, etsi ardoris species sunt.

CVRATIO ACVTI MOR-
bi in renibus, cap. VIII.

PEracuta sane in renibus inflammatio exoritur. simul enim inflammantur à iecore in renes discurrentes venae: cum illis autē & iecur: cū haud ita praelongae sint, sed valde late adeo, ut renes proximi iecori suspensi esse videantur. Verūm & urinae retentio inflammationi superuenit, vehementia inflammationis adaugens: nam renum caua lotij non exeuntis alluione replentur. Porro idem & in calculis evenit, si in renibus calculus urinae canalium laxitate maior oriatur, qui non

X 2

egrediens inhærescit, atque sic & ipse
vrinam intercludit. Cæterum de calculorum
creatione in libro de Lōgis mor-
bis sermonem habebimus: quomodo aut
ne coalescant, aut iam concreti exteran-
tur comminuanturque. De calore au-
tem atque obstructione, quacunque ce-
lenter enecāt, in præsentia differemus.
Si calculi iam conflati sunt, adestque in-
flammatiō, venam cubiti, nisi ætas præ-
pediat, secato: benè fluidus autem mul-
tusq; sanguis exeat: neque enim phleg-
monæ tantum euacuatione mitigantur,
sed etiam calculorum intrusiones vaso-
rum inanitione laxantur: quin etiam
per mictum calculi elabuntur. Postmo-
dum irrigationibus gleucini aut cypri-
ni olei, & fomentis & cataplasmatibus par-
ticulæ remittuntur. Artemisia verò her-
ba, & iuncus, & odoratus calamus in ca-
taplasmatibus esto. Deinde cucurbitulam
renibus in regione coxendicis adhibe-
to: maxime nanque ab ea parte euacua-
tio profuit. Alius præterea ducatur per
clysteres cum lubricis, & viscidis potius,
quàm acris, ex maluæ, aut fœnigræci

cremoribus. nonnunquam verò medica-
menta ante cibos vrinam citantia den-
tur, qualia in vitiis iecoris narrata sunt:
pariter & cibaria similia, concoctu faci-
lia. cruditas enim istis noxam affert.
Optimum sanè lac est, maximè quidem
asinæ, secundo equinum: ouillum autem
& caprinum confert, quatenus lac est. Si
pauperes ægroti sint, eos lauare satius
est: sin minus, in decocto herbarum desi-
dant vmbilico tenuis folio repleto. Ve-
rùm si ad pus vergat, quibus cataplasma-
tis ac medicamentis vtendū sit, multis
in locis superius traditum est. At si cal-
culus institerit, fomentis vtique, & cata-
plasmatis iisdem vti oportet. calculi ve-
rò medicamentis potabilibus conteren-
di sunt, simplicibus quidem sio, & prio-
nite (asplenum puto) herbis cum oleo
aut aceto esculēto decoctis: earum quo-
que succo potui dato: compositis autem
ea antidoto, quæ Bistimus appellatur, &
ea quæ ex viperis constat, & bestia, quæ
coscinos, id est cribrum, dicitur, & quot-
cunque experientia optima esse com-
probauit. Gestationes istis, & corporis

concussiones ad monendum propellendumque calculum bene faciunt : nam calculorum in vesicam transitus ingentes dolores concitat. quòd si inde exciderint, dolor tollitur, vt neque per somnium dolorẽ sentire sibi videri soleant. quin etiam tanquam ex inuitabilibus malis animus perterritus soluitur.

CVRATIO ACVTORVM

vesicæ affectuum, cap. IX.

ET vesicæ acuta vitia renalibus similia proueniunt, phlegmone, & vlcera, & lapides, & grumorum obstructions, à quibus vrinæ suppressio, & stillicidium exoritur. sed in hoc membro acutior dolor est, interitusq; celerrimus: vesica enim neruus latus est. At renes veluti concrementum sanguinis iecoris speciem habent: in quibus & grauissimi, & maxime miserabiles morbi incidunt: vnde mars cum maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit. Protinus igitur ventris ea pars laxa, quam ceneona Græci vocant, secanda est, multoq; oleo

CVRAT. ACVT. LIB. II. 327

cum ruta & anetho vesica est irriganda. Si concretus sanguis doloris, impeditur; q; vrine auctor sit, oxymel bibere debet, aut calcis parũ cũ mulsã, quò grummi dissoluantur: deinde quæ vrinã mouet, & herbæ, & semina exhibenda. Sin ex sanguinis effusione periculũ instet, absque vlla cunctatione ei magis quàm cæteris subueniendum: neq; enim id leue discrimen est. Nempè medicamina sanguinẽ coercentia opem ferunt: opem fert autem vesicæ refrigeratio, ex rosaceo & vino irrigatio, & cum lanis succidis obuolutio. Epithema bonum est, palmulæ ex vino cum malo punico, aut succo rhois. Verũ si auersatur epithemata grauiã, & vehementes refrigerationes, (cauẽdũ est enim vesicæ natura frigida tenuisq; ne ita multum refrigeretur) eam gleucino illinito, aut acacia, aut hypocystide ex vino. A spongiis verò, nili valde vrgeat sanguinis eruptio, abstineto. Escæ triticæ, coctũ faciles, bonum succum gignentes, lotiũque educentes præbeantur, quales à me in capite de Renibus comprehensæ sunt. Lac, vinum

dulce, Theræū, aut Scybellite. Medicamenta potabilia sunt, vrinaria, bene olentia, fluxilia, & id genus alia. Vtilissimum utique vesicæ remedium cicadæ sunt tempore suo tostæ pro cibo exhibitæ. extra tempus autem aridæ tritæ cum aqua: sed radicis nardi parum cum cicadis elixetur. in iisdem quoque loco balnei ad vesicæ laxamētum æger desidet. Quod si lapillorum interpositio mictū impediat, oriculario specillo lapis amouendus est, urinæque educenda, nisi adsit phlegmone. in phlegmonis nanque neque meatus instrumētum admittit: præterea oriculario specillo vulnerantur. At si expediri medicatio nequit, homoque doloribus consumitur, locum eū qui sub glande est, ceruicēque vesicæ incido, ut lapis excidat, atque urina effundatur, ac deinde potissimum medendū est ad cicatricem vulnus ducendo: sin minus, puris effluuium, quod rhœas Græce dicitur, factum esse pro futura hominis vita satius est, quàm ut tormentis miserimè cruciatus intereat.

Vlva in mulieribus membranis ex-
tentis hinc atque inde secundum ilia
continetur, ac perinde atque animal vi-
tia in olfactu patitur. nam ad benè olé-
tia delectationis causa se recipit, foedè
olentia contristantiâque præ molestia
refugit. Igitur si aliquid superius triste
offeratur, vulva ad naturalia descendit:
si extra, ostio naturalium apponatur, re-
tro sursumque recedit. nonnunquam ve-
rò in hoc aut illud latus ad lienem, aut
iecur mouetur. ad recessum eius autem
contractionemque membranulae, vt in
nauibz vela, cedunt atque consentiunt.
Hæc verò illi & propter inflammationē
eueniunt. Nam si eius ceruix afficitur,
atque intumescit, fit prominentior. Si
in fundo exoritur inflammatio, sursum
repat. Sin ad pedes foras vergat, turpis &
immunda res est, dolores afferens & cō-
tristans, præterea difficulter ambulare
potest, & in latus & supina decumbere,
nisi pedes mulieris phlegmone laborēt.

At si ad superiora vulua recurrerit, quā-
ocyssime hominem strangulat, vrget au-
tem spiritum comprimens: neque enim
prius conqueri & clamare, & opem ab
adstantibus petere valet, quòd nonnul-
li hisque pluribus respiratio, nonnullis
autem vox celerius intercipitur. par est
itaque eos qui his miseriis intersunt, prius
quàm mulier intereat, medicum accer-
fere. Verùm si forte aliquando occurre-
ris, cognita phlegmone venam scindi-
to, præcipue quidem eam quæ in mal-
leolo: quæ si non bene fluida sit, eā quæ
in cubito est, petito. Sed à vena malleo-
li sanguinis missionem repetito. Alia
verò omnia administrato, quæcunque
strangulatui & citra inflammationem
subueniunt: qualia sunt manuum ac pe-
dum vincula ad torporem vsq; adstrin-
gentia: fœdè olentium olfactus, vt li-
quidè picis, capillorum, lanæ quæ exusto-
rum. flammæ in lucerna extinctæ nido-
ris, castorei, quod præter fœditatem odo-
ris nervos etiam refrigeratos calefacit.
lotium præterea vetus vel demortui fe-
rè corporis sensum magnoperè suscitât,

CVRAT. ACVT. LIB. II. 337

& vterum ad inferiores partes abigit. Porro medicamenta odorata naturalibus sunt imponenda: vnguentum verò leue fit & minimè tactum vellicans, nardus, aut bacchar AEgyptium, aut vnguentum ex malabathri Indicę arboris folijs compositum, aut cum aliquo odorato vnguine tusum cinnamomum: atq; his muliebres locos oblinito. Quòd si ex his fusile medicamen confletur, illud in vuluam infundito. anum quoque flatuum eductoriis inungito. per clysteres quoque non acres, sed molles, viscidos lubricosque humores indito, vt sterora solum eiiciant, sedesque vtero ampla vacuęque remaneat. id succus althææ, fœnigræcię præstabit: sertulam verò, aut samplicum cum oleo decoquito. Cæterum si maiore vi, aut depulsiōe vulua egeat, tunc validæ mulieris aut viri benè tenacis manibus hypochondrium comprimatur, aut fasciis adstringentibus succingatur: quò in angustum locus redigatur, neque iterum sursum versus vulua procurrat. Item naribus apprehensis sternutamenta citen-

tur. quibusdam enim sternutamento & contétione vulua in propriam sedé redire potest. in nares autem puluis inspiretur ex radice lanariæ, aut piperis, aut castoris. Item leues cucurbitulæ in fœminibus, ilibus, coxis, inguinibus attrahendæ vuluæ causa defigantur. amplius & dorso inter scapulas strangulatui subueniens admoueto. Sin à phlegmone strangulatus proueniat, vena ad pubem veniens scindenda est, multumque sanguinis fundendum. Item faciei frictions, capillorum euulsiones, vt mulier ad se redeat, simul benè facient. At si vel parum tolerare poterit, in decocto aromatum desidat, odoratisque suffumigetur. Ante cibos castorei paulum bibat, & hieræ paulum cum castoreo. Quòd si ferre valet, lauetur, & in tempore ad antiquos vsus reuertatur: detq; operam mulier, vt quàm facillimè menses elabantur.

CVRATIO SATYRIASIS,

cap. XI.

Neruorum in virilibus inflammatio penis tentiginem facit cum appetitu

contristationeque in actu venereo. sunt
autem distentiones neruorum conuul-
sioni persimiles, nunquam mitigabiles.
Quin & ipso concubitu sedari non po-
test ista calamitas. Mentis quoque alie-
natio sequitur. nam primum quidem im-
pudentes euadunt, dum cū sum suum li-
cētiosē narrant: audaces enim eos coeū-
di insatietas efficit. Postea verò cū af-
fectus iste desierit, tunc ad se redeunt, &
mente optimē constant. Igitur omnium
horum causa venam in cubito & in talo
aperias, & multum cruoris, ac saepe de-
trahas. neque enim id temporis intem-
pestium fuerit & ad mentis stupefa-
ctionem, & ad inflammationis remis-
sionem, & ad caloris virilium mitiga-
tionem faciendam, animæ deliquium
afferre. quippe sanguis multus calorem
& audaciam valde accendit, inflamma-
tionem alit, mentis perturbationem cō-
fusionemque veluti esca ignem pro-
creat. Omne corpus etiam medicamen-
to, quod hieram, id est sacram vocant,
purgato: neque enim purgatione solum
egent, sed etiam leni medicatione: vtrū-

que autem præstare hiera potest. Insu-
per genitalia, & lumbos, & locos inter
fœmina & inguina (plechada Græci vo-
cant) & locum inter anum & scrotum
(perinaeos Græce dicitur) & testiculos
lanis ab oue detonsis adhuc sordentibus
obuoluito. sed lanas rosaceo ac vino
perfundito: partesque istas multa irriga-
tione madefacito, ne ab lanis caliditas
oriatur: imò natiuus calor à frigida hu-
morum potestate obtundatur. Eiusmo-
di quoque cataplasmata superdanda, pa-
nis cum plantaginis herbæ succo, & so-
lano, & feride. & papaueris foliis idque
genus aliis, quęcunque torporem, frigo-
raque iniiciunt. necnon & similibus vi-
rilia & locos inter inguina & fœmina,
& coxas illinito cicuta ex aqua, vel vi-
no, vel aceto: item mandragora, aut aca-
cia, & spongiis vice lanarum vtitor. In-
terea subluenda aliud est maluæ deco-
cto, & oleo, & melle: omnia verò acria
vitentur. Defigantur in coxa cucurbitu-
læ, aut in abdomine. Optimę sunt autem
& hirudines ad sanguinem deorsum at-
trahendū. Et super vulnera cataplasma

CVRAT. ACVT. LIB. II. 335

imponatur micæ panis cum althæa. Postea in aqua desidat, vbi artemisia, saluia, conyzaq; decoctæ sint. At si longiori tempore vitium extrahatur. neque multitudo secundum proportionem minuta fuerit, & neruorum conuulsionis metus adest, (nam facile in his affectibus conuelluntur) curandi rationem mutare opus est. quippe calefacientia admo- uenda sunt, gleucinum scilicet oleum, aut Sicyonium prorosaceo. lanis autem mundis & cataplasmatibus tepescientibus partes illæ contegendæ: quandoquidem neruorum inflationes nonnunquā huiusmodi curatio mitigauit. amplius & castoreum cum mulsâ bibitum. Cibariorum parum nutrientia frigidaque sunt: pauca triticea: plurima olera, malua, bliton, lactuca, cucurbita elixa, cucumis maturus elixus, pepo suo tempore collectus. A vino, & carnibus, longo temporis interuallo abstineto: siquidem vinum est neruorum calefactio, animæ remollitio, voluptatis renocatio, genituræ creatio, venerisq; excitatio. Hæc à me in acutos morbos remedia scripta sint.

Oportet autem & iuuenem medicum
ipsum suo marte aliqua sibi comparare,
neque omnia ex alienis commentariis
depromere. Hoc sanè pacto acuta vitia
fiunt, vt ordine singulis quę scripta sunt,
aut omnibus vti valeas.

ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM DIV-
turnorum curatione,
Liber I,


IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

| | |
|--|------------|
| Prooemium, | cap. I. |
| Curatio cephalææ, | cap. II. |
| Curatio vertiginosorum, | cap. III. |
| Curatio morbi comitialis, | cap. IIII. |
| Curatio melancholicæ, | cap. V. |
| Curatio furoris, | cap. VI. |
| Curatio neruorū resolutionis, | cap. VII. |
| Curatio phtisis seu vlcerum pulmonis, | cap. VIII. |
| Curatio purulentorum, | cap. IX. |
| Curatio pulmonis abscessuum, | cap. X. |
| Curatio asthmatis, | cap. XI. |
| Curatio pulmonariorum, | cap. XII. |
| Curatio vlcerū iecoris, & effusionis pu- ris, | cap. XIII. |

Y

Curatio lienis, cap. XIII.
 Curatio morbi regij, cap. XV.
 Curatio cachexias, cap. XVI.

PROOEMIUM, cap. I.



N longinquis mor-
 bis dilatio medelæ
 mala est: nā ob cun-
 ctationē in vitia in-
 sanabilia prolabun-
 tur. Inflatio sanè ita
 habet, vt non facile
 recedat, si semel inuaserit: at si & diuti⁹
 trahitur, temporis spatium vires acquirit:
 & nonnunquam euenit vt commoria-
 tur. Exiguos quoque morbos maiores
 excipiunt: cūque priores discrimine
 vacarēt, eorum soboles perniciose exo-
 ritur. Itaque nullo pacto ægrotum sile-
 re conuenit, ne morbus deprehēdatur,
 erubescens: neque aufugere vim cu-
 rationis metuentem: neque medicum
 pigrū esse, ignauūque oportet: vtrun-
 que enim ad morbum insanabilem effi-

CVRAT. DIVT. LIB. I. 339

ciendum consentit. Nonnulli autē sunt ægroti, qui præsentium, necnon & futurorum ignoratione ad finē vsque cum morbo degunt. Nam plerique neque perreunt, neque futurā mortem suspiciantur: quocirca neque se medici fidei committunt. Horum probatio ex cephalæa colligitur, de qua prius sermonē instituiam.

CVRATIO CEPHALÆAE,
cap. II.

CAPUT quanto ad vitam magis necessarium est, tanto difficiliōri ægritudine laborat. Atque morborum capitis inuasio quidem tolerabilis est (nam parū dolēt, aures sonant, grauitas adest) at si intendantur, finis est mortiferus. Igitur exiguos dolores ne spernito. nā & exiguis medicamentis in quibusdam discussi sunt. Si plus tēporis extrahūtur, maiores cruciatus superueniunt. propterea vena cubiti incidenda est: sed duobus ante diebus vinū bibat. tantum autem sanguinis detrahito, quantum eius vires tibi coniectati ostēderint. ve-

rūm non semel totum detrahere magnopere expedit. porro quorum vires copiosam sanguinis detractionem patiuntur, his ipsis continuo morbus discutitur: atque id omnibus longis ægitudinibus conuenit. Tribus autem quatuorue diebus interiectis liberalius alendi sunt. Deinceps purgatorium, hieram quod vocant, cum mulsā propinandum: ea enim à capite morbi alimētum maximè abducit. modus verò medicamēti quatuor aut quinque drachmarum pōdo esto. Quòd si bene purgauerit, tunc lauandus est, & vinum exhibendum, & vires augendæ. Postea iterum vena frōtis recta scindenda est: hæc enim est opportunissima sanguinis detractio. modus autem esto hemina, aut paulò plus. neque vltra sanguinem mittito, quoniā vasa inanire non expedit. Deinde capillis nouacula detractis cucurbitulam priorem vertici affigito, alteram inter scapulas citra sanguinis effusionem admovento: & eam quæ in vertice fixa est, liberius scarificato quò sanguinis vberius attrahatur, & partes profundiores

incidantur . remedia nanque ad ossa
 vsque penetrantia cephalæam iuuant.
 Quòd si vulnera cicatricem ducant, ar-
 teriæ secantur: duplices autem sunt, ali-
 quæ post aures paulò vltèrius, propriisq;
 motionibus produntur: aliæ verò auriũ
 arteriæ prorsum versus sitæ sunt aurib;
 proximæ: nam instrumento, quod anti-
 trochon Græci nominant, adducuntur.
 verùm hæ quoque propriis pulsationi-
 bus innotescūt. nempè maiores ossibus
 vicinæ secantur: hæ nanque vtilitatem
 afferunt. adiacent & aliæ singulis auri-
 bus oppidò tenues, quas incidere pror-
 sus inutile est. modum verò incidendi
 in libris de Manuum operationibus ex-
 posui. Ceterùm post medelam in cepha-
 læa, morbo comitiali, & vertigine, vtque
 semel dicam, in omnibus capitis vitis
 (prius ventre, aut purgatorio, quod de-
 uoretur, aut clysteri, euacuato) pituita
 euocanda est, modo è naribus per ster-
 nutatoria, modo ex ore per ducētia pi-
 tuitam. Species autem sternutamenta
 citantium sunt piper, radix herbæ la-
 nariæ, fibri testiculus. hæc quidem sunt

vulgata & communia, ad læuorem autem terito, & cribrato, & calamo aut crassiore pennæ anserinæ caule inspirato. His efficacius in attrahendo violentiusque euphorbium est cū aliquo ipsorum admixtum. Quinetiam cum oleis miscetur, gleucino scilicet, aut Sicyonio, id est ex cucumere syluatico, aut cū vnguento ex styrace: redditur autē magnopere liquidum, vt fusile sit. infunditur per nasi fistulam: hæ verò geminæ sunt, atque ab vno canali cognatæ & coherentes adeo, vt semel vtrisque infundendum sit. neque enim tolerabilis est alterutrius naris sigillatim dilatatio. nā protinus caput acceditur, & acerbus dolor inuadit. Quæ autem per os pituita eliciunt, hæc sunt. sinapis, granum cni-dium, piper, vua taminia: id præstat vel mixta, vel singula. Cæterum quoniam & ipsa mādere, & expuere assiduum est, iccirco & cū aqua aut mulsa, aut posca permixta danda sunt: atque os eluendum. ad tonsillas enim impulso humore extentoque collo expirationis flatu abluatur. Posteaquam pituitam, quan-

tamlibet, eduxeris, permulta aqua ca-
 lida lauandum caput, atque perfunden-
 dū: vt perspirabile atque diffilabile red-
 datur. ingētes enim obstructions fiunt.
 Cœna frugalis & simplex esto: in qua &
 vinum ad stomachi restitutionem su-
 matur, siquidē & ipse magno dolore ve-
 xatur. Interea verò vbi vires ægri sta-
 biliueris, lotionē per clysterem vsitata
 opus est: in qua nitri multum insperga-
 tur, aut resinæ à terebintho arbore pon-
 do drachmæ duæ eliquentur. postridie
 sanguis è nasi interioribus detrahatur:
 intro enim prælongum instrumentum
 immittitur, quod cateiadiō vocant,
 aut illud cui storine nomen est. aut si
 quis horum copiam non habuerit, pen-
 næ anserinæ caulem crassiorē sumere
 debet, eiusque neruosam partem den-
 ticulatim instar ferræ incidere, atque
 sic in nares vsque ad ossa, quæ ob cribri
 seu colatorij similitudinē ethmoeide
 vocatur, immittere: deinde vtraque ma-
 nu agitare, quò locus à dentibus in-
 fculpatur, ac vulneretur. Facilis est au-
 tem ac copiosus sanguinis cursus. nam

graciles venæ hîc desinunt, corporaque hac in parte mollia sunt, & sectioni habilia. verùm & multos nares vulnerandi modos vulgus nouit, herbas scilicet asperas, & arida lauri folia naribus imponentes, aut digitis eas fortiter agitates. cum verò quantum satis sit, euacuaueris, quod erit hemina dimidiũ, coerendus sanguis est spongiis & posca: aut aliquod aridum, quod sistendi sanguinis vim habeat, naribus inspirandũ, galla, aut scissile alumen, aut balaustium. Verumenimverò post hæc remedia siue dolor capitis perseucret, siue desinat, oportet ad finẽ huius medicationis peruenire: quoniam id malum sæpe reuerti solet, & in suo vigore consistens plerumque delitescit. Itaque nouacula de rasis capillis (quandoquidem & hoc capiti prodest) ferramentis candentibus vrendum est: si in superficie, ad musculos vsq; peruenias: sin ossẽ tenus penetrare velis, à musculis caueto. nam musculi exusti neruorum distentiones cient. quòd si in summa cute vsseris, vinum odoratum album cum rosaceo infundere satis est:

pittarium verò in adfectum per triduum
 supra crustas extendito. quòd si crustæ
 altius descendant, porri comam cū sale
 tritam, linteoloque illitam superdato.
 Tertio die crustis summam cutim tan-
 tum occupantibus ceratum ex rosa: pro-
 fundioribus autem lentem ex melle
 imposito. Sed quæ medicamenta cic-
 trici ducendæ sint, alio loco descrip-
 simus. Nonnulli super frontem ea in par-
 te, vbi futura est, quæ corona dicitur,
 cutim ossæ tenus inciderunt: illudque
 aut exerentes, aut excidentes usque ad
 meditullium (quam Græci diploen no-
 minant) ad carnis repletionem perdu-
 xerunt. alij & ossa ad membranam usque
 perforarunt. Verum id genus remedia
 temeraria sunt: nihilominus tamen ad-
 hibentur, si omnibus aliis têtatis adhuc
 cephalæa perseverat, & æger est animo-
 sus, vel corporis robur excellit. Nempè
 si paulatim ad sanitatem accessio fiat,
 exercitationes recto corpore pectori hu-
 merisque adhibeantur, manuum fiat ge-
 sticulatio, halteres iaciantur, saltu cor-
 pus moveatur, atque in his peritè cor-

pus torqueatur . primò & postremò
crura fricentur , medio tempore ca-
put . picatio assiduè picem inspergen-
do administretur . item caput rubrifican-
dum , nonnūquam sinapi cum duplo pa-
ne affricando , ne intolerabilis ignis ex-
citetur : nonnunquam medicamenta si-
mul illinendo , quale est illud quod ex
adarce , & euphorbio , & pyrethro com-
ponitur . proficit autem & ad dolorem
in tempore sedādum , & ad radicem ma-
li extirpandam thapsiæ succus , & medi-
camina cum ipsa iungenda , quocūque
cutim tumefaciunt , & varis similia tu-
bercula excitant . Viçus ratio in singu-
lis dolorum generibus tenuis esto : exi-
guus potus , & aquæ potio ante vllam
medelam potissimum adhibeatur . ex
toto verò ab acribus temperet , cepis , al-
liis , & succo laserpitij . à sinapi autem nō
penitus : siquidem eius acrimonia , præ-
terquam quòd stomachi vim roborat ,
capiti quoque haud ingrata est , pituitā
fundens ac diffans , aut ad inferiora de-
turbans . Leguminum pessima faba est ,
& ei⁹ species pisa , & quæ à Græcis ochri ,

CVRAT. DIVT. LIB. I. 347

& dolichi nuncupantur: illicicerculae folio similes, hi faseoli aut lobi à nonnullis vocitati. secundo loco ponitur lens: quæ nonnullis concoctionis excretionisque virtutibus prædita est: sed caput replet, dolorémque concitat: nihilominus cum pipere elixa spernenda nõ est. Far lotum haud ingratum est cum vino & melle, quantum ad condimentum satis sit: & ex ipso conflata sorbitio, & eius semina in simplici iusculo decocta. vtique bona sunt & in condimento, quod Græci caryceiam vocant, semina cari, coriandri, anesi: apij verò semen iis anteferendum. mentha herba, & pulegium præterquã quòd benè olent, quandam vim habent, & vrinam mouendi, & flatus per inferiora expellendi. Inter carnes vetustæ omnes damnantur: nuper interfecti galli carnes laudantur. Inter aues torquatus palumbus, columbus, & aliæ quæcunque haud ita multum pingues sunt, suum extremitates, lepus assatus. Bubulla ouillaque caro crassum succum creat, & caput replet. Hædus non penitus malus. Lac & caseus, ca

put dolore vexant. Ex piscibus saxatiles deligendi, & quotquot in ea regione optimi censentur. Olera elixa quidē ea assumantur, quæ lotium & ventrem citant, malua, blitum, beta, asparagi, acris verò & brassica est. At inter cruda, lactuca omnium est optima. Radices autē etiam elixæ prauæ sunt. radiculæ, rapæ, pastinacæ vrinā mouent, sed caput explent. sisarum flatus edit, & ventriculū tumefacit. Vinum album, tenue, dulce, admittatur, tantum adstrictionis habēs, quod aluum nō remoretur. Omnia bellaria capiti inimica. quin & palmularū omne genus. ficus autem & vua demulcent, & quicquid ea parte anni, quam horam Græci vocant, bonitate præstat. sed quibuscunque vel etiam iuuantibus fatiari malum est. peior est cruditas: labores minus quàm cruditas nocent: nihilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutinæ aluo prius exonerata citra spiritus difficultatem benè feruntur: optimæ sunt etiam & à cœna. gestatio longa per loca non ventrosa conueniet. atque vbi sol caput non

CVRAT. DIVT. LIB. I. 349

feriat: ei nanque sirius officit. Vfus veneris capiti ac nervis labem accersit. Peregrè proficiscatur ægrotus in regiones calidiores ex frigidioribus, & in sicciores ab humidioribus. Confert & nauigatio, & in mari vitæ traductio. & si quis sit maris accola in salsa aqua frigida lauari, in mari natâre, & in arena volutari, victumque ex mari quærere proderit. Doloris verò capitis, quem heterocraniam Græci nominant, eadem medicamina sunt. nam quæ toti capiti remedia conducunt, eadem singulis eius partibus adhibere bonum est. Quibuscunque verò per hæc morbus depulsus non fuerit, iis reliquum est, vt veratro vtantur, vtpote vltimo atq; valentissimo omnium remedio.

CVRATIO VERTIGINOSORUM, cap. III.

ET succedit cephalææ vertigo, & ipsa per se propriis de causis oritur, si profluum ab hæmorrhoidibus coercetur, si è naribus sanguis nō effluat, qui prius effluere consueuerat, si corpus non dif-

fletur aut sudore, aut labore antea fatigatum. Igitur si ab cephalæa ducit originem, ea medendi ratione vti debemus, quæ ad cephalæã supra exposita est. quibus autem violentius cum vltimis remediis occurrendum sit, posterius explicabo. Sin ab aliqua humorum suppressione morbus inciderit, vsitata excretio mouenda est. naturæ namque salutare est materiæ recursus. At si ista tardat, malum verò increfcit, in aliis quidem suppressionibus aut sanguinis è naribus manare assueti, aut sudorum, sanguis mittendus est è vena cubiti: sin ab iecore multis humoribus affluente, aut à liene, aut ab aliquo ex visceribus in medio corpore positis vertigo prodeat, cucurbitulæ subueniunt. Sed quantum ex vena defluit, tantundem per has sanguinis est detrahendum. sanguis enim est causæ alimentum, quemadmodum & ventriculus. Deinceps capitis remedia subiungenda, vena cubiti recta, aut nasi arteriæ vtrinq; in angulis secandæ: cucurbitula vertici affigenda, caput radendū, rubrumque faciendū: pituita è naribus

CVRAT. DIVT. LIB. I. 311

per sternutatoria, aut ex ore, quẽadmo-
dum docui, euacuanda: omnia denique
modo in cephalæa narrato administrã-
da: duntaxat adiicitur cyclamini suc-
cus, aut anagallidis in nares fundendus.
Postea quàm verò medicaminum capi-
tis ad finẽ perueneris, deinde quotquot
efficaciora ad vertiginosos inueniuntur,
ea sunt adhibenda. Vomitus à cœna,
necnon vomitus ab esu radicalarum
vti postea decet: quinetiam ad veratri
assumptionem hæc præparatio fuerit.
nam præexercendus est stomachus, cum
vehementioribus vomitoriis vti volu-
mus. Pituita quoque in præsentia magis
attenuatur, & ad veratrum bene fundi-
tur. Veratri exhibendi modi plures sunt,
vt validioribus quidẽ succurrat, ad ma-
gnitudinem amæ, id est placentulæ, aut
paulo crassius est incidendum: & cum
fareloto, aut lente assumitur pondo
drachmæ duæ. imbecillioribus autem
& gracilioribus decoctum cum melle
propinatur: duarum aut trium mystil-
larum modus esto. quis verò sit faciendi
modus, alio loco declarabitur. Inter fin-

gula autem remedia æger cibis reficiendus est, quò ea quæ interim incidunt, sustinere valeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est, deliganda sunt crura supra talos & genua, & manus brachialia, brachiaque infra humeros prope cubita. ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. oleo verò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederã, aut id genus alia. fricentur extrema, & facies. olfaciat acetum, pulegium, mentham, aliisque eiusmodi ex aceto. inter dentes aliquid apertionis causa imponatur. nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. in tonsillis fiat titillatio, vomitus citetur. nam interdum reiecta pituita æger à tenebris excitatur. Hactenus ad accessionis leuamen & tenebrarum discussionem dictum sit. At de vniuersa victus ratione tam in curando, quam post curationem hæc nostra sententia est. Somnus multus æque atque insomnietas inimica sunt: multus enim somnus stupor capitis sensibus iniicit: vaporum exuberantia torpet omnis actio. Hi planè grauitatis, & sonorum in auribus,

auribus & splendorū quorundā oculis
 obuersantiū causæ, morbi verò indicia
 sunt. vigilia verò cruditatem facit, ali-
 mentum subtrahit, laborē affert, corpus
 cōtristat, mentem labefactat: propterea
 facileque furere, atque atra bile vexari
 isti consueverunt. Mediocris autem so-
 mnus ad alimenti distributionem, & ad
 laborum diurnorum leuationem utilis
 est. Aluo ad excretionē cōsulendū: nam
 diffilationis causa potior aluus est. Iterū
 crurū frictio per aspera linteola vsque
 ad ruborem, deinde dorsi & laterum, po-
 stremò capitis adhibenda. ab his ambu-
 lationes circa initia & finē leniores, me-
 diæ verò acriores. Quies consistentia
 spiritus post ambulationes esto. Vocem
 leniter exercere oportet, grauibz vo-
 cibus vtentem, sonū edere. acuta nāque
 voces capitis distentiones, temporū pal-
 pitationes, cerebri pulsationes, oculorū
 inflationes, auriūque tinnitus efficiūt:
 mediocriter acuta vox edita capiti
 prodest. Postea verò gestationis tempus
 adest ad distandam totam capitis gra-
 uitatem opportunæ. longa sit autē, verū

Z

citra fatigationem, neque in tortuosis regionis tramitibus, neque assiduus itineris flexibus gestatio fiat: quoniam sic vertigines oboriuntur. sed rectæ & longæ & lenes ac superioribus locis gestationes fiant. Siquidem ita assueti sint, optimum panem solum assumant, quantus exercitationibus impedimento ne sit. prius enim concoctum esse oportet. caput & manus exercendæ, horumque frictiones faciendæ. In his verò leniter agendum: ut caliditas excitetur, & caro augeatur, & vires restituantur, postea suum ipsius caput erectum fricato diutius hunc laborem sustinens. Quin & exercitationes ad cervicis usus, & ad manuum agilitatem faciunt, si scienter fiant. sursum attollendo caput atque oculos exercere oportet. Manuum exercitatio fit, aut discorum iactu, aut certando cestibus, aut pugnis. pila verò parva & magna detrimento est. nam capitis & oculorum circumvolutiones atque intentiones vertigines afferunt. optime faciunt saltus & cursus. omnia velocia exercitia cruribus conveniunt, & omnia roborant. Frigida lavatio illuie, illu-

CVRAT. DIVT. LIB. I. 355

uies autem calida lauatione melior. astringere, densare, siccare caput frigida lauatio efficacissime potest: & hic salubris status est. humectare, soluere, tenebras offundere valētissimè calida lauatio potest: & hęc capitis morborum causas sunt, tales sunt & austri auditui graues. exercitat onibus quies succedat, vt perturbationem sedet. Capitis pressiones ad cutim polliendam faciūt. Aquæ, aut aquati vini propinatio est res optima & ad manum. coma olerum assumatur, quę ventrem molliunt, maluæ, betę, bliti. Liquamen bonum stomacho, ori suaue, aluum leniens, neque graue capiti, ex thymo, aut thymbra, aut sinapi cōficitur, Qua hyeme calida, æstate frigida, putamine spoliata, non tosta præbeantur. Oliuæ, palmulæ, falsamentum rectè conditum. Alica elota cum aliquo dulci, quantum condiendi causa assumi debet. Post hęc sal adhibendus. Ociū & quies ab audiendo & loquendo. ambulatōibus vtatur sub aere perspirabili. delectat autem locus aut arboribus consitus, aut herbidus. Vtique vertigi-

Z 2

nosus cū ad cœnam accedit, maximè iterū in frigida lauetur, parum vngue corpus sublinēs: si nolit, at crura tātum. cœna triticea esto, quale est itriō, quod est placentæ genus, aut sorbitio ex alica, aut ptisana flatu vacans, per elixationem concoctu facilis. Medicamenta verò suauiore ptisanā reddentia sunt, piper, pulegium, mentha, cæpæ aut porri paulum, neque tantum vt innatet: acetum verò acre vtiliter assumit. Carnes ex pinguibus animalibus non pingues, suum pedes & capita. Volatilia omnia, sed multitudinem coniectura metiri oportet, lepus & venatio. gallina in promptu habetur, & iuuat. Omnia bellaria caput dolore infestant præter palmulas, aut maturas ficus, aut vinas. si flatibus homo vacet, hæc bene facient. In secundis quoque mensis vtiliter ea sumuntur, quæ facilè concoquuntur, si nido vacent, & leuia sunt. Postea deambulatio, mentis hilaratio, in quiete ad somnum conuersio adhibenda.

CVRAT. DIVT. LIB. I. 357
CVRATIO MORBI CO-
mitialis, cap. III.

Ingentibus medicamentis atq; valen-
tissimis in morbo comitali opus est.
nam quoties eius in mentem venit, non
modo laboriosum malū, & periculi ple-
num, sed etiam generis morbi fœdita-
tem & calamitatis opprobrium exhor-
remus. atque ita existimo, si se mutuo
in accessionibus spectātes aegroti, quæ-
cunque patiuntur, cernerent, non ultra
vitā ducere tolerarent. verū quæ sin-
gulis atrocita fœdāque insunt, sensus pri-
uatio, intuendique sublata facultas ab-
scondit. Cæterū medendi rationē na-
turæ facilitatem sequi optimū est, quā-
do per ætatis mutationes in longe me-
lius hominem permutat. Quoniam si
vītatū malo vīctus, in quo morbus ali-
tur, defierit, non ulterius hominē infe-
stat. simul enim cū priore vīctus specie
morbus recedit. Igitur si caput occupa-
uit, inhabitat. quocirca omnia quæ à no-
bis in capite de Cephalæa relata sunt, fa-
cere necesse est: detrahendo sanguine &

Z 3

corpore purgando. Venæ autem & quæ in cubito, & frontis recta secandæ sunt: cucurbitula admouenda. non est autem vsque ad animi deliquium sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Arterię omnes, & ante & post aures incidendæ. inter hæc omnia excellēs purgatio facienda purgatorio, quā hieram vocant, atque his quæ è capite pituitam eliciunt: sed multo valentiōra sint medicamēta. siquidem istorum habitus est dolorum patiēs: hilaritas verò & bona spes id genus ægros miseros reddit. Opus est etiam ignē capiti inferre: proficit enim. In primis os perforare vsq; ad secundam laminam oportet: deinde cetratis cataplasmatisque vti tantisper, donec mēbrana ab ossibus recesserit. Terebranda ossa circuncidere conuenit: ac si paulum resistant, vsque ad spontinam auulsionem perseuerandum, quousque nigra nonnunquam istorum, & crassa membrana inuenta fuerit. Cumque per putrefactionem vel etiam purgationem audacter curante medico vulnere cicatrix inducta fuerit, ægrotus morbum

euasit. Maximè omnium capitis ad ru-
borem vsque frictions valent vsitatae
quidem, quaecunque à me superius tra-
ditæ sunt: valétior est autem, quæ fit per
cātharides. sed tribus diebus ante. quàm
his vtamur, lac, vt vesica muniatur, bi-
bendum est: cantharides enim magno-
pere vesicam lædunt. Hæc abundè sint,
cum caput affectum est. At si mediæ cor-
poris partes causam præbent, & ab his
morbus exoritur (rarissimè autem ista
fiunt: potius enim mediæ partes in con-
sensu morbi trahuntur à capite, vtpote
ab ingenti malo, quod ægritudinis ini-
tium est) vtcunque igitur res habeat, &
in his vena cubiti soluenda est: à visce-
ribus enim materiæ cursus est. Quin
etiam isti magis quàm alij purgandi
sunt & hiera, & cneoro, quam thyme-
læam vocant, & coccognidio, quæ cha-
melæa dicitur: hæc enim pituitam ex-
trahūt. per opportunū autem ipsis reme-
dium est cucurbitula, epithematum ve-
rò & cataplasmatū sylua cōnibus per-
specta est, & ea vbique scribere super-
uacuum ducimus: nisi quatenus eorum

vim nosse conueniat, quòd scilicet iis extenuare, per halitus digerere, fluxa spirabiliaque corpora reddere oporteat: item concoquentibus medicamentis calidis, aridisque, & urinam mouentibus in nutritione, & in medicatione utendum: sed omnibus præstat fibri testiculus sæpius in mense ex aqua mulsa potus. præterea quæcunque ex variis composita medicamenta idem præstant, adhibenda sunt, ex viperis composita antidotus, & Mithridatica ex pluribus constans, necnò & Bystini antidotus bibenda est: quandoquidem hæ concoquendi facultatē roborant, vtilis humores creant, & urinæ mouendæ aptæ sunt. nam quæcunque simplicia medicamēta scribere opus esset, hisce continentur antidotis, cinnamomum, casia, folia malabathri, piperis, seselisque omnia genera. & quod nam ex valentissimis remediis in istis compositis nō reperies? Fama est & vulturis cerebrū, & crudæ fulicæ cor, & domesticos feles comesos, morbum discutere. At ego istorum periculū non feci. nonnullos autem vidi nuper iugu-

lati hominis vulnere fialam subiiciētes,
atque inde haustum cruorem bibentes.
O ingentem necessitatem, quempiam
sustinere, malum malo piaculo depel-
lere: atqui ex ea ad sanitatem necne isti
peruenerint, nemo verè mihi affirmare
potest. Quin & quendam auctorem le-
gi, qui humanum iecur epulandum ap-
poni præcipiebat. sed hæc illis scripta
sunt, qui ad hunc vsque miserie termi-
num peruenerunt. Præterea & victu
opitulandū est, & singulis remediis, quæ
aut ab aliis, aut ab ipsomet ægro fieri
possunt. vtique in hoc casu nihil spernē-
dum est, nihilque temerè faciendū, ma-
ximè qualibet exigua adhibendo, quæ
penitus profint, nihil verò lædant. Ete-
nim spectacula nō spectanda, & sermo-
nes, & edulia, & suffimēta plurima mor-
bum patefaciunt. Igitur omnia diligen-
ter consideranda sunt. Somnus multus
crassitudo est, ocium nebula sensuum,
bonum verò mediocritas. Alui excre-
tio à somno præcipuè flatuum ac pitui-
tæ res optima. Ambulationes longæ
commodæ sunt, non flexuosæ bonum

spiritum reddunt, sub arboribus myrtō,
aut lauro, aut inter acres & benè olēres
herbas calamēthum, pulegiū, thymum,
mentham, maximè quidem agrestes &
sponte nascentes: sin harum copiam nō
habeat, inter humano cultu procreatas.
Inter has quoque gestationes longæ, &
ipsæ rectæ fiant. Itinera facere bonum
est non secundum fluvium, ne de laben-
tem aquam intueatur: vertiginē enim
aquæ fluxus affert. neque vllum qui in
orbem voluatur, neque turbinē qui cir-
cum agatur, inspiciat. est enim imbecil-
lior, quàm vt firmum stabiliat spiritum.
nam simul cum circulo vertitur: circū-
uolutio autē vertiginem, & comitia-
lem morbum accersit. Post gestationem
lenis deambulatio, postea quies: vt agi-
ratio in gestatione contracta sedetur.
Ad hæc exercitationes manuum fiant
extremis sudario ex crudis linis confe-
cto inuolutis: inunctio non valde pin-
guis sit: frictio lentā quidem, sed durior
densandi causa: tumidi enim & crassi
sunt plurimi. in medio verò totius fri-
ctionis caput erectum perfricetur. Exer-

CVRAT. DIVT. LIB. I. 363

citationes ad ceruices & humeros per-
tinentes, manuum commotio: omnia
quæcunque à me de vertiginosis dicta
sunt administrètur. satis verò hic ex co-
pia ibi descripta positum est: præterquam
quod velociores horum exercitationes
esse oportet ad sudorem mouendum, ca-
loremq; excitandum: hæc enim omnia
extenuant. Verum & in omni vita opor-
tet excandescentiam iracundia vacan-
tem iniicere. Alimenta omnia ex crassis
leguminibus mala: triticei verò panes
sicciore præbendi. alica elota, & ex ea
forbitiones. sed medicamenta volupta-
tis causa eadem cum supra positis sun-
to: nunc autem plura ex acrioribus po-
nito, piper, zingiber, libysticum. Lika-
mina verò ex aceto & cumino & suauia
sunt & utilia. A carnibus quidem maxi-
mè in totum abstinèant, sin minus, in cu-
ratione saltem: in refectione verò car-
nes deligantur, quæcunque sunt natu-
ra leues: quales sunt volatilium, præ-
ter anatem, & concoctu faciles, vt le-
pores, suum pedes, falsamentum. &
post hæc sitis utilis est. Vini paulum

bibatur albitenuis odorati, quod lotiū mouet. Elixorum olerum assumantur quæcunque facultate acria, extenuant, & vrinā citant: qualis est brassica, asparagus, vrtica: crudorum autem lactuca ea parte æstatis, quam horā Græci medici nominant. Cucumeres autem & pepo viro quidem robusto superuacua, nōnullis verò gustatione tenus præbenda. mala est enim horū multitudo, cū frigida sint, atque humida. Fici viridis & maturæ vuae vsus conuenit. Ambulationes, post eas animi oblectatio molestia carens iuuat, iracundia vtique & venus noxiæ sunt. Effectus enim morbi similitudinem adducit. At nonnulli medici de concubitu falluntur. Nam quoniam naturalis in virum transitus aliquantum proficit, puerorū naturam in tempestiuo concubitu violarunt, tanquam citius eos roboraturi. sed isti à natura sponte præfinitum tempus, in quo omnia remedia sūt, ignorāt. Hæc enim singulis ætatibus propria simul opportunis tēporibus creat. in tempore namque concoctiones seminis, barbæ, cano-

rum. Quis igitur medicus naturæ commutationem seminum à principio, tum præfinitum singulis tempus variauerit. Quin & in morbi naturam impegerūt. nondum enim in tempore quidam veni-ri dare operam cœperunt, ante immaturitate rei noxam accipientes. Vitam autem degere oportet in regionibus calidis & siccis. siquidem res frigida atque humida morbus est.

CVRATIO MELANCHO-
liæ, cap. V.

NVM sanguinem detrahere expediat, deliberatione indiget in melancholicis. ex quo humore morb⁹ oritur: quin etiam ex nō pauca malorum succorum (cacochymiam Græci nominant,) multitudine. Itaque si in iuuenili ætate quis morbo corripitur, & veris tempore, vena in dextro cubito media cædenda est, vt à iecore sit opportunum effluuium, id enim viscus sanguinis fons est, & bilis generatio: vtrunque verò melancholiæ alimentum. cædenda est, inquam, licet fiat graciles & sanguinis inopis: sed

paulū sanguinis mittendū, quatenus videlicet venæ sectionē vires sentiant, sed nullam noxam earū tenor accipiat. Nā & si crassus, & biliosus, & cōcretus, & ater, qualis amurca, sanguis est, nihilominus ipse naturæ prædiū est atq; alimentum. Quocirca si plus q̄ decet, sanguinis effuderis, natura cibi penuria de propria sede prolabitur. At si sanguine refertus est æger, plerunq; quidē non vsq; adeo malus sanguis est, vena tamē utiq; secanda est. verū nō eodē die, sed aliis diebus repetendo, quantum satis est, sanguinis, detrahatur: eodem verò die modum sanguinis mittendi vires declarabunt. medio tēpore, quò aliam euacuationem sustinere valeat, liberalius nutriatur. Opus est autē & ventriculo ipsi quoq; ægrotanti & laboranti opitulari, eū verò si atra bilis vrget, per diē vnum prius tenuiter nutrito ægro nigri veratri pondo drachmæ duæ ex aqua malsa præbeantur. id enim bilem atram expurgat: necnon & thymi Attici coma & ipsa bilem atram educit. commodissimum est autem singulorum partem, vt

CVRAT. DIVT. LIB. I. 367

ex utroque duarum drachmarum pondus fiat, exhibere. post purgationem lauetur, viniq[ue] paulum bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. stomacho enim ac viribus laboriosa purgatio est. posthac iterum ad media faciendus transitus. cum prius verò cataplasmate atq[ue] irrigatione laxaueris, cucurbitulam iecori & ventriculo, aut eius ori admoveas. nāque hæc detractio multo quàm sectio venę est opportunior. tergis quęque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimētum vires instauraverit, caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. huius enim morbi inter alios prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atq[ue] initium est. commutatur igitur & ipsi, egritudinemq[ue] participant: utique nonnulli & sensibus delirantibus corruptè sentiūt. At stomacho potissimum succurrendum est: cum & ipse malè habeat, & in ipso bilis atra

resideat. Igitur absinthij succum ab exiguo incipiens ad fabæ usque magnitudinem assiduè deuorato. id enim ne bilis gignatur, impedimento est. Benefacit & aloe. nanque ipsa ad inferius intestinum bilem deducit. Nempè si recens malum sit, neque multum homo à naturali statu discesserit, alia huic medela opus non est: sed reliqua victus ratione vtendum, & ad pristinū habitum recuperandum, & ad exactam mali purgationem faciendam, & ad vim corroborandam: quæ omnia, ne iterum morbi reuertantur, efficiant. Victum autem in refectione conuenientē posteriùs exponam. Si ab his paulū debilitatus morbus denudò inualescere visus fuerit, vehementiora medicamenta requirit: neque in aliud tempus differendum est. Verū si ab coercitis mulierum mensibus, aut in viro ab suppresso hæmorrhoidum profluio morbus creatus est, irritandi sunt loci, & aliquid soliti excrementi profundendū. Si cunctatur, neque descendit in aliā quampiam partem sanguine prolapsa, morbus verò exacerbatur, euacuatio facienda

facienda est, & à talis incipiendū. Quòd si non quantum satis est, sanguinis, inde manauerit, cubiti quoque vena secetur. Interiectis autem reficiendi causa tribus, aut quatuor diebus, hieram, id est sacram, quæ purgatorium medicamentum est, potui dato. Ad hæc cucurbitam mediis corporis partibus applicato, iecori videlicet affigens. Sed maturanda negotia sunt, ac celeritas adhibenda. exiguis enim medicamentis morbus non obsequitur: si magnis autem non vincitur, sed resistit, tunc firma sede melancholia nititur. Quòd si penitus totum corpus occupauerit sensus, mentem, sanguinem, bilem, nervos etiam corripuerit, & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inserit, furoris, nervorum distentionis, resolutionisque. quæ si à melancholia proveniunt, sanatione utique accipere nequeunt. Quam ob rem ad hoc malum propulsandum veratro utendum est: sed antequàm veratrum ægrotus accipiat, stomachum ad vomendum exerceat, & humores extenuet, & corpus fluxile red

Aa

dat. Vomitiones autē hac praestant nō-
nunquam ieiuno stomacho, nonnun-
quam radice prouocati. Docebimus ve-
rō & modum, & materiam: docebimus
& veratri species, & vtendi rationem:
item quo pacto singula & distinguere,
& ordinare prius oporteat, & quo pacto
in vomitionibus subueniendum sit, in-
dicabimus. Incredibile est autem nisi ab
his funditus conuulsus est morbus, at
multorum saltem annorum interuallo
non sopiri. plerunque enim postea me-
lancholia rursus suboritur. Quod si
iam firmas radices egit, nihil iam vltra
differendum est: sed quæ ad veratrum
pertinent, omnia administrandi. Nem-
pē ægroti omnes sanari nō possunt: me-
dicus enim deorum potentiam antei-
ret. verūm dolores sedare, morbos inter-
cipere, atque obscurare, medico fas est.
Itaque nimirum his quæ posuimus, ad-
hibitis, medici defatigantur, seque aliud
quicquam facturos negant, atque duas
causas, aut morbum insanabile esse, aut
omnia se remedia tentasse prætexunt.
Nihilominus tamē sacram ex aloe me-

dicinam subinde præbere haud alienum est: siquidem opportunum melancholiæ subsidiū affert, stomacho & iecori subuenit, bilēque deiciens mirificè prodest. Quin etiam maluæ seminis pondodrachmam ex aqua propinare optimum esse quidam experientia compertum habuit. Infinita præterea sunt simplicia medicamenta: quorum aliis alia vtilia sunt. Post id genus labores demum reficiendus æger est: quibusdam enim, quandiu medicatio adhibetur, tandiu morbus permanet, quanuis labefactatus ac debilis: at si homo carnes resarciat, ac vires instauret, simul omnia morbi vestigia oblitterantur. nam potentia naturæ sanitatem, imbecillitas morbum parit. Propterea ad refectionē conuertatur agrotans in aquis sponte calidis sæpe cōmorans. medicamenta enim quæ in his sunt ingenita, opem ferunt, bitumen videlicet, aut sulphur, aut alumen, ac multo his plures alię facultates. Bona utiq; est hamectatio morbi squalorem tollens, & curationis vexationē mitigans. Raræ autem ac molles carnes

ad ægritudinis remissionem maximè faciunt: verum siccae ac densæ melancholia laborantibus carnes sunt. Inunctio pinguis cum leni frictione adhibeatur. cum multo autem oleo, hæc contineat.

Multa deficiunt.

panes loti cum vino aliquo dulci, Theræo, Cretensi, & Scybellite, quod Pamphyllum vocant: aut vinum & mel quæ iam diu permixta fuerint. oua & frigidiora & calida, putaminibus nudata: nō pingues carnes vim detergendi habentes, porcorum pedes & capitis partes: animum alæ pingui carentes: venatio, ut leporis, caprearum, damarum carnes: fructuum autumnalium quisquis optimus fuerit. Stomachi subuersioni consulendum est ante cibum, quod minus deuoratus reiiciatur. quare ante omnes cibos mulsæ cyathi dimidium dandum est, bibitumque per vomitum reddendum: quod stomachi excrementa purgentur. sic enim cibus in ventriculo firmus residet. At medicamina necessariò edu-

CVRAT. DIVT. LIB. I. 373

cendorum purgatoria sunt pini fructus,
& vrticæ: semina coccali & piperis, a-
mygdala amara: mel eis consistentiam
præbeat. Sin exiccare volueris, optimè
proficit myrrha, & iridis radix, & medi-
camentum ex viperis, & Bistini, & Mithrida-
tis antidotus, & id genus alia propè in-
finita. Exterius apponenda sunt cataplas-
mata, quorum materia est sertula, & pa-
pauer, & terebinthi lachryma, & hyssop-
um, & oleum ex rosis, aut ex œnanthe.
cera autem hæc omnia cogantur. Inun-
ctio pinguis, gestationes, deambulation-
es, & alia quotquot carnes reficiunt, &
vires instaurant, & naturam in antiquū
statum reuocant, administrentur.

Sextum & septimum caput deficiunt.

DE CVRATIONE PHTHI-
sis, seu vlcerum pulmonis,
cap. VIII.
carens principio & fine.

* quemadmodum in naui & tranquil-
litate. nam si recte habuerit ægrotans,

Aa 3

in mari gestatio fieri poterit: atque ibi vitam deget. cum vlceribus enim quidam ficcum marina falfugo communicat. à gestatione quiete concessa vtendum in praesentia pingui oleo. post frictiones oleum cum aceto infundatur, palum primò, deinde adiiciendum vsque ad heminas quinq; aut sex, aut multo plus etiam: sin minus, at saltem quantum quis ferre poterit. multoties enim vel id solum pro omni alimento satisfecit. Lac verò assumptu suaue, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca à pueritia familiaris est: praeterea visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur laeuigans, ad eiiciendam pituitam facilem spiritum reddens, inferiorem exitum lubricum efficiens, vlceribus dulce subsidium, & quolibet alio benignius. Si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. in morbo enim bonum medicamen est lac, eiusdem & alimentum efficitur. nam hominum lacte vescuntur nationes frumentum non edunt. optima verò est cum lacte & puls, & bellaria & alica lota, &

quæcunque edulia ex lacte sunt. quòd si & alia esca indigeat, eiusdem generis esto. ptisana cremor cōcoctū facilis, tenuis materiæ est. catenus verò condendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. siquid etiam saporis iucunditatem afferens capiat, & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegiū. mentha, salis exiguum, acetum, aut mel. si ventriculus non concoquit, huiusmodi exhibenda sunt. At si nihil ventriculo tale exhiberi necesse sit, omnibus ptisana præstantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare. minus enim flatuosa. & concoctū facilius est, si quæadmodū & ptisana extersa deglubitur. In humidioribus faba vlcera purgat, sed flatibus redundat. item pisum & cichrus, qui & quantò pauciores flatibus citant, tantò minus vlcera purgant. Itaque medicus coniecturis duciis, prout præsentia postulant, his uti debet. istorum quoque condimenta sunt, quotquot de ptisana memorata sunt. At oua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus nuper edita optima sunt, priusquam eam.

Reliqua huius capitis vsque ad xiiij.
caput deficiunt.

DE CVRATIONE VLCE-

rum iecoris, & puris ab eo
effusionis, cap. XIII.
carens principio & fine.

in iecore vlcus perniciosum inest. pericu-
losissimus autem est qui in ventrem fit,
saniei confluxus, si stomachum occupet,
qui viam superiora petentibus præbet.
Alimentum enim vitæ causa est: ipse
verò alimenti dux est stomachus. insu-
per medicamenta intimis corporis par-
tibus stomachus distribuit. quapropter
si ad quælibet deuoranda malè se ha-
beat, celerius agrum morbo atque fa-
me consumi necesse est. Hæ sunt cuius-
que loci, quo se pus cōuersurum est, in-
ter se differentes notæ. Nam si per inte-
stina delabitur, tormina vexant, aluus
liquida est. pituita & bilis fertur: deinde
cruentum virus circumfluens, aut humi-
ditas aquæ similis, in qua crudæ carnes
demerse lotæque fuerint. Si pus in vesti-

cam defluit, grauitas in renibus lumbis-
 q; sentitur. ac primò lotium multum &
 bile infectum, postea turbulentum, nul-
 lam subsidientiam continens, quã Græ-
 ci hypostasim dicunt, inconstansque de-
 curret: ad extremum verò & sedimen-
 album apparebit. Sin ad stomachum sur-
 sum versus pus rapitur, tunc orietur nau-
 sea, odium cibi, vomitus pituitæ, aut bi-
 lis, defectus animæ, vertigo vsque eò, do-
 nec pus erumpet. Præcipuum sanè fue-
 rit in aliã partem auertere. praua enim
 hæc via est. Quòd si pus violentius fe-
 ratur, omnia facienda sunt, st omachòq;
 succurrendum escis, medicamentis, vi-
 ctusque ratione. Sed omnia leniter ad-
 hibenda. Medicamentis quidem vt sinus
 effringatur, studendum est. herbam ita-
 que hyssopum cum mulsa potui dato, &
 marrubij comam ipsam quoque cum
 mulsa & succo absinthij. Hæc utiq;, quò
 humores extenuentur, & viæ lubricæ
 reddantur, & purulenta corpora facilè
 rumpantur, ante cibos bibere expedit.
 Dandum est & asininum lac bilem non
 generans, benè nutriendum, in caseum non

spissescens: quæ lactis virtus est. Ad hæc
ægotanti gratificandum in cibo & po-
tione: quos & si paulo deteriores iuuan-
tibus sunt, nihilominus tamen concedi-
to. nam stomachus nauseam mouenti &
cōtristanti humori transitus erit, siquidē
nonnullos puris exitus offendit. Cauen-
dum est etiam ne ieiuni sint: cumque a-
liquid cibi capiunt, illud purum synce-
rumq; sit. Opus est autem & in cæteris
effluuiis diligentissimam stomachi cu-
ram suscipere: quandoquidem ipse om-
nibus medicamentis iter præbet. Memi-
nisse quoque iecoris oportet, vbi vlce-
rum radix est. Porro si pus in vesicâ im-
petum facit, vrinam citantibus elicia-
tur: vtputa assari radice, adianto, & meo
potabilibus. hæc enim ex mulsa potui-
danda sunt. Bistini vtique varium medi-
camentum, & quod ex vesicario solano
conficitur, & quotquot experimento ali-
quibus probantur, optima sunt. Verum
enim verò si per intestina educere ma-
lis, tibi lac eductorium esto, præcipue
quidem asinæ: id non adfit, capræ, aut
ouis. Succī autem lubrici & abstergen-

CVRAT. DI VT. LIB. I. 375

te: præbeantur: qualis est ordeaceus.
Opsonia sunt piper, zingiber, lygusticum. utque semel de omni victus ratione absolvam, in qualibet puris eruptione alimenta sint boni succi, stomacho utilia, concoctionem facile admittentia: ea verò sint aut cremores, aut ex lacte pultes, & cibi ex amylo, & bellaria cum lacte.

CVRATIO LIENIS,

cap. XIII.

Scirrhi in liene geniti discussiones non facillimæ sunt. quod si & ab hoc oriundi morbi proueniât, utpote aqua intercus, aut malus habitus, insanabile malum effectum est. Hac ratione verò scirrhis medicus opem ferre debet: orientes auertere, & nuper incipientes discutere oportet: inflammationibus autem resistendum. Siquidem scirrhi inflammationibus ad distillationem tendentibus veluti hereditario iure succedunt: hæc enim inflammationis germina sunt. Porro iis remediis utendum est, quæ à me in sermone de acutis morbis

relata fuerunt. Si tibi omnia facienti in inflammatione scirrhus immaneat, igni quoque similibus ad molliendam duritiam utitor: irrigationib⁹ ex aceto, oleo, & melle. Sed lanæ vice panni lintei complicati accipiantur. Sic vnguentariæ glâdis pulvis cribratus inspergendus est: & cataplasmatibus quàm molliissimis.

ARETAEI CAP padocis medici

DE MORBORVM DIV-
turnorum curatione,
Liber I I,

Cuius prima quinque capita non
verterat Crassus.

Curatio hydropis, id est aquæ inter cu-
tem, cap. I.

Curatio diabetis, siue vrinae profluuij,
cap. II.

Curatio affectorum renum, cap. III.

Curatio vitiorum vesicae, cap. IIIL

Curatio gonorrhoeas, i. feminis proflu-
uij, cap. V.

Curatio vitiorum stomachi, cap. VI.

Curatio ventriculi affecti, cap. VII.

Curatio colicorum, cap. VIII.

Curatio dysenterias, seu difficultatis
intestinatorum, cap. IX.

Curatio laxitatis intestinatorum, cap. X.

Curatio affecti vteri, cap. XI.

Curatio morborum in articulis & co-
xendice, cap. XII.

Curatio elephantiascos, cap. XIII.

CURATIO DIABETIS,

siue profluentis vrinæ,

cap. II.

Diabetis, id est vrinæ profluuij, mor-
bus hydropis species est, quòd ad cau-
sam & habitum attinet: loco vnde hu-
mor effluit, solo differt. Nam ascitis pe-
ritonæum conceptaculum est, nec de-
fluuiū habet, sed illic permanens exun-
dat: in diabete verò idem est à patiente
lapsus humoris, eadē nque colliquatio:
in renes autem & vesicam exeundo fer-
tur effusio. aqua intercute laborantes
hac via procedunt, si à morbo conuale-
scant: ac bonū est, si causa soluatur, nec
ponderis dūtaxat leuatio fiat: his autem
maior sitis adest. humidū enim defluens
exiccat. Remedia ad colliquationē se-
dandam eadem quæ ad hydropas va-
lent: ad sitim verò medicina magna est

opus. ea enim in omnium dolorum genere maxima est. et si humidum bibat, meiendi prouocatio est: adde quod & effluens his humor secum abducit ea quæ de corpore colliquat. Opus est igitur medicamentis sitim depellentibus. sitis enim magna est, ac potus insatiabilis cupiditas. nullus enim potus quantus quantus is fuerit, siti medeatur. Omnino stomacho, unde sitis fons scaturit, succurratur necesse est. Igitur ubi hiera purgaueris, epithematis utitor, nardo, mastiche, palmulis, malis cydoniis crudis. horum quidem succus cum nardo & rosaceo ad humectandum optimus, caro verò cum mastichis & palmulis cataplasma fiat. cum cera verò & nardo vngento horum mixtio bona est, vel succi acacie & hypocistidis, tum ad humectandum, tum ad cataplasmatum fouendum. Cæterum & aqua quæ potui dabitur, cum pomis decoquatur. Alimenta sint lac, & cum eo cibaria, amyli, alicæ, sorbilla, vinum adstringens, ad stomachum roborandum: id quæ meracius sit præstat, ad euaporandos & diluendos alios humores. nam

fitim falsi pariunt: vinum verò vna & adstringens & refrigerans migratione pariter & temperatione. ad vires autem prodest etiam si vinum dulce sit vt sanguis, ad eius procreationem. Varię medicinar eadē adhibeantur, theriaca, Mithridatica, quę ex fructib⁹ mollioris corticis quos oporam Græci vocant, conficitur, & alia hydropi cōducentia: itēque vniuersa victus vitęque ratio eadē esto.

CVRATIO CALCVLORVM

& vlcera in renibus,

cap. III.

DE inflammatione & sanguinis eruptione, & quicunque à renibus affectus acutē perimūt, in libris de Morbis acutis scripsi: de exulceratione, calculorumque ortu, quę vt plurimum senibus commoriuntur, nunc potissimum scribo, ad curationem quā proximē possum accedens: sin minus ad laborātium nōnullam mitigationem. Calculorum igitur procreationem è fœcūda sterilem reddere

reddere nemo potest. facilius est enim
 vterum à pariendo prohibere, quàm cal-
 culosos renes calculis vacuare: ad exitū
 quoquo modo procurandū auxilia que-
 rendā sunt. Itaque si calculi confidant,
 remedia dicam. nam valde tum agroti
 dolent, insuper & torminibus, & voluu-
 lo coli, & vrinæ suppressione mortem
 obeunt. contigui enim sunt renes & co-
 lum. Nam si calculi insistant, insitque
 præterea lotij suppressio ac voluulus, ve-
 na malleoli quæ rectā reni respondet
 secetur. Nam sanguinis è renibus flu-
 xiones, calculorum inhaesiones cohi-
 bent. inflammatio enim colligata te-
 net omnia: phlegmones autem euacua-
 tio solutio est. lūbique humectandi, vbi
 renum locus est. adhibeatur verò veteri
 vel recenti oleo rhyte. Anethi quoque
 coma ad vrinam ciendam prodest, & li-
 banotis, aut sampsuchum: his autem ita
 aqua inspergenda est. parum enim
 inunctiones essent. cæterū & his fouen-
 dum, coriis bubulis infuso anthemidis
 oleo. Cataplasmatum sylvia cum farinis
 eadem esto. Soluit & nonnunquam cal

Bb

culos insistentes cucurbitula levis: ac optimum fuerit, si super inflammatione scarifices. Quod si etiam nū tibi hæc facienti superstites calculi maneant, in oleum homo descēdat. Id enim simul omnia confert: tepor quidē emollit, quādāq; tenus ad lentitiam adducit: acrimonia promptē mordet: quæ quidem & calculorū exitui profunt, eosque prouocant. è simplicibus pharmacis potui dāda sunt radices, phu, meum, asarum: herbe, prionites, petroseli, sium: è variis, vnguenta quæ capiunt nardū, cassiam, myrrham, cinamomum.*

* * *

clatricem obducet sinapi, & crustæ ab igni obductæ, & quæ antea dixi epithemata. Dieta verò, inunctio, nauigatio, & vita in mari acta, omnia renum affectibus remedia sunt.

CVRATIO PROFLVVII

feminiſ, cap. V.

COnorrhœa, id eſt feminiſ profluuiũ,
 quod malorũ omniũ cauſa eſt, haud
 cunctanter ſoluendum eſt, tum propter
 morbi turpitudinem, tum propter colli-
 quationis periculum, tum propter ſuc-
 ceſſurorum liberorũ procreationis ne-
 ceſſitatem. Ac primum quidem quem-
 admodum in comuniſ fluxuſ, ſanandũ eſt
 medicamētis adſtringētibus partes ve-
 ſicæ propinquas & fluentibus locis, atq;
 refrigerantibus lumbos, ilia, pudenda,
 teſticuloſ, ne diu genitura diſfluat: dein
 de ruiſus vniuerſum corpus calfacien-
 dum, vt excrementa ſiccentur. adſtrin-
 gunt igitur & macerant, & ab oue ſucci
 daſina, & vnguinoſum roſaceum vn-
 guentũ aut cœnanthinum cũ albo vino
 odorato, ſed ſecũſim calorem excitado:
 oleum commune & mel lotum cum eo
 ſervetactum, & ſarſpuchum, & libano-
 tum aut conyz: optima eſt & anethi co-
 ma, & mul o magis rhye. hiſ autem ad
 cataplaſmata vtitor, ordeĩ & erui fari-

Bb

nis & irionis seminis. Nitrum quoque.
 mel verò ad omnium conspirationē &
 cōnexionem. talia etiam sunt cataplas-
 mata quæcūque rubefaciunt, & ionthos
 seu varos cient, & fluxionem deriuant,
 & locos tepefaciunt. tale est cataplasma
 viride, & quod ex lauri fructu cōficitur.
 Castoreum quoque frequēter bibendū,
 & de radice halicaccabi quantū drach-
 ma pondo pendet, & mentæ decoctum.
 Ex variis medicamentis, quod ex pipere
 gemino conficitur, Symphonis item &
 Philonis antidotum opt mū. & quod ex
 fera quæ sit chus appellatur, ad potione
 paratur pharmacum, & Bistini antido-
 tus, & quæ ex serpentibus viperis confi-
 citur. Vniuersum autē victus rationi tri-
 buendum, concedendum & credendum
 est, exercitationibus & ambulationibus
 & gestationibus. hæc enim habitum ad
 calorem conuertunt, quo aff. cui est o-
 pus. quòd si temperans sit rerum vene-
 rearum, & frigida lauetur, spes est fo-
 re vt celerrimè homo virilem habitum
 induat.

CVRAT. DIVT. LIB. II. 389

CVRATIO STOMACHI

vitio laborantium,

cap. VI.

IN aliis morbis post curationem dicta ad vires & robur corporis, bona concoctio est: stomachi affectibus laborantibus solis hæc vitiosa est. quo nam igitur pacto hæc cōparetur, dicā. Nam gestationum, deambulationū, exercitationum, declamationū, & alimentorum concoctionem adiuuantium quod satis est, prodest quidem ad debellandū stomachi cibos fastidientis vitium: sed id concoquendi longam imbecillitatem tollere nō potest, nec maciem corporis in corpulentiam conuertere: multo verò magis proficiat, ægrotantibus si gratificetur, & puriter omnia faciat, ac cupiditatibus eorū indulgeat medicus in rebus quæ non magnopere lædunt. Est enim id optimum, nisi rerum valde iuuantium appetitu moueantur. Medicamenta potui dāda sunt, succi, absinthiū, nardinum vnguentum, theriaca, petroselini fructus, & gingiberis & piperis, & fescelios. Hæc ad concoctionem valent,

Bb 3

etiam pectori ad adstringendū imposi-
ta, nardi, mastichæ, aloæ, acaciæ, & ma-
lorum cydoneorū succus: ipsæ quoque
malorum carnes contusa cum palmu-
lis epithema est adstringēs. Quinetiam
alia quæcunque in Diabete ad sitis se-
dationē mihi cōmemorata sunt. eadem
enim & his & illis sitim prouocant: ta-
meti stomachicis stomachi cōstitutio
siticulosa minime sit.

CVRATIO COELIACO-

rum, id est ventriculo labo-
rantium, cap. VII.

SI ventriculus ciborum digerēdorum
impotens sit, diffluat autem alimentū
non coctum, non mutatum, crudum, ni-
hilque ad corporis molem transeat, co-
li cos hos appellamus, refrigerato ni-
mirum intus innato calore, quo minus
coquat, & viribus quæ distribuunt ali-
menta debilitatis. Vētricus igitur pri-
mum quiete & inedia labores remittat
oportet. ita enim eō vires recurrunt. Si
verò multitudo eorum quæ stomachus

CVRAT. DIVT. LIB. II. 390

acceperit subesse videatur, ieiunio nau-
seis ex aqua vel mulsa vtendum est. ven-
tricus autem contegendus, & vt ad-
stringatur, rigād^o lanis ab oue succidis,
ac vnguinoso rosaceo vnguēto, aut ce-
nanthino, aut melino. optimū quoque
sī & lēt scino: hypocystide etiā aut om-
phacio: cū his etiam cataplasmata adhi-
beantur, calida quidē tactu, sed viribus
adstringentia. Atque si alicubi ad ieco-
ris vel ventriculi ostentiones aut inflā-
mationes sint, cucurbitula admota in-
cidere oportet: & sint quibus id solum
sufficiat: vbi verò ceratis ad cicatricem
vlcera perducta fuerint, & ad duritiem
peruenerint, eō hirudines bestiæ admo-
uendæ: deinde epithemata concoctionē
iuuantia imponenda, quale est quod ex
seminibus conficitur, si chameleontis ra-
dicem habet, optimum est, vbi que lau-
ri fructus insint, malagma etiā quod vi-
ride appellatur, & meum quod myste-
rium, id est archanū est. Ea enim emol-
liunt & laniant, & calorem cient, visce-
rāque flatibus euacuant, quibus ad ad-
stringendū est opus. Caterum & sinapi

Bb 4

limnestis, & euphorbiū, & omnia talia
quęcunque refrigerationē amoliuntur,
calorem autē reuocāt. Talia quoque ad
adstringendū medicamenta potui dan-
da sunt. primum quidem vsui est arno-
glossi succus cū aqua myrtis aut cydo-
niis malis adstricta. optimus quoque a-
cinus vuæ omphacinæ: vina vehemen-
ter adstringentia: deinde medicamenta
quæ ventri medicantur: potiones, quot-
quot ex gingibere, & pipere, & fructu
syluestris petrofelini cōficiuntur, quod
ex viperis feris constans maximam vim
concretionis habet. Si verò his nihil, aut
parum proficiatur, vomitibus ex radi-
culis vtitor. si autem & his albi veratri
radicem per noctē vnā includas, valen-
tissima tibi fiat purgatio, tum ad hu-
mores frigidos purgandos & expellen-
dos, tum ad calorem restaurandū. Cæ-
terum & victus ratio vitæque hoc mo-
do moderate sunt. noctu somni, inter-
diu deambulationes, declamationes, ge-
statio vel in lauris, vel in myrtis, vel in
thymo. nam in perspiratione ac respira-
tione ad bene concoquendum medica-

CVRAT. DIVT. LIB. II. 393

menti vis aliqua inest . exercitationes corporis, frictiones, manus gesticulationis halteribus iaciendis, thoracis & ventriculi lassitudines, ante cibos potationes. minime enim ad vires parandas expeditus est panis: his addatur frictio ad roborem vsque, deambulationes segnæ

Capita quæ sequuntur verterat Crassus.

DE CVRATIONE MOR-

borum in articulis & coxendice,

cap. XII.

carens principio.

alborum & raphanorum plerumque: deinde ad veratrum veniendum est. in his victus ratio aliarum affectionum communis est: & post victus rationem inunctio, lauatio in frigida marina, præcipue quidem omnibus articularibus vitis communia medicamenta sunt. nam & podagricis veratrum mirifice, sed in primis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis iam annis inueteravit, vel & à maioribus per successionem descendit, ægrotum ad mortem vsque comitatur. Artuum exacerbationibus hoc sanè pa

Et subueniendum est. lanæ ex oue for-
 didæ adhibeantur: irrigationes fiant ex
 rosaceo & vino: nonnullis & spongia ex
 posita profuit. Ad hæc cataplasma fiat,
 panis sumatur cum refrigerantibus, ut
 puta cucurbita & cumere. Accipiat &
 cucurbitula tenuis, & plantago herba,
 & rosarum folia. Necnon & sideritis do-
 lorem sedat cum pane & musco: & sym-
 phyti radix, & pēta phyllos herba, quin-
 que folium Romani vocant: & marru-
 bium, quod foliis est tenuibus. huius de-
 coctum quidem infusum dolorem le-
 uat. ex ipsa verò herba cum panis micis,
 aut cum ordeï farina cataplasma fiat.
 Malorum quoque citriorum pars non
 apta cibo cum polenta magnopere sub-
 uenit: fici aridi & amygdalę cum aliqua
 farina. Hæc utique est refrigerationis
 materia. Et hoc quidem remediorū ge-
 nus aliud alium iuuat, & idem interdū
 alium atque alium. Nonnullis verò ca-
 lescentia remedio sunt: atque idem re-
 medium aliàs alij opitulatur. Peruulga-
 tum est autem & hoc ad dolorem tol-
 lendum proficere. Capram oportet her-

CVRAT. DIVT. LIB. II. 394

ba n iridē ad satietatem depasci: d in-
de interposito tempore, quantū ad pa-
bulum in ventriculo conficiendum sa-
tis sit, capram immolare: atq; intra eius
ventrem in simo pedes ægrotantis oc-
culere. Demum infinita sunt medica-
menti ægrotos nanque sibiipsis reme-
dia parare vrgens impellit calamitas.
Sed medicorum auxilia in propriis li-
bris conscribentur.

CVRATIO ELEPHAN-
tis, cap. XIII.

MOrbis, quò dissoluantur, maiora ef-
fer remedia opus est. Sed quā mē-
delæ excogitari poterit, quæ elephantē
tam ingēs malum expugnare digna sit?
neq; enim in parte vna, aut viscere vno
inhærescit, neque aut intus duntaxat
labes occulitur, aut extra prorumpit: sed
& in penetralibus totum hominem oc-
cupat, & exterius totū amplectitur. Tri-
ste profectò, & visu terribile spectacu-
lum. feræ nanque species est. ac vnà cū
his viuere, vnà cibum capere perinde

atque in pestilentia, formidolosum est: etenim per inspirationis communionē facilis infectio est. Quid igitur quispiā in arte medica inueniat, quod huiusce mali dignum remedium contineat? Verum enimverò omnia conferre simul oportet medicamenta, & victus rationē, & ferramenta, & ignem. Hæcquē si nouo & orienti affectui adhibueris, sanationis spes affulget: sin ad summū suæ creationis ascendat, in visceribusque stabilis sedeat, quando & in faciem inuadit, tunc de ægri salute spes omnino abscissa est. Itaque venas in cubito ambas incidito: incidito & venas in malleolis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fundēdo vbertim sanguini, & recreandis viribus aptior est. nam sanguinem saepe & multum mittere opere præcium est: quippe qui vitij huius alimentum sit. exigua verò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum præbeat. Idcirco quia ratione prauū inquinatūquē detrahatur, atque interim corpori familiare ac bonum procreetur, coniectandum est: quoad alimenti penuria mor-

CVR AT. DIVT. LIB. II. 397

bus prius fatigetur . noua enim esca applicata corpori spatio temporis antiqua obscurat atq; debilitat . Postea medicinam sacram non semel propinato: quin omnia sæpius iteranda sunt , & resumptio, & ad priora reditio. Esto & alia medicamentosa in cibis purgatio: sicut antea de curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam promiscuum atq; indiscretum, sed largius ad aluum molendam potui detur . verum quintam aquæ partem , quò lac totum dilabatur, atque descendat, adicito. At ieiunos primò ad vomitum celerius ducto, deinde à cibis iterum , postea assumptis raphanis. frequenter autem atque assidue omnia fiant. Veratrum quolibet tempore, sed potius vere atque autumnò diebus alternis exhibeto: atque idè in proximum annum repetatur . Cæterum si morbus inualuerit , potabilia medicamenta , quotquot quis cognouerit , potanda præcipiat. multa enim ac varia adhibere medicamenta est operæ precium. Atqui & ego quotquot mihi cognita sunt, literis mandabo. Cedriæ cyathum

vnū, brassicæ duos miscens dato. Aliud, fideritidis succi cyathus vnus, trifolij cyathus vnus, vini & mellis cyathi duo. Aliud, dentis elephanti ramentorum drachma cū vini Cretici cyathis duobus. Quinetiam viperarum reptilium, ferarum carnes & ipsæ in pastillos conformatae bibuntur. oportet autem & caput & caudam ad quatuor digitorū spatium præcidere, reliquū vsque eò elixare, donec spinæ separentur: carnes verò in pastillos redactas in vmbra frigefacere: qui potioni, quemadmodum & scylla, exhibeantur. Ipsæ quoque viperae in cœna opsolio dentur: quas coquere, & condire perinde, ac pisces, opus est. At si medicaminis illius varij ex viperis compositi facultas adsit, id pro omnibus, quandoquidem omnia simul continet, bibendum est. Præterea corpus detergendum est, tumoresque calefaciendi. Alia item medicamenta sunt innumera Celrarum: quos hac tempestate Gallos vocant. Nitrosi quoque illis factis globis, quibus velamentis sordes expurgant, saponemque vocant, illis inquam, glo-

DEPART. HOM. 398

his corpus in balneo detergere optimū
est. Et portulaca, & sedum cum aceto be-
nè facit. Rumicis etiam radicū deco-
ctum cum sulphure ignem non experto
summo opere deterget. Illud item varium
ex al-yonio trito, & nitro, & aceti facie
combusta, & alumine fillo, & sulphure
vino, & cocto, & iride, & pipere. forsitan
autem omnia pro singulorum viribus
miscēda sunt. Aliquibus verò & hoc æ-
quis portionibus compositū inspergen-
tes perfricabimus. Faciei tumoribus sar-
mentorū cinerem alicui ferarū adi-
pi admiscens illinito, leonis videlicet,
aut pantheræ, aut vrsi: in his carcas, ani-
malis, quod Græce χινάλω πικρα vocāt:
lati è vulp inferem dicas. quod genus
avis est, si per literas χ & π prima syllaba
scribitur: aut Laconicū canē significat
ex vulpe & cane natum, si per π & λ ean-
de n syllabam scripseris. simile enim in-
dissimili, quemadmodum simia homi-
ni, mirificè prodest. Item am-pniaca
gutta cum aceto, ex plantaginis, aut san-
guinalis herbæ succo. & hypoc- stis, &
lycium. Si carnes lineant, prius, quò lo-

cus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acribus fluctionibus exulceratas partes lenire volueris, fœnigræci aut ordeï cremoris decoctum molle absterforium est : item ex oleis rosaceum, aut lentiscinum . Assiduæ verò lotiones & ad corporis madefactionem, & ad noxiarum humiditatum distillationem mirè proficiunt. Esca munda esto, boni succi creatrix, concoctu facilis, simplex: & victus ratio prorsus rectè instituta sit in somno & vigilia, in ambulationibus & locis deligendis . Exercitationes adhibeantur, cursus, conuersiones corporis, peræ aut facculi iactus. omnia hæc citra lassitudinem aptè & congruenter intendantur. Esto & vocis emissio spiritus opportuna exercitatio. Vestis esto munda, non modò vt aspectu iucunda sit , sed quoniam etiam sordida cuti mordacia sunt. Ieiuni absinthite vinū potent. Oppidò quàm vilis est & panis ex ordeo, & fassamentum tempestiuū, & exiguum quid nialuarum, aut brassicæ semicoctū cum cumini liquamine, In cœna staphyliini radix apponatur, & alica cum vino &

& melle antiquo mixtis: & marina quot
quot ventrem subducunt, tellinorum
iuscula, ostrea, erinacei, & ex piscibus
saxatiles: ex terrestribus ferae lepus, aut
sus: inter aues perdices omnes, palum-
bes, columbi, & quaecunque optima in
illa regione inveniuntur. Inter fructus
arboreos illi admittantur, quos Græci
horeos vocant: quod ea parte anni ma-
turecant: quam iidem græci horā ap-
pellant. Vina dulcia vinosis meliora.
Balnea sponte calida, sulphurosa iuuāt.
vita in aquis diu ducenda est: & mare, &
nauigatio conueniunt. Præterea per ve-
raturum purgationes fiant. Album quidē
superiorem ventrem, atrum verò infe-
riorem purgat. Quin & album veratrū
non vomitum tantum molitur, sed etiā
omnium simul purgantium medicamē-
torum efficacissimum est, non multitu-
dine & varietate excrementorum: ide-
nim & affectus ille, qui cholera dicitur,
præstare solet: non distentionibus & vio-
lencia in vomendo (ad hoc enim & nau-
sea & mare validiora sunt) sed potentia
& qualitate non vitiosa. quippe quæ la-

Cc

borantibus sanitatem reddit per exiguam purgationem, & modicam intentionem: vetustorum præterea morborum omnium firmis radicibus inhærentium, si cuncta alia medicamina viribus inferiora sint, id vnicum remedium est. siquidem igni facultate per simile est album veratrum: & quod ignis exurens facit, eo plus veratrum interius discurrens operatur: videlicet facilem spirationem ex difficili, ex pallido colore floridum, & ex macie corpulentiam.

Quæ deficiunt quærito quàm prestantissimi medici Aretæi.

RUFFI EPHESII
de corporis humani
partium appellatio-
nibus libri tres,

IUNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

C c 2

QVAE IN PRIMO LIBRO
continentur.

Vnde cuiusque artis tradendæ initium
sumendum, cap. i.

Quæ prius & quomodo docere auctor
velit, cap. ii.

Diuisio corporis in maximas partes,
cap. iii.

De superioribus capitis, & faciei exte-
rioribus partibus, cap. iiii.

De oculi exterioribus partibus, cap. v.

De faciei infra oculos partibus, cap. vi.

De reliquis faciei partibus, cap. vii.

De ore, in eoque contentis, cap. viii.

De collo, eiusque partibus, cap. ix.

De ala, humero, brachio, & manu, ca. x.

De thorace & eius partibus, cap. xi.

De genitalibus marium, & eorum par-
tibus, cap. xii.

De foeminarum genitalibus, cap. xiii.

De dorsi ossibus, cap. xiiii.

De reliquis vsque ad inguina partibus,
cap. xv.

De partibus ab inguinibus vsq; ad ex-
tremos pedes, cap. xvi.

DE PART. HOM. 405

- De interiorum membrorum appellatio-
nibus, cap. xvii.
De capitis tunicis, ossibus ac futuris,
cap. xviii.
De quibusdam capitis ossibus, cap. xix.
De musculis quibusdam, & processibus
in capite, cap. xx.
De foraminibus calvariae, cap. xxi.
De cerebro, membranis, nervis, spinali-
que medulla. cap. xxii.
De oculis, cap. xxiii.
De prima & secunda colli vertebra, osse
ypsiloides, gula, tonis, aspera arteria,
guttura, & bronchiis, cap. xxiiii.
De cordis partibus, membranisque pe-
toris, cap. xxv.
De glandulosis carunculis, cap. xxvi.
De ventris inferioris partibus, ca. xxvii.
De iccore, & in eo contentis, ca. xxviii.
De liene, renibus, vesica, urinariis, semi-
nariisque vasculis, cap. xxix.
De musculis lumborum, cap. xxx.
De genitalibus foeminarum locis,
cap. xxxi.
De testium tunicis, aliisque partibus,
cap. xxxii.

Cc 3

De venis, cap. xxxiii.

De arteriis, cap. xxxiiii.

De nervis, tendonibus, cartilaginibus,
membranis, tunicis, adipe, carne, &
medulla, cap. xxxv.

De humoribus excrementisque corpo-
ris, cap. xxxvi.

De foetu, & ad eum pertinentibus,
cap. xxxvii.

R V F F I E P H E S I I

de corporis humani

P A R T I V M A P -
pellationibus

Liber I,

I V N I O P A V L O C R A S S O
Patauino interprete.

V N D E C V I V S Q V E A R T I S
tradendæ initium sumendum sit,
cap. I.



Vid in arte citharæ
pulsatoria primum
didicisti? Singulas fi
des pulsare, credo,
atque nominare.
Quid in gramma-
tica primum perce-
pisti? Vnūquodq; elementū cognoscere
ac nominare. Igitur & alias artes à no-
minibus docere incipiūt: & ferrarius fa-
ber, & alutarius cerdo, & carpētarius in

Cc 4

primis ferri nomē, & instrumētū, & aliorum omnium ad artē facientiū nomina tradunt. Quinetiam grauiores artes nōne & ipse à nominibus pari ratione docendi exordium capiunt? Quid enim primū in geometria accepisti? Punctum sanē, & lineam, & planū, & superficiem, & figuram triangulam, & circulum, aliāque id genus, quid nam sunt dignoscere, rectēque appellare. Vis ne igitur & medicinalem facultatem à nominibus exorsus perdiscere? ac primum omnium, vt singulas corporis partes appellare cōueniat, deinde & reliqua quemadmodum sermonis processus, connexiōque requireret agnoscere? Aut tibi satis esse videtur, me ceu mutū quācunque doceri postulas, tibi ostendentem explicare? Mihi verò id non melius esse, tēque ipsum hoc pacto discere, & alterū docere, haud facile esse videtur. Atque de his quidem sic mea fert opinio.

QVAE PRIUS, ET QVO-
modo docere velit, proponit,
cap. I I.

CAeterum audiens & in puerum hunc respiciens, memoriae, quae sensui patent, commendato. Ante omnia ut interiora appellanda sint, animal quodpiam homini quam simillimum dissecantes, instruere te conabimur. Nihil enim impedit, tametsi non omnia omnibus similia sint, quominus summum saltem cuiusque doceamus. Verum priscis temporibus in humanis corporibus huiusmodi generosius ostendebant.

DIVISIO CORPORIS

in maximas partes,

cap. III.

Maximae corporis partes haec sunt, caput, collum, thorax, manus, & crura. Thoracem autem non solum eam partem quae à iugulis ad praecordia usque pertinet, appellamus: verum etiam totum illud quod intra iugula pudendaque concluditur.

DE SUPERIORIBVS CA-

pitis, & faciei exterioribus partibus,
cap. IIII.

CAput vocatur quod pilis contegitur
separatim, & simul cum facie. capil-
lati autē prior pars synciput, auersa ve-
rò occiput nominatur. partes à lateri-
bus syncipitis positæ tempora dicuntur,
Græcè corsæ & crotaphi. quod autem in
medio capite est, vbi maximè capilli
inuoluuntur, verticem vocamus: partem
sub syncipite, frontem. iuxta tempora
pilorum exortus iuli Græcè, Latinè la-
nugo dicuntur. occipitis autem capilli
promissi crines vocitātur. vltimas fron-
tis rugas Græci episcenium vocant, no-
stri supratentorium dixerint: quòd ocu-
lis attrahimus, quādo nobiscum aliquid
altius cogitamus, aut veremur. alij verò
partem sub superciliis carnosam episce-
nium vocauerunt. At supercilia hirsutæ
frōtis extremitates sunt: quorum inter-
stitium mesophryon Græcè, Latinè gla-
bella, quòd glabrū sit, dicitur. sub super-
ciliis palpebræ, quas etiā genas vocant,
altera supra, altera infra sitæ sunt. ab iis
prodeūtes pili Græcè tarfi & blephari-

DE PART. HOM. 409

des, Latine cilia nominatur. harum extrema, cum nos dormimus, sese contingetia, corone & chelae hoc est, ungulae dicuntur. superior palpebrae superfici. i quod superimpedet, cauum: illi autem respondens inferius, subcauum vocant. Id sane & in aqua inter cutem, & alioqui in prauo corporis habitu, & in longinquo haemorrhoidum effluuiio, & antiqua mulierum menstrua purgatione, nonnunquam etiam inchoantibus lippitudinibus intumescere consuevit. Huiusmodi vero lippitudines mitiores esse videtur: propterea & id genus affectus, quoniam cauae partis tumor est, Graece κοιλιασις dicitur. At cauae superioris inferiorisque palpebrae extremitates a Graecis canthi, a nostris anguli nominantur: alter maior ad nasum vergens, minor alter tempori propinquus.

DE OCULI EXTERIORIBUS partibus, cap. V.

Oculi vero quod in medio aspicitur, visio & pupilla nuncupatur. glenam etiam simulacrum in pupilla apparens

vocant . Quod autem inter pupillam
atque album continuum interiacet, iris
est: sic utique, quòd colore enariet, no-
minatur : nam modò nigrum , modò
igneum , modò cesium, modò splendi-
dum id esse conspiciamus. Corona nigrū
ambit, & ab albo distinguit: quæ circu-
lus & copula oculi tunicarum est. Earū
sanè prima duabus naturis prædita duo
quoque nomina gerit: cornicularis qui-
dem in medio, & vsque ad iridem : hæc
enim eius particula expolitis cornibus
assimulatur : candida verò est altera
pars omnis, qualis & aspicitur: nihil me-
diæ neque natura, neque colore similis.
ipsi autem vocata epidermis superin-
cumbit. qua in iuuenibus & senioribus,
& in affectu , qui chemosis Græcè , vn-
guis Latinè dicitur, abscedente atq; ela-
ta , ruffum siue igneum cernitur . Aliæ
tunicæ qua sint nomenclatura præditæ,
paulo inferius in animalis dissectione
explicabitur.

DE FACIE I INFRA OCUL-
los partibus, cap. VI.

SVb oculis insurgentia ossa, subocul-
 ria, nonnulli alij hypopia nominant.
 A superciliarū medio interstitio, quod
 glabellam vocari diximus, deorsum ver-
 sus nasus protenditur. cuius foramina
 rhothones, & nares, Atticè quoq; myxæ
 appellantur. sed Hippocrates pituito-
 sum excrementum per ipsas destillans,
 myxam, Latini mucorem vocant, Athe-
 nienses verò coryzam. cartilagineum
 illud, quod foramina distinguit, nasi in-
 ferseptum est. partes ossæ, que vtrunque
 ad malas vergunt, nasi dorsum. extrema
 verò hinc atque inde huiusce ossei fasti-
 gij pinnae vocatæ sunt. istæ in vehemētio-
 ri spiritus difficultate, & alioqui cū vo-
 luerimus, agitantur. carneum autem il-
 lud ante nasi septum in labia descendēs
 columna, nasi extremitas, globulusque
 appellatur. at sub columna in superio-
 ri labro cauitas philtrum Græce vocata
 est, quasi amatorium, siue amabile di-
 xeris. sed totum sub naso superioris la-
 bij hyporrhinon Græcis est: Latino vo-
 cabulo caret. deinde labia duo, quorum
 extrema Græcè prochila, Latinè prola-

bia dici possunt. qua parte autem committuntur, prostomion vocant: inferioris labij cauitatem, nympham. Aurium foramen, per quod voces exaudimus, auditum appellarunt. partem pendulam Latini fibram, Græci lobō vocāt. quam etiam solam auris particulam nomen habere, ceteras vero nomine carere dixit Aristoteles. ceterū medici illis quoque nomina imposuere, pinnam quidem supremam partem latam atq; decliuem appellauerunt: helicem totū illud, quod deinde aurium extremā orā ambit: anthelicem id quod in medio cauitatem extollit. concham post anthelicem cauum: oppositam verò conchæ eminentiam iuxta temporis fines tragus, Latine hircum dixeris: helicis finem, qui subbreuis est, antilobida vocant.

DE RELIQUIS FACIEI
partibus, cap. VII.

TOta capitis prior pars facies dicitur. Maleq; sub oculis faciei eminentiæ sunt

DE PART. HOM. 413

ubi pudoris sedes est: maximèque ibi rubor ostenditur. post mala, autem maxillæ habentur: quarum altera superior, altera inferior est, inferiorisque maxillæ acies mentum est. sub eadem inferiore maxilla carnosæ pars leucania Græcè dicitur. sed nonnulli hanc quidem carnosam partem mentum, leucaniam verò cauum iugulo proximum appellauerunt. Barbæ prima sub temporibus germinatio iulus à Græcis, à nostris lanugo dicta est. primus eius in superiori labro exortus Græcè progonium: Latine proarbium, si fingere liceat, de eo qui pili postea adacti mystaces appellantur. sed in summo mento pili pappus, sub mento autem hypena Græcis vocibus dicuntur: Latina nomina deficiunt.

DE ORE, IN EOQUE
contentis, — cap. VIII.

Prima labiorum diuisura, & interior usque ad fauces inanitas os est. in ore

autem alia sunt, & dentes, quos nonnulli cranteras appellant. horum primores quatuor incisores, caninos autem sequētes vtrinque singulos: molares verò, & maxillares post caninos vtraque ex parte quinos, vocare consuevimus: sophronisteras, hoc est moderatores, horū intimos atque vltimos Græci vocāt: quòd eo tempore quo moderatos temperantesque esse oportet, oriri incipiunt. Ab vtraque parte vnus est, genuinos Latini appellant. totidem & superioris maxillæ, eadēque nomina sortiti sunt dentes. Maxillarum colligatio habena, mēsa summitates latæ molarium, mortariola & maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, appellantur. Gingiæ circa radices dentium carunculæ sunt. Linguae radix, vnde ipsa exoritur, nominatur. pars eius musculosa ore contenta lingua est: ceruix, quæ sequitur. parasyna autem, quæ ab vtroque lingue latere sunt, Græci nominant: hypoglossida partem lingue inferiorem, epiglossida verò, quod intimū est gutturis operculum quoddam impositū: ne cūm deuoramus,

noramus, quippiam in pulmones irruat: sed, cum spiritus ducitur, ne transeūtem aerē impediat, sublimis attollitur. Cœlum verò, & palatum concava est superioris maxillæ pars. Columna & gurgulio quidam ex palato processus, quem Aristoteles vuiferum nominavit: quoniā ea parte inflammata vuæ quiddam simile pendere videtur. Vuam enim i.ō partem, sed affectum nominari oportet. Fauces omnis ea capacitas quam inter deuorādum dilatamus, vocata est. propterea & Homerus dixit, Faucibus erupit vinūque humanāque membra. Neque enim ex arteria aspera, & pulmone cibum potūque Cyclops euomit. id enim mirum in modum rude, fatūmque fuisset. Paristhmia dicuntur, & antiades, & mala, Latine tonsillæ, carnosæ quædam glandulosæque partes vtrique à lateribus faucium positæ. Hæ numero quatuor sunt, duæ in summo gutture vtrique, reliquæ inferiorius locatæ.

DE COLLO, EIVSQUE PARTIBUS, cap. ix.

In fra caput est collum, quod & ceruicem vocant. Hypodiridis Græco vocabulo est in priori parte colli postremum: in priori item colli parte bronchus est, & aspera arteria, per quam spiritus ducitur. Bronchi summitas guttur est. At posteriore colli parte tendones sunt. iugulis proximum cauum Homerus leucaniam vocauit: sed medici anticardiō, quasi cordi oppositum, & iugulationem appellant. Quæ autem à tēdonibus ad humeros pertinent, epomidas vocant. Humerus verò brachij caput est, quod lato scapularum ossi inseritur, & cum toto etiam articulo copulatur. At humeri acetabulum est lat scapularum ossis cauitas. lata scapularum ossa à Græcis omoplatae vocata ea sunt, quæ tergo incumbunt: quorum intermediæ eminentiæ ipsorum dorsum dicitur. Acromion iuguli, scapularumque ossis copula est. Eudemus verò ossiculum perexiguum esse dixit acromiō. Claues, quæ & ligula

DE PART. HOM. 419

dicuntur sub imo collo ossa sunt cū pectoris osse commissa, humeros scapula que, ne in pectus cadant, ut aliis contingit animalibus, prohibentia. nam cetera animalia iugulis priuata sunt. quocirca & latissimi pectoris homo est.

DE ALA, HUMERO, BRACHIO, & manu,
cap. x.

ALa sub humeri articulo cavitates est, in quam sæpe humerus luxatione delabitur. Malam verò appellare haud Græci sermonis est. aliquid autē sub ala celantem ferre, sub mala habere dicunt. Humerus illud etiam à Latinis dicitur, quod exit ab humero, sed à Græcis brachium. Huius apud humerum rotunditas caput humeri est. Interior iuxta cutem excessus, quem nonnullos imperitè processum autumare dixit Hippocrates, & ipse alterum humeri caput est. post humerum totus articulus, acutumque illud, cui reclinati incumbimus, ancon à quibusdam, ab

Dd 2

aliis olecranon vocatur. Dorsus autem Siciliam incolentes, cubitum, ut nunc apud Latinos in usu est, appellat. Quin Epicharm⁹ cubito ferire *κνβιζειν*, hoc est cubitiffare, verbum è verbo transfe-
rendo, appellat. ossiū verò brachij quod subicitur cubitus, supra positum radius est. hæc ad brachiale protenduntur. post quod lata pars & compacta, palma Latine, Græcè metacarpion, tarsusque nominatur. sequuntur digiti. Manus totum illud est quod ab humero pendet, & extremum quo apprehendimus. Ex digitis magnus pollëxque est ab alijs summo-
tus: alter index inter quatuor primus. tertius medius vocatur, quartus anula-
ris, ultimus parvus. ipsorum ossa scuti-
culæ, & phalanges, & internodia. primi articuli procondyli Græco vocabulo, (Latino enim carent) medij, condyli postremi, metacondyli. vnguium in-
tia, radices vnguium vocantur. internæ digitorum summitates, acini & verti-
ces. carnofa pollicis pars sub manus ca-
uo insurgens, stethos Græcè nomina-
tur, quod apud Latinos pectus sonat. spa

DE PART. HOM. 421

tium, quod inter indicem, pollicemque intercedit, carnosumque est, sub quo manus in cauum subsidet, thenar dicunt: hypothenar verò, quod sub quatuor digitis est. sed omnem manus interiorem latitudinē thenar Hippocrates vocasse visus est: id apud Latinos vola significat.

DE THORACE, ET EIVS
partibus, cap. XI.

A Iugulis pectus in priore parte est: medium, autem, in quod costæ subeunt, sternon vocant Græci, Latini os pectoris. ab auersa colli parte ad metaphrenon vocatum vsq; tergum est. Metaphrenon inter tergum lumbosq; ubi renes adhærescunt, locatum est. Lumbi verò dorsi vltima pars sunt. carneæ in pectore eminentiæ, mammae, atque ubera vocantur. mammae extrema pars papilla: primum verò in pubescendo incrementum, faba dicitur, totum autem tumorem Græci ascoma vocant: Latine virem, sive vber dicitur. sed in mulieribus magis propriè. Latus, illud totum

Dd 3

quod sub ala est, appellatur. ossa verò, costæ: inter ipsas spatia, intercostalia nominantur. Spuriæ costæ sunt, quæ ad pectorale os non perueniunt. Sub pectore cauum, ventriculi os dicitur: quod alij procardion, quasi Latinè præcordium, nonnulli verò cor appellarunt: doloresq; ibi orientes, cordis morsus, cordisq; dolores esse dixerunt. Spuriarum costarum extremitates cartilaginee sunt. Musculose autem partes sub cartilaginibus collatae, hypochondria Græcè, ac si dicas subcartilaginei, Latinè præcordia à quibusdam vocantur. Alius ac venter deinceps locatur. Epigastrium Græcè super ventrem posita cutis appellatur. Eius media cauitas umbilicus est, venarum, per quas infans alitur, segmentum. umbilici pars media, acromphalon à Græcis vocatur: cutis umbilicum ambiens, quoniam corrugata senectutem significat, vetula appellatur. sub umbilico abdomen est, & aquiliculus. huic continua usque ad pudenda pars pecten atque pubes dicitur, alij ephebeon vocant.

DE PART. HOM. 423
DE GENITALIBVS MA
riū, & eorū partibus, cap. XII.

Genitalium porrò membrorum, quæ
in maribus sunt, propendens particu
la colis, ac stema est: quæ autem nō pen
det, sedimentum, collū, quæ vesicæ. li
neam per medium discurrentem apud
Græcos alij tramida, alij orrhon appel
larunt. colis extremitas glans est. cutis
eam tegens præputium: præputiique ex
tremum, summum præputij. cauernula
verò, per quam semen, urinæque profun
ditur, vrethra urinariūmq; iter nomina
tur. Vretera autem ne dicitur: vretes
enim alij sunt, per quos scilicet à renib⁹
in vesicam vrina delabitur. Scrotum ea
cutis est, qua gemini inuoluuntur. Ge
minos autem, aut testes appellare nihil
interest. Geminorum quod supra est, ca
put, quod infra, fundū vocatur. pars scro
ti laxior laccopedon Græcè, à quibusdā
achichadaron, ab Atheniensibus laccō
schea nominatur: inter scrotum & sedi
mentum, & femur locum plichada vo
cant. Et transire Græci *σπάλιν*, &

Dd 4

id quod est circum, amphiplex enunciant. Sophocles verò & in Draconibus hoc verbo utitur dicens, Cardinem circum comprehendentem, perinde ac si dixisset, circumplexum cardinem.

DE MULIEBRIBVS GENITALIBVS,
cap. XIII.

Muliebris autem pudendi quod supra est, pecten dicimus. id triangulum est, & imi ventris terminus. ab aliis epifion appellatur. pudendi rima schisma à Græcis dicitur, scissuram Latine interpretamur. masculosa in medio caruncula nymphea & myrton, ab aliquibus hypodermis, ab aliis clitoris nominatur: lasciuéque eam tractare κλιτοξίαν dicunt. Myrtochilas verò utrinque posita carnosae corpora. ceterum hæc Euripho & cremnos, id est rupes vocat. Sed nostræ ætatis medici myrtochilas pterigomata (quasi alas dixeris) appellant, myrton verò nympheam.

DE DORSI OSSIBVS,
cap. XIII.

DE PART. HOM. 425

Dorsi ossa vertebræ sunt, quas etiam
Homerus astragalos, id est, talos vo-
cat. tota autem vertebrarum compago
spinam constituit. Extremum lumborum
os sacrum est: id ab aliquibus etiam hy-
pospondylon, quod subvertebrum La-
tinè verteris, dicitur. Eius vltimum os-
ficulum coccyx, id est cuculus est.

DE RELIQUIS VSQVE AD
inguina partibus, cap. xv.

Sub costis molles partes à Græcis la-
paræ & ceneones, à Latinis Ilia vocā-
tur. Deinde ilium ossa, quorum excava-
ta capita heminae & acetabula. Clunes
autem ac sedilia post lumbos carnosæ
partes: quoniam illis sedendo nitimur,
ab aliis nates dictæ sunt. Sub quib⁹ hypo-
glutides id est subnatales vocatæ iacēt.

DE PARTIBVS AB INGV-
nibus vsque ad extremos pedes,
cap. xvi.

Inguina fœmorum priores partes sunt
prope pubem posita. neruus autem ad

acetabulum pertinēs, ac totus articulus
coxendix dicitur. Fœmerū internæ par-
tes parameria Græcis, fœmina Latinis
sunt. Inter fœmina autem loca, mesome-
ria Græce, interfœminia Latinè dicitur.
Musculi genibus inhærentes epiguni-
des, quasi geniculares dixeris, vocantur.
ossi autem super genu posito epigona-
tis Græca appellatio, Latina, patella est:
Hippocrates verò epimylida vocauit.
Genu articulus est fœmur cruri cōmit-
tens. Poples posterior pars est, in quam
genu inflectimus. Gastrocnemia Græco
nomine magnus musculus est, Latinè
sura: vnde latus nervus oriēs ad calcem
tendo factus adhærescit. Ossiū verò cru-
ris quod posterius est, sura quoq; dici po-
test prius autem, tibia. Sed Herophilus
suram radium etiam appellauit. vtrius-
que ossis extrema pedi inserta malleoli
sunt. Tali verò non recte vocantur. si-
quidem & humanus pes talum sub mal-
leolo abditum, non conspicuum habet.
Calx postremum pedis rotundum est.
Planta & tarsus pars prior & ampla est.
Stethos verò id est Latinè pectus, pars

DE PART. HOM. 427

inferior post cauum, vnde nascunt. r di-
git, vocatur. istos autem perinde, vt ma-
nus digitos, appellare, aliaque manuum
digitis communia recensere, nihil est
quod impediat.

DE INTERIORVM MEM-
brorũ appellationibus, cap. xvii.

Igitur quæ oculis aperta sunt, ô fili,
subiectaq; his ossa in hunc modum no-
minare decens est. Modò interiora cor-
poris membra simiam dissecantes pro-
priis nominibus illustrare tentabimus.
quandoquidem ipsa ossibus, musculis,
extis, arteriis, venis, neruis ad naturã ho-
minis proximè accedit: secundo alia mul-
tifida: tertio ex bisulcis vtrunque denta-
ta. Non vtrunque dentata, ac solidipe-
da longissima ab hominis similitudine
sumnota sunt. Quod si aliquid de mē-
bris interioribus exteriora tradentes
memorauimus, idem bis repetere vlti-
rius opus non fuerit.

DE CAPITIS TVNICIS, OS-
sibus, ac futuris, cap. xviii.

A Spice itaque sub caluarię cute tunicam. hanc pericranion, quod cranium, hoc est caluariam obuoluat, Græci vocant. Quam verò alia ossa ambiētem tunicam videris, hanc perioftion, Latinè circumossalem verbum verbo reddens appellato. qua ossa caluarię cōmittuntur, futuræ sunt: quæ duarum ferarum compagem imitantur. Earum vna quidem rotunda est, synciputque circuncidit: altera occiput: tertia medium verticem diducit, quibusdā etiam hæc syncipitis futuram transiens, frontemq; ipsam secans, inter supercilia terminatur. binæ aliæ in temporum ossibus in squammarum modum totis oris paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. ipsis quidem vetusta nomina defunt, sed nuper à quibusdam Aegyptiis medicis Græcam linguam male doctis imposita sunt. syncipitis futuram coronariam, occipitis lambdoide, id est λῆβδα Græcę literę similē, mediani verò coniungentem appellantibus. temporaneas etiam futuras lepidoides à squammarum

DE PART. HOM. 429

similitudine vocauerunt. idem & aliorum ossium partibus ab antiquis innominatis nomina indidere: quæ ego, ut aliis nostri seculi medicis innotescant, non prætermittenda iudicaui.

DE QVIBVSDAM CAPITIS
ossibus, cap. xix.

I Nter caluariae ossa meditullium diploen nominat. vbi verò nasi initium est, crebra ibi foramina ithmoide, hoc est cribri speciem referentia, vocantur. per ea indubiè sternutamentum, mucusque propellitur. Nonnulli & hac parte nos in cerebrum spiritum attrahere confirmant. Proxima auribus ossa ob firmitudinem lapidea nomen habent. ab utroque enim latere singula ossa dura, subalbidaque sunt, magnitudine caput maximi manus digiti æquantia, per quæ auditoria itinera seruantur. Alij procliues occipitij processus lapideos appellant, idque non rectè. inanes enim, & cauernosi, & minimè solidi nomini non respondent. Ab auditoriis autem mea-

tibus ad malas pertinentes processus iugalia ossa nuncupantur.

DE MUSCULIS QVIBVS-
dam, & processibus in ca-
pite, cap. xx.

Musculos caua temporum replentes, temporaneos: qui inferiorem maxillam amplectuntur, maneres vocât. Tenuis illi, & oblongi, deorsumque versus fauces vergentes processus, stiloides à columnæ similitudine dicti sunt. Eundem autem ipsos gallorum rostris assimulat, ac sine appellatione relinquit.

DE FORAMINIBVS CAL-
uariæ, cap. xxi.

Foramina permulta caluariam excavant: quæ omnia duobus exceptis, quæ cœca appellantur, nomine vacant. inter se autem medici altercantur, vtra nam hoc nomine appellanda sint: num illa quæ propè maximum caluariæ foramen adiacet, per quod spinæ medulla in ver-

tebras delabatur: an illa quæ propè auditorias cauernas, & paulò prius iuxta maxillæ articulos sunt. Sed neque illa, neque hæc adeo cæca sunt, quin ea in magnum spinalis medullæ cauum peruadant, hæc sub foramina cribrum representantia subeant. ac per ipsa omnia nerui transire conspiciuntur, de quibus in diuisionibus sermo habebitur. verum ideo ipsi cæca dixisse visi sunt, quòd nò in rectum excauata esse cernantur.

DE CEREBRO, MEMBRANIS, neruis, spinalique medulla, cap. xxii.

INtra caluariam cerebrum continetur. id membranæ circunvolunt, altera crassior robustiorque ossi proxima: tenuior altera, & firma quidem, sed priore minus, quæ cerebrum contingit. Summa cerebri pars varicosa appellatur: inferior atque posterior basis: à basi oriens processus parencephalis Græcè, Latine cerebellum. Ipsius a uernæ cerebri ventriculi: ventriculos

interius obuolvens tunica choroides, hoc e. secundis similis, cognominatur. Herophilus autem & membranam choroides, id est secundis similem, appellat, Germina à cerebro enascentia nervi sensorij electorijque sunt: per quos sensus, & voluntaria motio fit, omnisq; corporis actio perficitur. horum autem nervorum quidam à spinali medulla, & ex ipsam cingente membrana expullulāt. Dorsalem verò, spinalēque omnem pariter per vertebrae defluentem medullam nominant.

DE OCVLIS, cap. xxiii.

Culi tunicarum primam inter extrema, conspicuāque membra cornicularem superius nominavimus, secunda rhagoides atque choroides Græcis vocabulis dicitur. qua parte corniculi subiicitur: rhagoides, quòd exterius lætore, interius aspritudine vix acido, quē Græci rhaga dicūt, sit persimilis. qua verò albā tunicā subit, choroides vocatur:

DE PART. HOM. 433

tur: quoniam venulis referta secundas
quas vocant, foetui circumdatas repre-
sentat. Deinde tertia humorem à vitri
similitudine hyaloidea vocatum conti-
net. hæc antiquo vocabulo propter te-
nuitatem arachnoides appellata est: La-
tinè aranealem dicere auserim. at quoniã
Herophilus eam reti contracto assimu-
lat, nonnulli & reticularem: alij ab inclu-
so humore, qui vitri gerit similitudinẽ,
hyaloidea nominarunt. Quarta mem-
branula guttam quandam humoris cry-
stalloidea nominatam includit. hæc an-
tiquitus nomine caruit, à posteris lenti-
cularis ob figuram, crystalloides ab con-
tento humore cognominata est.

DE PRIMA ET SECVN-

da colli vertebra, osse ypsiloide, gu-
la, tonis, aspera arteria, guttu-
re, & bronchiis,
cap. XXIII.

PRImam colli vertebra dentem ap-
pellare mihi videtur Hippocrates. Sub
tonillis osiculum gutturis caput con-
Ee

tinēs quidam à figura ypsiloides appellauerunt, quod Ypsilo græco elemento sit per simile. Cæterum Herophil⁹, quoniam tonsillis assideat, assessorem vocat. Secundæ vertebre processus sursum, ac prorsum versus spectans, pyrinoides ab olivæ nuclei similitudine dictus est. Iter illud, per quod cibi potionésque in ventriculum descendunt, Græcè stomachus, & œsophagus, Latinè gula est. Nervi ab utroque eius latere, toni, cæteraque sensoria, atque fibrosa pariter toni dicuntur, tenores in Latinum vertere liceat. asperæ arteriæ summum guttur est. anuli ad eius plexum creati, bronchia, cauernæ, & aortæ nominantur.

DE CORDIS PARTIBVS,

membranisque pectoris,

cap. xxv.

Caloris vitæ, arteriarumque motus initium cor est. eius summa pars caput dicitur, infima & acuta fundum. cavitates ventriculi, crassior & læuis arteriosus est, tenuior & dexter venosus,

DE PART. HOM. 435

læuo capaciôr. ab utroque autem capi-
tis latere ceu alæ prominentes, cavæ.
molles, & ad totius cordis motum agi-
tabiles, cordis auriculæ sunt. Cor cir-
cumplexæ membranæ pericardios no-
men inditum est. Ex membranis pecto-
ris quæ ipsam in duas diducunt partes,
intersepientes appellantur: quæ costas
interius vestiunt, succingentes. Mem-
brana, quæ pectoris viscera ab inferio-
ribus disiungit, transversum septum, &
phrenes.

DE GLANDVLOSIS CA-
runculis, cap. xxvi.

EX glandulosarum carniû genere,
quæ adenæ Græci vocant, (mul-
tæ autem sunt,) aliquæ in collo, non-
nullæ sub alis, quædam in inguinibus,
aliæ in mesaræo vocato reperiuntur.
Carnes quædam leniter subpingues ac
fragiles sunt. inter has & vocatus thy-
mus numeratur: qui in regione capitis
cordis locat⁹ est, septimæ colli vertebræ
infidēs, asperæq; arteriæ extremo, quæ cū

Ee 2

pulmone committitur, adhærescens. non
in omnibus tamen inuentus est.

DE VENTRIS INFERIO-
ris partibus, cap. XXVII.

Sub transuerso septo venter est: cuius
summa pars, primæque ventriculi no-
men habet. deinde primus intestini ex-
ortus hostiarius Latinè, seu ianitor, Græ-
cè pyloros est. postea ieinum intestinū
semper alimento priuatū: vnde ipsi quo-
que vocabulum fuit. isti continuum gra-
cile intestinum est. Ex gracili biceps pro-
dit exortus. vocatur autem altera eius
pars cæcum intestinum, quoniam reue-
ra cæcum est: altera colon Græcè, & vē-
ter inferior, & laxum intestinum à Latī-
nis. id Homerus & niēram appellat. Est
autem totum intestinorum vinculum ac
firmamentum, quod mesenterio, ac me-
saræon Græci vocant. Aræam verò & vē-
trem, & omne intestinum vetustissimi
Græci appellabant, ex quo adhæc vsque
tempora hoc nomen mesaræon deriua-
tum est, Latini lactes appellasse viden-

tur. Post grande intestinum colon appellatum rectum est iuxta sedem ac principem. Quod ex orbiculato ventriculi fundo egerminat, ipsumque & aliquam cæterorum intestinorum partem velat, epiploon Græci, quasi supernauigans, omētum Latini vocant. A renibus exoriens membrana, omnibusque prætenta intestinis peritonæos est. At propè intestini primum exortum posita caro præpinguis, glandulisque interstincta, pancreas vocata est.

DE IECORE, ET IN EO

contentis, cap. XXVIII.

A Dextra ventriculi iecur est. Iecoris autem pars transuersum septum, peritonæumque attingens conuexa, quæ infra ventriculo inhaerescit, caua dicitur. Sub maxima eius fibræ bilis vasculum situm est, cuius media & angusta particula ceruix est, infima fundum. iecoris porta vena est, per quam alimentum illabatur. Quæ in sacrificiis autem aruspices portas, mensam, gladium, & vnguem appell-

Ec 3

lant, in homine quoque, sed obscura
atque incerta reperiuntur, ad nullum-
que medicinæ profectum necessario no-
minantur.

DE LIENE, RENIBVS, VE-
fica, vrinariis, seminariisque vascu-
lis, cap. xxix.

Ventriculo à sinistra lienis incumbit,
cuius crassissima summaque pars ca-
put est. propè vltimas autem costas re-
nes duo: ex quibus duo vrinæ ductus
vretes Græcè appellati vesicam intrā-
tes prodeunt, Vesica verò conceptacu-
lum est, in quod vrina è renibus per vre-
teres delabitur: à vesica est ceruix, sedi-
mentum, traxis, & reliqua commemo-
rata superius. At seminaia vascula qua-
tuor sunt, duo varicosa, duo glādulosa:
quæ genitales etiam venæ vocatæ sunt.
varicosorū partes illæ quæ testibus ad-
iacent, assellores dicuntur. Quidam ve-
rò omnia assellores appellari nihil la-
borant. Caterum an hæc eadem in fœmi-
nis perinde vt in marib⁹, cōstituta sunt,

DE PART. HOM. 439

contemplandum est. Fœminas varicosis
 asessoribus carere Herophilus planè
 existimat: nos verò in pecudis vtero è
 testibus enata vascula, atque vtrinque
 varicis instar reuoluta conspeximus. hæc
 autem in vteri cauum perforata subi-
 bant: è quibus mucosus quidam humor,
 siquis exprimeret, emanabat, magnaque
 erat spes hos seminarios esse canales, &
 eorum generis qui varicosi nuncupan-
 tur. id autem vt se habeat, dissecciones
 seorsum declarabunt.

DE MUSCULIS LUMBO-

rum, cap. xxx.

INtra lumbos musculi psoæ Græco vo-
 cabulo nominantur: qui soli etiam in
 dorso lumbis agnati sunt. Istos aliqui
 vterales nervos, alij vulpes cognomi-
 nant, atq; in libro Cnidiarum senten-
 tiarū nomen istud scriptum est. Si renū
 autem morbus vexat, notæ hæc sunt, si lo-
 tium crassum purulentūque sit, si do-
 lor lumbos, ilia, inguina sumenque tor-
 queat, tū verò & vulpes male habet. Vn-
 de iam constat, quanti ista scire intersit:

Ec 4

quò ea quæ sic cognominatur, agnoscas. Clitharchus exteriores dorsi musculos psoas, vterales nervos, ac vulpes appellari falso opinatur.

DE GENITALIBVS FOE-
minarum locis, cap. XXXI.

Genitale autem mulieris membrum Græcè metra & hystera, Latine vter⁹ vuluâque vocatur. Hippocrates & delphyn & geniturâ dicit. Eius sursum versus vtrinque processus cornua & cirri sunt ipsam exterius sustinentia vasa. medium atque supremum fundum est. que virinque sunt, humeri: eius extremitas ceruix, atque collû. colli hostium primus meatus; Hippocrates Græcè amphidion à rotundi ferri, quò præfiguntur aratra, similitudine vocat. deinde canum, quod sequitur, multis appellationibus exprimitur. muliebris enim sinus dicitur, muliebres loci, vterus, ac vulua. Sed totum genitale cum exterioribus pudendum, obscœniorique vocabulo cunnus.

DE PART. HOM. 441
DE TESTIVM TVNICIS,
aliisque partibus,
cap. XXXII.

AT circa testes tunicae sunt Latinis ca-
rentes nominibus à Græcis autē ery-
throides vna, artos altera nominatur.
neruus quoque cum arteria concauus
ad testem pertuenit, qui suspensor à no-
stris dici potest: cremastera Græci nun-
cupant. venulae pariter ad testes, vnde nu-
triantur: hæque testium altrices nomi-
nantur.

DE VENIS,
cap. XXXIII.

ALiarum quoque venarum nomina, (vt
semel dicam,) hæc sunt. si gracile tu-
nicam habent, sanguineque cōplentur,
venae sunt. omnes verò magnae venae vē-
tres appellantur. postea inter medicos
vsus obtinuit, vt ea vena quae à iecore
in renes propagines mittit, caua diceretur.
in ea Praxagoras initium esse febriliū
affirmauit: solamque eam cauam ipse

dominauit. Ceterum alij & eam quæ sursum in cor per transuersum discrimen euadit, alij & hanc, & priorem vnico vocabulo hepatitin, (Latini è iecorariam dixeris,) vocitant. à liene exeuntem splenitin, id est lienariam. Ceterum non quemadmodum in iecore, ita & in liene sursum versus, deorsumque in sinistra parte discurrens vlla vena reperitur. qui verò id asserunt, impudenter mentiuntur: quandoquidem venulae in liene pertinentes & graciles sunt, & ibidem in liene finiuntur. Philistio Italus medicus pro Doriensium eam partem incolentiam more, quasdam venas quæ per tempora in caput ascendunt, aquilas vocat: venas à corde illico nascentes, dracontida Hippocrates nominat. Herophilus venam crassissimam grandissimamque ex corde pulmones petentem arterialem appellauit. in pulmonibus enim contra atque in aliis rebus habet. nam veræ in his validæ sunt, proximæque ad arteriarum naturam accedunt: arteriæ contra imbecillæ, venarumque naturam sapiunt. Omnium autem quos nouerim,

DE PART. HOM. 443

primus Dionysius Oxymachi efflorescē-
tiam, Græcè epanthismon nomen no-
uum adinuenit. atq; Eudemus efflore-
scētiam venam appellari. Sed mihi qui-
dem Dionysius rem venæ similem efflo-
rescentiam, neque idem venam atque ef-
florescentiam, sed quoddam aliud ad-
uentitium sanguinis receptaculum vo-
care visus est: idque ipse ita esse testatus
est, eodem loco sæpius venam, efflore-
scentiam, arteriāque inculans, ac re-
petens. neque enim, si rem eandem ve-
nam efflorescentiamque putaret, ita un-
quam locutus esset. nam etsi nihil aliud
efflorescentia, quàm vena est, nihilomi-
nus ipse aliter sensit, atque appellauit.

DE ARTERIIS,
cap. XXXIII.

ARteriis præterea vetustissimi Græci
venæ nomen imposuerunt: cumque
venas micare dicebant, arterias intelli-
gebant. arteriarum enim micare, seu pal-
pitare munus est. Eas etiam aortas, &
spirabilia vasa, & cauernas, & inanitates

& nervos appellarunt. Aortam verò eam præcipue Aristoteles vocat, quæ per dorsum omnium maxima fertur. hanc crassam Praxagoras appellare consuevit. Canas autem per collum subeuntes carotidas, id est somniferas antiqui nominarunt: quoniam compressæ hominem sopore grauabant, vocemque adimebant. Caterùm nostro sæculo nō arteriarum, sed nervorum sensoriorum propè iacentiū id vitium esse compertum est. quare si nomen permutare volueris, nihil peccati admiseris.

DE NERVIS TENDONIBUS, cartilaginibus, membranis, tunicis, adipe, carne, atque medulla,
cap. XXXV.

Nervi à cerebro, spinæq; medulla prodeuntes actiui, sensorij, electiui, atque toni: qui circa artus sunt, copulatiui dicuntur: crassæ autem ex occipitio propagines, quæque ad calcem è musculo nascentes feruntur, tendonis vocabulū habent. Cartilagines sunt, in quas ossa de-

generant, neruis duriores. Membranæ tenuia sunt velamenta: tunica, crassiora. Adeps, pinguiſſima eſt alimenti concretio. Caro autem in viſceribus illud eſt, quod inter vaſcula concretum reperitur, ſubtegmen quoddam, ac veluti receptaculorum textura factum: quò inania eius ſpatia compleantur. In muſculis caro pars fibroſa ac firma eſt, & quæ in vlceribus, oſſiumque cauis recens cõcreſcit. Medulla verò in dorſo dorſalis, in vertebris ſpinalis, hæc etiam ambiens membranula ſpinalis dicitur. Medulla intra caluam contenta cerebrum eſt: ſed in aliis oſſibus oſſalis vocatur: ſiue in magnis inſit cauis, vt in femore atq; humero, ſiue in anguſtis foraminibus, quas ſerangas, id eſt cauernas, vocant, vt in coſtis ac iugulis.

DE HUMORIBVS, EXCREMENTISQUE CORPORIS,
cap. xxxvi.

Sanguis calidiſſimus eſt, ſlauriſſimusq; ſuccus. Pituita album craſſum, ac ſub-

falsum excrementum est: quod cum re-
siccatur, nigrescit. Bilis flaua amarū est,
ac fluum excrementum: porra ea acris
est, atque subuiriilis: æruginosa verò est
valde mera, atque syncera. Atra bilis au-
tem sanguinis crassamentum est. Alij
nigrum sanguinem atram esse bilem as-
seuerant, & reliqua excrementa huiusmo-
di sunt: saliuā quidem oris est humidi-
tas. Mucus falsum est cerebri purgamen-
tum. Sudor est per omne corpus effusa
humiditas. Vrīna est nitrosus humor in
vesicā delabens. Flatus est in intesti-
nis superuacuus spiritus. Cypselis sunt
aurium sordes, quas cerumina, aut mar-
morata veteres Latini appellitabāt. Mē-
ses in mulieribus sunt menstrua per vul-
uā sanguinis excrementa: quæ cum alba
sunt, non menses ultra, sed profluuiū no-
minatur. Lac est in mammis alimentī cō-
coctio. Semē, Græcè sperma, thora, & go-
nos, hoc est genitura idem significant.
id verò est spiritus simul, atque alimentī
genitalis in assessoribus concoctio. Pra-
xagoras peculiari quodam modo suc-
cos nominauit, dulcem, temperatum, &

DE PART. HOM. 447

vitreum, hos à pituitę specie sic vocauit:
item acidum, nitrosum, salsum, & ama-
rum. hos ita, vt gustatus iudicat, appellauit.
alios præterea porraceum quidem
ex colore, vitellinum, verò ex crassitu-
dine: alios quoque abrasorios, quoniam
abrasurā parant: alios stagnantes, quòd
in venis inhæreant, neque in carnem fu-
beant, quia tennes, intra venasque ab-
sorpti quiescunt. in summi, omne liqui-
dum Praxagoras chymon appellat. At
Mnesitheus quod liquidum est, chylon,
id est succum nominat: sed gustatilem
qualitatem, siue in arido, siue in liqui-
do positam, chymon, id est saporem vo-
cat. Calorem autem, atque spiritum Ze-
no idem esse censuit. Sed medici distin-
xerunt, spiritum, quem spirando trahi-
mus, calorem autem spiritus elisionem
appellantes. Alij vitę quoddam princi-
pium calorem esse dixerunt.

DE FOETV, ET AD EVM
pertinentibus, cap. XXXVII.

FOetus mēbranis inuoluitur: quarum
tenuem ac molliorem amnion vocat
Empedocles, agniūā Latinè dicito. Inde
& ilithya, quæ partui præest, amnias mi-
hi agnominari visa est: non à Cretæ, vt
alij expstulant, quodam portu. Nos hāc
tunicam dissecantes, humoris cuiusdam
longè illo qui in secundis continetur,
mundioris plenā inuenimus. accurateq;
astimātibus veluti quidā foetus sudor vi-
debatur. per vrinaculum verò humorem
quendā in secūdas instar vrinae trāsfun-
di cognouimus. Sed amnion interior foe-
tui, secundæ exterius vuluæ brevis atque
venosa tunica adhærebant. è secundis
vmbilicus oritur ex duabus venis toti-
dēmq; arteriis compositus, & ex quin-
to appellato vrinaculo, breui vasculo,
vtrinque cano, è vesicæ fundo in secun-
das intrante.

Plurima in homine reperta huiusmo-
di appellationibus insignire oportet.
quòd siquid in his omissum fuerit, non
ideo tamen plurima ob pauca quadā
coniuuentibus oculis præterita asperna-
ri conueniet.


Quæ in altero libro primo
continentur.

- Quæ sit libri necessitas, cap. i.
 Quæ sint maxime corporis partes, ca. ii.
 De capite eiusque partibus vsque ad na-
 sum, cap. iii.
 De naso & aliis faciei partibus vsque ad
 labia, cap. iiii.
 De oculorum partibus, cap. v.
 De malis, maxillis, & mento, cap. vi.
 De aurium partibus, cap. vii.
 De ore, & in eo contentis, cap. viii.
 De collo, & eius partibus, cap. ix.
 De epomide, humero, scapulis, alis, & re-
 liquis vsq; ex extremam manum,
 cap. x.
 De pectoris ac dorsi partibus, cap. xi.
 De ventris, seu alui partibus, cap. xii.
 De virilis membri partibus, cap. xiii.
 De foeminarum locis, cap. xiiii.
 De dorsi ossibus, extremisque eius par-
 tibus, cap. xv.
 De inguinibus, crurisque totius vsq; ad
 extremum pedem partibus, cap. xvi.

Ff

R V F F I EPHESII

de corporis humani

PARTIVM APPELLATIO-
nibus, alter liber I,Iunio Paulo Crasso Patauino
interprete.QVAE SIT LIBRI NE-
cessitas, cap. I.

Iquis fidibus canendi
artem doceri cupiat,
ante omnia fides peri-
tè tractare, singulasq;
propriis nominib⁹ ap-
pellare discat, necesse
est. Grammatistæ an-
te legendi, ceteraq; doctrinę scientiam,
elementorum nomina pueros prædo-
cent. necnō in geometria, quid lineasit,
quid superficies, quid planum, quid figu-
ra triangula, quid circulus, id genusque
alia, quoque ritè nomine appellentur,

DE PART. HOM. 458

prædiscere opus est: in aliis itidem arti-
bus prænotiones vocabulorum similiter
edocent. Medicam itaque artem cape-
scere optantibus elementa prius trade-
re perquam necessarium esse duxi: ut
quæq; videlicet corporis pars rectè no-
minanda sit. quandoquidem diuinissi-
mus Hippocrates in libro qui inscribi-
bitur de Locis in homine, ita loquitur:
Corporis autè natura sermonis in me-
dicina principium est. Nos igitur etiam
à simpliciorib⁹ exteriusq; aspectui subie-
ctis exorssi, eorum prænotationem appel-
lationesq; trademus.

QVAE SVNT MAXIMAE
corporis partes, cap. II.

Maximæ corporis partes, caput, col-
lum, thorax, manus, crurâque
sunt. Thoracem non solum à iugulis ad
ræcordia vsque, sed totum à iugulis vs-
que ad genitalia vocamus.

Ff 2

DE CAPITATE EIVS QVE

partibus, vsque ad nasum,

cap. III.

Caput, quod capillis instructū est, simul etiam cum facie & alia sic appellantes comprehendimus. prior capillata pars synciput dicitur: in quo & sutura est, quoniam ipsi coronas circumponimus, corona vocata, posterior occiput. partes ab utraque syncipitis parte tempora. pars media qua maximè conuoluuntur capilli, vertex. sub syncipite frons sita est. in temporibus pilorum exortus iuli Græco vocabulo, Latinè lanugo: posteriores occipitis pili à Græcis chatae, à nostris crines dici possunt. ultimam frontis rugā episcenion Græci dicunt, quod supertentorium nostris sonat: partes frontis pilis hirtæ supercilia sunt. horum media intercapedo mesophryon apud Græcos est, Romanis glabella. inde nasus porrigitur.

DE NASO ET ALIIS FACI-
ciei partibus vsque ad labia,
cap. IIII.

Nasi extremum globul^o dicitur. quod
nasum in duas cauernulas distiguit.
interseptum à globulo carnosum quod-
dam in labium descendens, columna est.
nasi caua ab utroque intersepti latere,
per quæ olfactus præstatur, nares vocan-
tur. nasi alæ, seu pinnae huiusmodi caua
ambientes sunt. sub columna subsidens
cauitas supra labium philtron Græcè,
Latinè amatorium dicitur. totum verò
quod infra nasum supra labia est, hypor-
rhinō appellant. deinde labia duo, quo-
rum summa prochila Græci dicunt: tu
prolabia, si lubet, dicito. quâ committun-
tur autem prostomion est.

DE OCULORVM PAR-
tibus, cap. V.

Super ciliis oculi sunt. quæ oculos
contegunt, palpebræ sunt. harum alte-
ra supra, altera infra est: quarum in con-

Ff 3

niendo congressus tarfos vocant. pili ex palpebris enati, cilia sunt. Tarforum extrema, anguli, magnus naso, exiguus temporis finitimus. Coræ pupillæ sunt: glenæ oculorum media, per quæ videmus. Alij pupillam id vocant, quo videmus, coram autem & glenam simulacrum in pupilla conspicuum. post hæc autem quæ sunt nigra, cæcia, aut splendida, à colore nominantur iris: circulus est prædicta albo continuans. Sub oculis loca hypopia Græcè, Latine subocularia sunt.

DE MALIS, MAXILLIS, ET
mento, cap. VI.

His insurgentes eminentiæ subiacent malæ vocatæ: quæ per pudorem erubescunt. sub his maxillæ, seu mandibulæ. quarum inferioris extremum in acutum definit, mentumque est: à quo usque ad inferius labium os fit rotundum, atque prominens. sub mento carnosæ pars à Græcis anthercon, seu leucania dicitur. verum alij anthercona hanc

partem; leucaniam verò cavitatē iuxta iugulum appellant.

DE AVRIVM PARTIBVS,
cap. VII.

AVriculæ eminentiæ sunt ab utroque tempore iuxta extrema collocatæ. quarum cavernulæ meatus auditorij vocantur: per quos audimus scilicet: harum inferiores carnosæque partes fibræ sunt, superiores cartilaginosaque pinnæ. Helices, quæ deinde circumferentiam ambiunt: anthelices verò in medio post helicem extumescences prope cavitatem particulæ. cavitās ipsa concha dicitur: conchæ opposita prope temporis finem elatio tragus, id est hircus vocatur: huic opposita ex crassiore anthelice antitragus.

DE ORE, ET IN EO CONTENTIS,
cap. VIII.

OS est prima labiorum divisura, & reliqua omnis vsq; ad fauces inanitas.

Ff 4

in ore & alia quædam , & dentes sunt: quorum priores octo incisores dicuntur: canini hos sequentes quatuor. reliqui omnes viginti molares sunt. horum extremi atque interius conditi sophronisteres , id est moderatores ac temperantes nuncupantur: qui tum cum sapere incipimus, oriuntur. genuinos Latini vocant. dentes circumplexæ carunculæ gingivæ sunt: quarum commissura habena dicitur. latè molarium dentium summitates mensæ nominantur: maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, mortariola atque præsepia. Linguae exortum radicem vocato: ceruicem. quod sequitur: eius summum proglosson, quasi prælinguium dixeris: eius latera parasira, id est assequentia. quod est infra linguam hypoglossis est epiglossis, quod interius supra guttur est arteriæ aspera tegumentum: quò inter deuorandum nihil in pulmones decidat: inter spirandum verò, ne spiritus ascensum impediat, extollitur. Quod supra linguam in orbem cavum est, cœlū, Palatumūe dicitur. quæ deinde superius pendet caruncula, columel-

DE PART. HOM. 457

la est: quam alij gurgulionem, vnam alij
vocitarunt. ipsi subiicitur arteriæ asperæ
caput.

DE COLLO, ET EIVS
partibus, cap. ix.

DEinde collum & dera Gracè, cuius
prior pars brōchus, & aspera arteria:
circa medium prominentia guttur: auer-
si pars, ceruix & occipitium: propè iugu-
la cauum anticardium & iugulatio nun-
cipiuntur.

DE EPOMIDE, HUMERO,
scapulis, alis, & reliquis vsque ad
extremam manum,
cap. x.

ATendone autem ad humeros perti-
nentia pomides nominantur. Hu-
meri capita sunt eorum ossium, quæ à
Græcis brachiona, à nostris etiam hūme-
ri vocantur. Scoptula operta siue lata
scapularum ossa tergo imposita lata os-
sa sunt: quorum media eminentia spina

est. ingulorum latorumque scapularum
ossium copulae acromia dicuntur. con-
tinenter clauae adsunt, seu iugula. Ala
est sub humeris cauum, in quod frequen-
ter humerus luxatus delabitur. deinde
humerus est, qui brachion à Græcis vo-
catur. articuli angulus, quo nitimur in-
clinati, ancon est, siue olecranon: Lati-
nè cubitus. Quod sequitur, vlna, siue la-
certus siue brachium est: quod brachia-
li terminatur. postea palmus, deinde ma-
nus pectus, alij hypothenaron vocant,
sub pollice est. postea est manus caui-
tas, quæ vola nominatur. Ex digitis
vnus ab aliis distans magnus, pollexque
dicitur. Index autem inter alios qua-
tuor primus est, alter medius, tertius a-
nularis, vltimus minimus. horum ossa
scuticulae, aut phalanges, aut internodia
vocantur. quorum curuaturæ condyli,
sed primæ procondyli, vltimæ metacon-
dyli, omnes à Latinis nodi vocati sunt.
vnguium initia radices vnguium appel-
lantur: digitorum extrema acini, aut ca-
cumina. interstitium anularis ac polli-
cis thenar est. Hippocrates autem to-

tum hunc locum thenar appellasse visus est: qui apud Latinos volæ nomen habet.

DE PECTORIS AC DORSI
partibus, cap. XI.

A Iugulis autem in parte priori pectus ac sternon est. Tergum verò posterius à ceruice ponitur. Deinde quod appellant metaphrenon, hoc est pars è regione septi posita, sequuntur lumbi pars dorsii infima. in pectore carnes emicentiæ mammae sunt, quarum summa papillae: totum, quod sub ala deorsum versus protenditur, latus est, ossa costarum & spathae. quarum primæ inter se committuntur ad terminum ossis, quod Græci sternon, Latini os pectoris nuncupant: quæ cor situm est, septum transversum aliqui phrenes, aliqui procordiam, quasi ante cor positum, aliqui cor nominant. post ipsum est ventriculi hostium. inter costas spatia intercostalia vocant. Spuriæ costæ sunt, quæ non inter se coeunt. hæ in cartilagines degenerant.

DE VENTRIS, SEV ALVI

partibus, cap. xii.

MVsculose partes sub cartilaginibus hypochondria Græcè, subcartilaginea Latine, à quibusdam præcordia dicta sunt. Deinde alius est: quem alij ventrem nominant. quod in medio est, epigastrium Græci vocant, super ventrem scilicet cutem. media cauitas vmbilicus est, ei circumdata cutis vetula vocatur: quod ea corrugata senectam adesse significat. quod sub vmbilico ponitur, abdomen ac sumen est. quod postea ad genitalia vsque pertinet, epision, pubes ac pecten dicitur.

DE VIRILIS MEMBRI PAR-

tibus, cap. xiii.

Genitalium maris quod pendulum est, Gstema Græce, coles Latine, penisque dicitur. quod non pendet, hypostema hoc est sedimentum, aut perineus. eius extremum præputium est. Scrotum quo testes continentur, appellatur, eorum

DE PART. HOM. 461

superior pars caput est, inferior fundum.
partem laxiorem scroti laccopedon di-
cunt.

DE FOEMINARVM LOCIS,
cap. XIII.

Mulierium locorum pars superior
pecten est: fissum verò prima diuisio.
in medio sita musculosa caruncula myr-
ton, aut nymphea est. myrtocbila verò à
lateribus collocata pinna.

DE DORSI OSSIBVS, EX-
tremisque eius partibus,
cap. xv.

Dorsi ossa vertebrę sunt. vniuersa ver-
tebrarum compago spina dicitur:
cuius infima pars lumbi: postremumque
dorsi sacrum os est: quod aliqui hypo-
spondylon, id est subvertebrum, vt ver-
bum verbo reddatur, appell. runt. Hu-
ius extremum coccyx est, Latine cucu-
lus. à lumborum lateribus nates sunt.
post lumbos carnosę partes clunes ap-

pellatę sitę sunt: quę & ephedrana, quod sedendo commodę sūt, à Gręcis nominantur.

DE INGVINIBVS, CRV-

rísque totius, vsque ad extremum pedem partibus,
cap. XVI.

Inguina sunt fœmorũ principia. fœmorum partes interiores fœmina sunt, quę partes inter has per ineũmq; sunt, plichades à Gręcis dicuntur. Musculi ad genua tendentes epigunides Gręco nomine vocātur: ossa superiacentia epigunatides. hæc Hippocrates molas vocat, Latini patellas. Genu est fœmoris cum crure connexio: sub quo poples est. Supra est posterior magnus cruris musculus: vnde latus neruus ad calcem tendit: ossium verò posterius item suram, prius tibiā dicito: extrema pedibus propinqua malleoli, à nonnullis tali, sed non recte dicuntur. Tali tamen & ipsi adsunt, sed non oculis conspicui. Calx posterior est pedis rotunda pars: post quam

cauum pedis est . post hoc verò planta,
seu vestigium . cui oppositum supremū
tarsus est . totum verò pedis situm pezam
Græci vocant . Pedum digiti manuum
digitis appellationibus respondent.

Liber secundus quæ contineat.

Libri continuatio, atque propositum,
cap. i.

De cerebro, eiusque tunicis, & enatis,
cap. ii.

De oculi partibus, cap. iii.

De eis, quæ ore continentur, cap. iiij.

De pharynge, id est aspera arteria, & gu-
la, & pulmone, cap. v.

De iecore, bilis conceptaculo, & venis
portis vocatis, cap. vi.

De liene, cap. vii.

De corde, ab eoque enatis, & adiacenti-
bus, cap. viii.

De pectoris partibus, & septo trāsverso,
cap. ix.

De gula, & ventriculo, cap. x.

De intestinis, & lactibus, cap. xi.

De renib⁹, vrinariisq; meatib⁹, cap. xii.

De omento, cap. xiii.

De seminariis conceptaculis, & semine,
cap. xiiii.

De scroto, testibus, eorumq; membranis,
cap. xv.

De utero, cap. xvi.

De venis, arteriis, multisque aliis corpo-
ris particulis, cap. xvii.

DE PART. HOM. 465

RVFFI EPHESII

de partium corporis

HVMANI APPELLATIONI-
bus Liber secundus.

IVNIO PAVLO CRASSO
Patauino interprete.

LIBRI CONTINVATIO,
atque propositum,
cap. I.

P Osteaquàm extima-
rum corporis huma-
ni partium appella-
tiones exposuimus,
deinceps continua-
ta serie ad latetium,
internarumque no-

titiam trāseamus: quippè cū à viris sa-
pientibus homo exiguus quidam mun-
dus appelletur, cœlestis ordinis æmu-
lus, in membrorum fabrica, actionibus-
que præstandis varium effectum artifi-
cium possidens. quemadmodum igitur

Gg

reliqua medicinæ præcepta, ita & quæ ad dissectionis artem faciunt, referenda sunt. Quã ob rem artis principia, ac veluti fundamenta illustrioris doctrinæ causa iacentes, quem situm membris natura tribuerit, eorúmque simul nomina explicabimus.

DE CEREBRO, EIVS-

que tunicis & enatis,

cap. II.

ITaque in capite intra caluariæ concavum suis cū velaminibus cerebrũ includitur: proq; corporis mole longè maius in homine quàm in cæteris animantibus reperitur. eius substantia pulcullæ similis est, viscida atque præcandida: post id in occipitio vocatũ cerebellum collocatur. Tunicarum prima caluariæ ossibus affixa est, quæ pulsatorio etiam motu cietur: altera cerebro circumdata ipsum dissipabile conseruat, eiúsque fragile corpus in vnum cogit ac retinet: vtraq; nervosa membranosaq; est, exiguo interitorum vasculorum sensu prædita. interius cõdita motu caret, exterior mo

bilis atq; crassior est. A cerebro medulla processus exoritur per caluarię foramen in occipitio erūpens, per vertebra-
rumq; omnium caua ad extremā vsque delabitur, neque propria tamen cerebri substantia est, sed emanatio, quę spinalis medulla vocatur. Meatuū verò processus sunt à cerebro nervosi ad singula sensoria, vt ad aures naresq; & huiusmodi alia propagati. vnus autem à basi prorsum versus in duos diuisus progreditur, & ad vtrūq; oculū pergīt: qua parte vocata peluis est, atq; instar foueę iuxta vtranq; narē faciei cauitas: vbi tunicarū oculū cōponentiū plexus efficitur.

DE OCULI PARTIBVS, cap. III.

EArum tunicarum prima nimirum ab ordine prima, à colore verò candida vocata est: quemadmodum & cicatrices eius candorē indicantes ostendunt. Tunica igitur prima cādida vocatur: & cornicularis, siue cornea: aut propter firmitatem, aut quoniā interius conditus humor per hanc, tanquam per corniculum

Gg 2

pellucet, aut quòd instar cornu in corpuscula ctedonas vocata, id est fibras aut filamenta resoluitur. Secunda verò primæ per appensionem vsque ad vocatam coronã adnexa est, quæ media dehiscit, atque orbiculari cauo perforatur: cauatum autem corpusculum exterius, quæ cornicularem attingit, læue tersumque est in auersa parte asperum, vt inquit Herophilus, quale vuæ acini corium esse solet, vasculis perplexa hæc tunica est: quæ secunda ab ordine, perforata à structura, à similitudine rhagoides, Latine acinalis, aut vualis: choroides etiam quod instar secundarum, quas chorion Græci vocant, vasculis fit multis irrigata, nominatur. Tertia ab eodem meatu progressa tunica humorem oui albo similem, vitreumque appellatum includit. est hæc prætenuis, vocaturque ab humoris concretionem vitrea, à tenuitate aranealis, à vasculorum contextu figuræque reticularis: quippe quæ ex angusto in latum diffunditur, sinuaturnque: quò quartam tunicam humorem cristallo similem continentem inuoluat, cuius dimi

dium prominet, secundæ tunicæ forami-
ni contiguum, dimidium cum araneali
comittitur. Hæc igitur tunica discoi-
des, id est disco similis aut lenticularis
à figura vocatur, aut à concreto humo-
re crystalloides. nempe quidā hanc ne-
que tunicam appellandam esse censent:
nam membranofam quandam congela-
tionem esse dixerunt.

DE HIS QUAE ORE
continentur, cap. IIII.

DEinceps ad ea quæ in ore latent, de-
scendamus. Lingua primū turbinata
figura consideretur, à lato in angustum
gracilescens, à faucibus radices ducens,
carnoso & quodammodo nervoso cor-
pore, in cibis atterendis deuorandisque
mobilis: præterea & ad articulatæ vocis
creationem emissum aerem secundum
animi inclinationem conformans, gu-
statoriūque sensum participans. In hu-
ius basi epiglossis vocata exoritur, ceu
quædam exigua lingua supra eius lati-
tudinem assurgēs, in faucibus ex latiore

Gg 3

basi in angustum finiens, cartilaginea materia constans, faucibusque cognata. hæc asperæ arteriæ operculum, & ciborum in gulam descensus iter quoddam est. Supra epiglottida autem supernè columella dependet, ex palati partibus secundum eius foramina exoriens. hæc & vva ab extremitatis rotunditate vocatur, nullam magni faciendam utilitatem afferens. unde fit, vt ea recisa nulla corporis actio vitietur. In penitioribus autem ab vtraque linguæ parte affixæ tonsillæ sunt, numero sex, corpore glandulosæ, figura subrotundæ, natura facile mutabiles, atque dissipabiles, mēbranulis quibusdam altius insertis conuolutæ. ex his quatuor ab vtroque latere cernuntur, duæ verò cerni vix queunt. Has Græci vocant paristhmia, quòd in angusto meatu sitæ sint. veteres enim Græci locorum angustias isthmus appellabāt. Antiadas verò, quasi contrarias dicas, iccirco etiam nominabāt, quoniam ore aperto inter se contrariæ, præsertim quū inflammatae sunt, appareant.

DE PHARYNGE, ID EST

aspera arteria, & gula, & pul-
mone, cap. V.

INde à palati ac linguæ partib⁹ duo iti-
nera patefiunt. horum prius pharynx
Græcum vocabulum habet, inter hoc &
colli vertebra gula est. Pharynx cartila-
ginosus est, atq; in orbem patēs, superius
latior, infra verò angustior. per iugula
autem, appellatumq; antisternon, id est
spinā dorsi, quæ pectori opponitur, de-
scendens in medios pulmones inseritur:
ipsoq; anulis, quæ bronchia vocant, inte-
xit. huiusmodi membrum aspera arte-
ria, quod istis anulis asperata sit, dici
meruit: bronchus etiam à quibusdā vo-
catur, ad aeris inspirando ducti transitū,
vocemq; edendā à natura cōstitutus. De
ipso pulmo suspēditur rarus ac peruius,
pectoris inanitate conclusus: idē globo-
sus est, murisq; caudæ figura speciē re-
præsentās. in fibras quinq; diducitur, co-
lore cinereo atq; subalbido. assidua mo-
tione concutitur, follis morem in spi-
ritu transitu retinens. quippe spiritus

Gg 4

per asperā arteriam in bronchia tractus
per pulmonis spiramenta intra pectoris
cauum elabitur : atque iterum foras ab
hoc per naturalia formina propellitur.

DE IECORE, BILIS CON-
ceptaculo, & venis portis vocatis,
cap. vi.

AB vtrisque præcordiis lienis iecurque
iacent. sub pulmone à dextris iecur
est, transuerso discrimini magis appen-
sum, posteriori parte in gibbum assur-
gens: in quatuor aut quinque fibras di-
rimitur, colore lentis ad rubicundius ta-
men vergit, venoso corpore iuxta atque
sanguineo. Venas autem quæ cauæ per
interseptum ad cor tendenti commit-
tuntur, ora portasque vetusti scriptores
nuncuparunt. Sub conuexa parte pusillū
quoddā vasculū vesicæ simile defixū est,
neruosum, fellisque inibi geniti capax:
à quo sanè meatus quidam nerueus per
lactes ad intestina contendit : per quem
paulatim bilis in intestina delabitur,
excrementaque felleo colore suffundit,

atque ipsa depellendi cupidinem infert.
 Hoc intercluso itinere aurigo futura
 portenditur, bile per omne corpus effu-
 si. quocirca albidæ cretaceæque deie-
 ctiones exeunt. Est autem præferuidum
 igneumque iecur plurimū ad se alimen-
 ti attrahens, ac finitimis partibus com-
 municans. iccirco sinistris dextræ par-
 tes viribus præstant.

DE LIENE,

cap. VII.

AT Lienis iecori cōtrarius in sinistris
 præcordiis iacens opponitur, ad hu-
 mani vestigij longitudinem protentus,
 superius rotundus & robustus, infra con-
 tractus & gracilis, medius angustior; vi-
 ni fæcis colore perfusus, laxus ac fora-
 minulentus, conceptaculis multis im-
 plicitus: ignauum membrum, nulloque
 fungens ministerio.

DE CORDE, AB EOQUE

natis, & adiacentibus,

cap. VIII.

Pulmonis fibris cor circumtegitur, intra pectus sedem habēs secundū medium, magis tamen ad sinistram declinans, & sub sinistra mamma collocatur, pinei nuclei effigiē adeptus, & à lata base in mucronē instar turbinis acuminatum, musculosum natura atque nervosum, pulsatorio semper motu percitum, medium inane, duobus manifestis sinibus concavum, altero in dextris, qui sanguineus, quòd multitudine sanguinis affluat, appellatur: altero in sinistris spirituofo, quoniam spirituum copia redundat, nuncupato. inde fit etiam, vt spirituum agitatione moueatur. Membranis præterea vtrinque latioribus auricularibus vocatis cor præcingitur: quoniam ad aurium imaginem cordis lateribus iuhærent, & prominēt. Ab ipso verò plura conceptacula nascuntur, & venę, & arteriæ: è quibus omne corpus vasculis tanquam riuus emanantibus irrigatur. Membrana præterea quadam cor veluti sepimento vallatur, eam pericardion Græci nominant, nervosam, tenuem, motuque à corde transfuso palpitantem.

DE PART. HOM. 475

DE PECTORIS PARTIBVS,
& septo transuerso, cap. IX.

HÆc omnia complectens pectus ex cartilaginibus componitur atque ossibus: quæ in costis, pectorali osse, atque dorsi spina reperiuntur. neruorum etiam carniūque particeps extra carnosius, interius neruosum est. qua etiam parte succingente membrana vestitur. Interseptum autem, siue transuersum septum obliquum pectori, qua costæ finiuntur, subtenditur. id ita vocatum est, quòd viscera in pectore abdita ab inferioribus intersepit.

DE GVLA, ET VENTRICULO, cap. X.

A Superioribus igitur corporis partibus, quemadmodum supra retulimus, simul cū aspera arteria enascitur, secusque ipsam gula protenditur, ab eisdem vtique partibus incipiens, nō similiter autem desinens. Hæc tubæ imagine figuram amplitudine refert, supra

angustior, infra verò, quàm cum ventriculo committitur, capacior. hoc quippe nomine superior venter natura nervosus vocatus est. mure autem sicci humidique alimenti deutorandi gula fungitur: cuius examen ipsa acutissimo sensu prædita facit. Ventriculus itaque à gula exorients sub medio intersepto ad lævā magis reflexus collocatur ab angusto ore in latam capedinem sinuatus, cuius conuexum extra in abdomen vergit, sinum verò dorsum respicit. longè, quàm gula, nervosior ventriculus est atque amplior. ipse nimirū intus accepta colliquans non magnopere se dilatat: sed cibi ingressui cedens, eius descensum se constringendo insequitur: cum ad alimēta suscipiēda à natura creatus sit.

DE INTESTINIS, ET LAP-
tibus, cap. xi.

A Vētriculo intestina in plures orbes implicita ad cibaria, quæ ab eo delabuntur, excipienda formata prodeūt. horum vnum idēque ab ipso vocato

processu ad rectum ac sedem usque iter
pertinet. inter quę primum est, quod ho-
starius, aut dodecadactylus dicitur: ho-
starius quidem, quod in ventriculo po-
sita tãtis per, dum sunt coacta, custodiat:
cũ remissa sunt autem, tunc & hostia-
rius cum intestinis aperitur: quẽadmo-
dum ani musculus sphincter, id est ad-
strictor, vocatus remittitur. Dodecada-
ctylus autem à duodecim digitorũ lon-
gitudine vocabulum accepit: nervosa
ipsum crassaque substantia est: hoc ap-
pellatum ieiunum tangit aliis intesti-
nis carnosius, semper ferẽ alimentĩ pe-
nuria laborans: unde ieiuni quoque ap-
pellationem adeptum est: quod in ipso
videlicet alimentum, ut in ventriculo
& intestinis assolet, nõ inuenitur. postea
gracilia quę vocantur, intestina proli-
xa in multas spiras conuoluta, tredecim
cubitorum longitudinem æquantia col-
locantur, & sub umbilico in abdominis
regione ponũtur. Sub his omnibus cœ-
cum intestinum, & colon eodem loco
exoriuntur: cœcum quidem recta in
dextrum inguẽ spectans, altera ex parte

obstructum: colon verò, quod maius intestinum Latini vocant, à dextris enascens, supernè sese circunvoluens, in incur præcordiæque adductū incidit, deinde lienem sinistrumque ile petens, posterius cum recto intestino coniungitur. id nonnulli & inferiorem ventriculum nominarunt: in quo etiam plurima cibi pars in stercus vertitur. omnium potestremum rectum est cæteris carnosius, rectamque sedem, unde & nomen accepit, sortitum est. in anulum antè & sphinctera vocatum, id est adstrictorem, designat, eum quidem nervosum & durum, hunc autem carneum atque rugosum, infimum omnium collocatum. Inter intestina mediæ lactes sunt, quos Græci mesenterij atque mesaræi vocabulo insigniunt.

DE RENIBVS, VRINARIISQUE MEATIBVS, cap. XII.

Renes circa vltimas dorsivertebras siti sunt, numero duo, figura rotundi, colore leticulæ, & quasi subcinereo. dexter

DE PART. HOM. 479

paulò altior grandiorq; inuenitur. den-
so squallidòque corpore constant: fau-
ciati ineuitabilem mortem afferunt. In
penitis cauisque eorum partibus mem-
branulæ sunt instar cribri, foraminibus
plurimis pertusæ. vnde meatus duo ex-
euntes vesicæ summitatem intrant: per
quos vrina in vesicam transfunditur, in-
dèque foras expellitur. hos paulo ante
meatus nominauimus.

DE OMENTO, cap. xii.

OMentum intestina contegit præpi-
gue, duplicique membrana contex-
tum. ipsum idcirco natura condidit, vt
intestinis superfluitans ea aduersus am-
bientis peritonæi duritiam remolliret.
recisum aut vulneratum vitæ discrimi-
ne vacat.

DE SEMINARIIS CONCE- ptaculis & semine, cap. xiiii.

AT seminaria itinera secundum re-
nes quatuor descendunt: bina recta

tendentia, quos & assessores & glandulosos nonnulli vocant: bina varicosa, quòd varicis more circunfleuntur. intra hæc fœcundum semen gignitur, grandinosum crassumque: quare & ipsa nonnulli genitales venas appellare voluerunt. in alteris autē est infœcundum dilutūque semen, quod simul cū priore eius nutriendi causa excernitur. verū ab vtraque parte coniugata simul vtraque à dorso descendunt. sed sterilia vascula cum velicæ ceruice coalescunt: varicosa verò per inguina testiculorum tunicas subeunt. Quapropter eunuchi semen quidem, sed infœcundum è glandulosis fistulis eiiciunt: è varicosis verò excisis testibus seminis profusio seruari non potuit.

DE SCROTO, ET TESTIBUS, eorūque membranis,
cap. xv.

SCrotum & tota ea laxitas est, in qua testes continentur, & magis propriè exterior carnosā pars, ex mēbranis constat

stat, exteriore quidem darto vocata, quæ rugosa est, interiore autem erythroide. Nempe scrotum & dartos communia amborum testium inuolucra eos superioribus partibus suspendunt: sed erythroides sibi ipsi adnectit, atque in orbem testes amplectitur, priuatim seorsumque singulos inuoluens. Ipsi testes autem ex pulticulæ simili materia constant, humidique admodum neruosa firmaque membrana includuntur.

DE VTERO,
cap. XVI.

Mulier autem genitale membrum, quod vulua atque vterus vocatur, inter conceptacula eximium est: inter vesicam rectumque intestinum ponitur huic incumbens, illi subditum, medicinalis cucurbitulæ figuram æmulans. hoc loco venerei congressus exercentur.

Hb

DE VENIS, ARTERIIS,
multisque aliis corporis par-
ticularis, cap. XVII.

VENÆ receptacula sanguinem conti-
nentia sunt, per quas sanguis in om-
nes corporis partes diffunditur. Arteriæ
spiritus & quodammodo etiam sangui-
nis receptacula sunt: in quibus motio fit,
quæ pulsus communi vocabulo dicitur,
& à corde exclusus spiritus per ipsas in
omnem corporis molem dispellitur.
Pinguetudo est alba oleosaque concre-
tio, quam adipem etiâ nominant. Glan-
dulosa carnes, quas Græci adenas vo-
cant, concretiones quædam subpingues
atque carnosæ sunt, peculiariter cauis lo-
cis insitæ: alis, dico, & inguinibus, nec-
non & lactibus. Ossa coagmenta quæ-
dam sunt solida, sanguine & sensu cæ-
rentia, per quæ actiua atque electoria
motiones perficiuntur. Musculus corpus
est firmum ac densum, non simplex, sed
ex nervis, venis, arteriisque composi-
tum, sentiendi particeps, officium volun-
tariæ motionis obiens. Cartilagines au-

tem concretiones sunt mediae inter ossa
 neruósque naturæ: ossibus enim mol-
 liores, neruis duriores sunt, præcipue os-
 sium extremitatibus coalescentes. Ner-
 uus corpus est simplex atque densum,
 voluntarij motus instrumentum, obtu-
 si, dum inciditur, sensus. Secundum Era-
 sistratum quidem & Herophilum sen-
 sorij nerui sunt: Asclepiades autem ip-
 sos sensu vacare testat^r est: cæterum se-
 cundum Erasistratum cum gemina ner-
 uorum natura sit, sensoriorum videli-
 cet, atque mouentium, sensorij, qui caui
 sunt, in cerebri membranis originem ha-
 bent, mouentes in cerebro ac cerebello.
 Dixit autem Herophilus aliquos esse vo-
 luntati obediētes neruos, qui & à ce-
 rebro spinalique medulla oriuntur: ali-
 quos, qui ab osse orientes in os inferun-
 tur: aliquos à musculo in musculum
 transeuntes, qui articulos etiam copu-
 lant. Medulla substantia est ynguinea
 & exanguis, quæ semper in ossium ca-
 uis includitur.

Hh 2

Q V A E T E R T I V S R V F

fi Ephesij liber con-
tineat.

De ossibus capitis, & futuris, & cauis,
cap. i.

De colli vertebris, humeris, scoptulis o-
pertis, & eorum processibus, cap. ii.

De iugulo, ossibus humeri, brachij, &
manus, cap. iii.

De dorfi lumborumque vertebris, & co-
stis, cap. iiii.

De coxa, fœmore, & reliquis vsq; ad ex-
tremum pedem ossibus, cap. v.

DE PART. HOM. 485

R V F F I E P H E S I I

de membrorum hu-

MANORVM APPELLATIO-

nibus, Liber tertius,


I V N I O P A V L O C R A S S O

Patauino interprete.

DE OSSIBVS CAPITIS, ET

futuris, & cauis,

cap. I.



Ostea quàm interiorum locorum naturam nominâque pro viribus superius exposuimus, modò de ossibus sermonem subiiciemus. Calua-

ria igitur, qua parte vocata scaphula est, globosa cernitur, in vertice extuberans, in syncipite subcrassa aliquantulum, & lata, atque per ossis iniectum duplicata, circa tempora compressa, plerunque futuris quinque diuisa: vna in

Hh 3

vertice in posteriorem partem tendente, quæ à literæ lambda similitudine lambdalis nomen habet. Altera autem in syncephite orbiculari, coronæ vnde & dicta est, formam imitante: quæ ibidem terminata finitur. Tertia à lambdali recta verticem partita coronariæ vocatæ coniungitur. Duæ præterea sunt secundum aures in temporum sedibus squamiosæ dictæ, nō in profundo, vt reliquæ, structuras habentes. Priori ex parte cauernæ oculorū sedes sunt: pyelidas Græci nominant, nos arculas, seu peluiculas dixerimus. Inter has nasi os insurgit, intra quod ithmoides à cribri similitudine cognominatum os multis foraminibus cauum reconditur. Facies præterea ossium coagmētationes tales habet, infra supercilia vnā, duas ab nasi ossis obliquis lateribus, quartam inferiorem maxillam separantem, quintam in palato iugalibusque ossibus, duas alias, quæ vix cerni queāt in malis. At caluaria ab inferioribus partibus concaua foramina profunda rotundaque habet, per quæ spinalis medulla descendit.

DE COLLI VERTEBRIS,
humeris, scoptulis opertis, & eo-
rum processibus,
cap. II.

Collis septē vertebræ sunt inter se con-
gruenter insertæ. harum prima capi-
ti motum exhibet, reliquæ immobiles
sunt. postea humerus est, deinde scoptu-
la operta figura triangula pectoris co-
stis posterius ad tabellæ imaginem in-
cumbunt. & qua parte latiora sunt, ibi
etiam tenuissima: qua verò angustiora,
ibi & crassiora & robustiora in sinum
quendam subsidentia: in quem humeri
caput coniicitur. Ab eo sinu processus
exigitur, ceu spina quædam ab anchoræ
hamiq; similitudine ancyroides & an-
cistroides Græcè nuncupatus. cum quo
iuguli extremum per cartilaginem coa-
lescens committitur.

DE IUGVLO, OSSIBVSQVE
humeri, brachij, & manus, cap. III.

AT iugulum in tribuli formam effi-
giatum instrumento illi, quod ca-

thetera masculinum Græci vocāt, per-
simile est, cum osse autē pectoris, cumq;
lato scapularum osse connectitur. ipsa
verò iugulorum media pars sigma Græ-
cæ literæ similis cum prima dorſi ver-
tebra coniungitur. Humerus prælongus
ac teres est, superiorique parte, quæ hu-
meri caput dicitur, tumidior. id dimidi-
um in verticillato scapularū osse recodi-
tur. At inferius, qua cubito deligatur,
inæqualis est, duosque vtrunque proces-
sus pugillis similes habet, medium ca-
uum: à prioribus quidem partibus mi-
nus, à posterioribus autem magis con-
tractus est. Brachium ex ossibus duo-
bus constat, cubito ac radio. Radius,
quam cercida Græci appellant, superior
breuiorque: & primo tenuior rotun-
do & leniter cauo capite exiguum hu-
meri exteriusque tuberculum reci-
pit. Cubitus inferior longiorque, & pri-
mo plenior est, atque in manus articu-
lo brachialis extremum admittit. Ra-
dius vtrique, qua brachiali adnectitur,
duobus sinibus cauus est, altero recto,
quo firmatur articulus, altero à latere,

in quo rotundū cubiti caput inseritur. Porro brachiale ad figuram turbinis ex octo ossiculis coagmentatur. Post hæc phalanges sunt, prælonga ossa digiti formam habentia. Deinde ossa digitorum scythalides à Græcis, id est scuticulæ, à Latinis Internodia nominata, in singulis digitis terna inter se inæqualia præter pollicem: quippe qui à basi duobus tantum ossibus nititur.

DE RELIQUIS VERTEBRIS, & costis. cap. IIII.

Post septem colli vertebrae sunt dorsi duodecim, lumborum quinque vertebrae: & omnes quatuor & viginti sint. Ita verò instructæ paratæque sunt, ut introrsum versus, qua viscera continent, læues ac circumductiles, exterius asperæ spinosæque sint, carne ingenita obrutæ, à lateribus in mensuram formam explanatæ, omnes in medio concavæ, unicum in suo corpore cochleæ instar foramen habentes, per quod (ut supra diximus,) spinalis medulla demittitur. in

transuersis præterea processibus parum
defidentes sinus habent, qui costarum
extrema recipiunt. Nempe costarū aliæ
superius inflexæ instar fornicis, inter se
deinde in interiora leniter flexæ com-
mittuntur: aliæ obliquæ occurrentes,
postea cartilagineæ factæ spinæ, spu-
riæque costæ nominantur, & maiorem,
quàm in superioribus, circuitum ex cō-
cursu minorem faciunt. Reliquis omni-
bus vertebris vltima præstat, quod & sa-
crum os secundum antiquorum consue-
tudinem appellamus: qui omnia magna
sacra nominabant.

DE COXA, FOEMORE, ET
reliquis vsque ad extremum
pedem ossibus,
cap. V.

AB utroque autem huius vertebræ la-
tere coxarum ossa posterius exten-
duntur, suisque extremis ossi pubis, cui
pectini nomē est, cartilagine coalescen-
tia deligantur. Hæc figura lata sunt ac
subrotunda, interdū etiā angusta ac cras-

fiore . Id genus ossa sinus verticillatos non exactè penetrantes, sed profundos habent, quos Græci cotylas, Latini acetabula vocant. in eos fœmorum capita coniiciuntur. At fœmora prælonga valentiâque ossa sunt, à coxis ad genua usque pertinentia, tereti figura, atque in exteriori parte gibba. ab inferioribus autem, qua genua attingunt, tuberosis globis intumescunt adeo, ut utrinque in rotunda capita consurgant; media verò sinuata sunt, quò facilius excipi à tibiis possint: quæ triangulæ, & in summo capite latecentes leniter in sinus descendunt, in quos extuberantes fœmoris eminentias recipiunt: ipsius vero tibiæ promi-
nētia in sinum fœmoris inseritur. At ab exteriori parte os alterum, quod sura rectè nominatur, appositū est, tibia gracilius, non proximum fœmori, infra brevius, qua etiā parte tumidius est. eamque nonnulli vulgares talum vocari assue-
rant. utrunque os autem sura, videlicet, ac tibia in fine multa cartilagine unita continētur. Sed tibiæ fœmorisque com-
missuræ os incumbit, quod Græci epi-

genatida, Latini patellam, seu molam
 vocant. Hoc disci figuram repræsentat,
 & superfluitans medium situm est. ve-
 rùm in curuando crure ad tibiā ma-
 gis accedit: cū autem extenditur, su-
 per vtrunque os cadit. In partibus mal-
 leolo proximis tibia paulū gracilescit,
 atque in extremo ad stigma Græcæ lite-
 ræ speciem ita æqualiter distat, vt pro-
 cessus duos, alterum oblōgum, alterum
 breuiorem habeat. at maioris processus
 caput interius est, alterius enata carne
 occulitur. cum suræ autem extremo cō-
 iungitur, quod vltterius procedens exte-
 riorem, vt modo dixi, tumorem osten-
 dit. Quapropter huiusmodi ossa ad stig-
 ma literæ formam media dehiscunt: in
 quo hiatu talus delitescit. Hic secū-
 dum partem quatrionem allachium vocatam
 fursum vergit, & ea quidem imis tibiæ
 suræque processibus adiacet. verū os
 ἐπὶ τρεῖς vocatum super imposito illis
 suræ ossi, quod à figura cubicum nomi-
 natur, ad cauitates incumbit: vt ossis
 ἐπὶ τρεῖς quod vocant, inæqualitates
 occludantur, cartilaginæque circunda-

ta diligentur. Anterior autem ipsius rotunda particula in cavitatem cuiusdam ossis quod ex illis est, quæ tarsum vocatum constituunt, & à cavitare naticulare dictum fuit, inseritur. Ex octo autem ossiculis inæqualibus angulis tarsus instruitur. Ipsi planta subiicitur è quinque ossibus composita in medio tenuibus, in summo crassescens, sursum versus exurgentibus: unde & à terra caua cernuntur. Post hæc deinde sunt ossa digitorum, quæ scythalidas Græci, Latini vocant internodia, ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem comparata. Ossium figura, situs, & nomina pro viribus à nobis explicata sunt.

VARIÆLECTIONES,

quas interpretes adnotarat.

pag. 26 extrinsecus vlcerat, alia lectio,
attrahit. & ad interiora, alia,
suffocauit.

31 curuantur, alias, vigilant.

47 lucentes, alias, mobiles.

59 ad spinam, alias, concava.

61 lotium acre, alias, flauum.

88 & excandescentiæ, alias, tristitiæ.

91 frigori similes, aliter, affectui.

114 ex violento abscessu, aliter, violenta
extentione.

122 tussis longior, aliter, minor.

130 spiratione maior, aliter, dolore.

134 ad albedinem vergit, aliter, album
cum viridi mixtum.

165 communi simul violento. Hæc ver-
ba abundare videntur.

209 aliud extrinsecū, aliter, intrinsecū.
crudorum & incoctorum distribu-
tio fit, aliter, seminis crudi & in-
cocti emissio fit.

211 nasus tumet, aliter, atque extat.

DE PART. HOM. 495

- 296 et far Tyrrhenum, aliter, Zea.
312 soluendus est æger, alias, lauandus
est.
316 At si dolor absit, aliter, febris.
319 ad recessum eius, aliter, ad exten-
sionem.
348 quin & palmularum, aliter, præter.

Handwritten text in a historical script, likely Latin or a vernacular language, arranged in several paragraphs. The text is faint and difficult to decipher due to the age and quality of the image. It appears to be a single column of text on a single page.

ANNOTATIONES
locorum, qui in
ARETAEI CODICE GRAE-
co, ab interpretatione Crassi
discrepant, autore
G. M. T.

In cap. V. lib. primi.

Leui de causa, utpote) Græce est, qui-
busdam concidendi angor animi causa
fuit.

Aut inde exortum est) aut alicunde.
Futuramque prospiciunt.) adiutores
inquit, aduocant, quodã usu futuri præ-
sagi, vel, futuram prospicientes experi-
mento calamitatem.

Nonnunquam & nos ad ægritudinis
notitiam impulerunt) ad nostram existi-
mationẽ tale remedium mali aduentũ
depellit si legas pro *ἰκετῆρυν, ἰμέγυν*,
sensus erit, eo die accessum repulit. hic
enim *συνασίη* id significat, ut mox.

In cap. VI.

Ii

Ariditas senectæ, & mortis natura)
frigus & ficitas senectutis, quæ etiam
est mortis natura.

Omnes subito atque affatim corripit)
ut in summa de omnibus dicam. Inter-
pres legit ἡγεῖται.

Aut cuneis per Iouem facile diduci),
abundat, per Iouem. Ionica tmesis fefel-
lit interpretem.

Ego sane vidi & miratus fui, lotium,
&c. Videntur hæc verba ad præcedentia
pertinere, cum ait cuidam etiam aures
moueri, quod, inquit, mihi spectanti mi-
raculo fuit. Tum sequitur, Lotium sup-
primitur, aut sponte effunditur quodam
vesicæ compressu.

Crura flectuntur: è contrario popli-
tes vitiose curuantur) crura adducta.
nam vitio quodam contra poplitem fle-
ctuntur.

In cap. VII.

Et singulorum naturæ insignis ma-
cies) gracilitas quàm pro cuiusque natu-
ra maior. Genitium φύσις ad ἰσχύος
ille retulit, cum ad comparatium refe-
rendum videatur.

Charonæis) interpres notat alias le-
gi Coronæis. χαρώνια sunt quæ Latinis
Auerna dicuntur.

Eodem die moriuntur, qui celerrime)
quorum acutissimum malum, eodem
die moriuntur.

In cap. VIII.

Et increfcit, liuet) & increfcēdo liuet,
vel, & in illa anplitudine liuefcit.

Prouenit autem & id ex fluore), nasci
tur autem istud, sponte quidē ex fluore.

Quoniam tonsillæ vna malè habent)
tonsillis ex consensu dolentibus.

Et inflammationi magis obnoxij), &
magis fit inflammator, vna videlicet.
Interpres videtur legisse ἐπιφλεγμαίνεσσι

In cap. IX.

Eundēque vehementer in pectus spi-
ando adducunt. Immundi adeo sunt,
& neque) quo quidem protinus pectus
icissim adflant. vsque adeo sibi displi-
ent, vt non, &c.

Tristantur enim) nauseant enim.

Quiete carentes) sui intolerantes.

Nam quiescere nequeunt. solitudinē

fugiunt) quietis impotentia, quietem re-
fugiunt. interpres legit ὀρίμιν.

In cap. X.

In sua enim ipsius sede collocatur) in
sua enim sede membrana collocatur.

Atque in soporem grauem inclinātes,
mentis alienationem patiuntur) & in il-
lo sopore iactantur.

Morbi transpositione) morbi transitu
feu migratione.

Difflatio atque digestio) difflatio at-
que exhalatio.

IN LIB. II, DE CAV-
fis, cap. I.

Male vitam agit) miserè viuit.

Vomica scilicet pulmonis. Nam fe-
bris acuta comitatur, doloris carentia.
Hic prætermissa sunt quædam, Pulmo-
nis inflammatio cum acuta febris, quæ
bus accidit thoracis grauitas, indolenti

Sedere volunt laborantes: ad spiritu
ducendum corpus rectum statuitur) si-
dere cupiunt in rectum habitum ad re-
spirationem.

In sacrum ventrem) in imum ventrē.

In cap. II.

Cū verò paucissimus & guttatim sanguis exit) quod si amplius eieciatur sanguis guttatimq; Interpres videtur legisse, *ἐπειδὴ μᾶλλον μὴ βεβήκει τοι αἷμα βρ.*

Qui expuitur sanguis, haud ita crassus est, colore ater) quod si ex sputo sanguis sit, haud sane crassus est, verū colore ater. Interpres legit, *ἦν δὲ το*

Id fordidum, vlcerosum) asperius, vlceratum, &c.

Tussis non scretus exoritur) tussiunt) que pro screatione.

Atque inde fit corruptionis initium) *φθογῆς* videtur legisse, cū sit, *φογῆς*. vnde initium cursus seu eruptionis.

Non ita terribile est) neque admodum latalis est affectus.

Per narem illum sanguis erumpit, quæ è regione patienti visceri opponitur) per nares sanguinem emittunt, ea fluente nare que rectà visceri respondet.

Vel ferendo onere, aut tollendo) vel contentione oneris gerendi, vel eius impositione.

Detrita & attenuata) multum tabes-
cit & tenuata.

In aliquo inani spacio) in caua capa-
citate.

Quoniam ater est sanguis, crassus, &
facile spissescens, qui à vena mittitur:
præterea minus, &c. Quoniam ater est,
crassus, & facile concreescens, si ex vena
manet, minusque periculi adfert. sequi-
tur, Sin ab arteria, flauus, &c.

Erosionis autem curatio magnam di-
ligentiam postulat, cum sit longa, diffi-
cilis, & periculosa. Etenim parte mem-
bri deficiente, ad solidat.) curatio, si ex
erosione nascitur, longa est, difficilis &
periculosa: ideoque propter defectionē,
ad cicatricem vlcus non perducitur.
pro $\mu\chi\rho\eta$, alia quædam exemplaria ha-
bent $\kappa\chi\rho\eta$, idest malum.

In causa est venularum quæ ibi sunt,
arteriarumque tenuitas) illic enim gra-
ciles venulæ sunt, & minutæ arteriæ.

Nonnullos autem & gulæ ipsius do-
lor inuadit, ad interscapulum vsque in-
terdum pertinens. vomunt pituitosa)
ingeneratur autem & nonnullis dolor

stomachi: vomitus dorso tenus pituitosi.
Interpres legisse videtur, ὁ δὲ μέσφι με-
ταφρένσ. ἐμεδὶ φλεγματώδεις

Nonnunquam, si morbus producit
& inualefcit, cibum reiiciūt, cibos sum-
mopere fastidiunt) Regerunt autem a-
liquando plurimum, vbi morbus in lon-
gum abit, estque maior inedia.

Cum materiā euomuerunt) si verò
hæc euomuerint.

Tussis permolesta est: sanguis verò
exacte flauus) cum magna tussi sanguis
affatim rutilus.

Si in pectore noxa fit) sin à thorace
hauriat.

Si à membrana costas vestiente) sed
si à latere, cum tussi, &c.

Dolor succingentis membranę) late-
ris dolor.

Terribilior est quàm periculosior)
quàm infestior.

IN TERTIVM CAPVT.

Ocyphon) exclamatio est indignācis,
dij vestram fidem, cuius mali nomē est?

Syncopę facultate) vi & potentia, vi-
ribus.

Ad mortem vitamve potentius) capitalius. Cutis irrigatione) cutis non habet Græcū, sed ipsorum, idest capillorū.

Verum cordi stomachus vicinus perniciosus est) sed enim stomachi vicinitas cordis permagni interest.

In cap. IIII.

Oculi puri) ἀγέες mobiles.

Omnia ignorat) neminem agnoscit, vel, nihil agnoscit.

Vapor ē naribus multus exhalat) magnum nares voluunt anhelitum.

Copiosa & aliena humiditas) πλῆθος, mador ingens.

Iam in aerem cesserit) codices quidam habebant, ἐξ ἱερῶν μυστῶν id est quasi consecrata, & non iam humanæ, sed diuinæ.

In cap. V.

Vngues liuent, algēt extrema) vngues liuent, perfrigescunt, algent extrema.

In cap. VI.

Remollitio intestinorum accesserit) adde, multūq; imū ventrē superauerit.

Humiditas superans) mador.

Vt neque vel tenuem acum) vt ne te-

nue quidem segmentum.

In cap. vii.

Ad tussim inclinatio) conatus.

Vomere frustra conantur) inaniter distenduntur.

Multorum variorumque fructuum) tempestiuorum & variorum fructuum.

In cap. viii.

Si quis enim aliquid, &c. eundem descensum & ascensum inueniet) Aliter Græcè est. Si quis enim velit, lamellam trahat à superiore vena cava ad cor pertinente, in eam quæ per spinam perreptat, & à spina per iecur ad cor. idem enim ascensus est.

Sunt autem cedmata, &c.) Hæc cedmatum descriptio, interpretis est, non Aretæi.

Et ventriculus sanguine redundat, pro *ἢν δὲ* in Græco legendum videtur *ἢν δὲ* hoc sensu, Quod si venter sanguine plenus sit, inflammatioque nascatur circa venam, si magna sit, ipsa celeriter hominem tollit. Alterius lectionis sensus est. Nempe venter sanguine plenus erat. Nasceatur autem, &c.

Flamma) θερμὴ, calor.

Et cum eo palpitatio, &c. quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur) in Græco inflammationis nulla mentio. sic enim habet, Et palpitatio ipsius venæ in porrectum ad ilia usque perveniens: nonnullis etiam arteriæ, secundum spinam. subauditur enim è superiori, palpitatio.

Lotium acre mordax que est) lotium flavum mordaxque.

Causi, id est ardoris speciem) simpliciter est, causon appellant.

Quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur) mente, inquit, non perturbati illi quidem, sed tardi & maridi.

Exoritur, cum ferum & immane quiddam sapit. Viros ac iuvenes occupat) exoritur, quoniam & quod ferum & immane est adolescentes & florentes occupat.

In cap. IX.

Cum distentionibus) convulsionibus. Emittunt. Quicumque verò non moriuntur, plures, &c. Celerrime, inquit omnium qui moriuntur, pereunt, qui nihil prorsus emittunt. plures enim liberan-

tur, aut calculo in vesicam per urinæ fe-
mitas delapso, aut phlegmone suppuran-
te, paulatimve per diffilationem exhalā-
te, quanquam, &c. Interpres addita ne-
gatione, sensum turbauit.

Sed phlegmone ratione, &c) sed ex
phlegmone quæ cum profluuiio sangui-
nis coniuncta sit, si retentus sit sanguis.

In cap. X.

Ab innato calido) ab innati caloris fo-
mento.

In imo sacro ventre) abundat ver-
bum, sacro. exemplaria iēgⁿ habe-
bant, vt supra vii^{ix}igⁿ legendum vi-
detur. In nouissimo, inquit, ventre infi-
ma sedet, à thorace longissime amanda-
ta. sed eius officium maxime refert, uri-
næ, inquam, egestio.

Vlcus accedit & inflammatio) disjunc-
tum, aut inflammatio.

In cap. XI.

Sed ex ambrothriæ subiectione exci-
tatur) sed ex abortiu i causa: vuluē, &c.

Nequaquam tamen ab affectu exci-
tantur aut subleuantur, imò quàm celer-
rime interitus aduenit) tam celerrimè ex

hac valetudine reficiuntur, quàm celerimè moriuntur. Interpres pro *ὠκιστα* legit *ὥκιστα*.

Veruntamen communes quoque viris ægritudines in vulua oriri consueverunt, veruntamen communes vuluæ viris quoque ægritudines oriuntur, id est patiuntur viri aliquando morbum qui communem cum vuluæ strangulatu habet phlegmonem sanguinis, profusionem, &c.

In cap. xii.

Dionysio) Baccho, Libero patri.

Intemperantes quoque in aluo exoneranda, in venerem lasciuientes) neque verò sibi moderari queunt, quin propalam re habeant. Interpres malè pro *ἀμφαδον*, *ἀφοδον* legit.

Vomitibus non absque discrimine effuderit) abundant hæc verba, non absque discrimine.

I N L I B. P R I M I D E

morbis diuturnis, cap. iiii.

Terribilis utique in accressionibus) accressionibus effratus.

Vexat etiam pueros & adolescentes) & pueris etiam adolescentibusque contumernalis est.

Cum ætatis flore) cū formæ dignitate Interdum morbus iste) $\pi\omega\pi\iota$, insuper, adhæc. Interpres legit $\kappa\omicron\tau\epsilon$ seu $\pi\omega\tau\epsilon$ Ipsius quoque morbi origo mirabilis & præter hominum opinionem est) sed & ignominiosa quoque species est.

Aut ob vulnera quæ tempore exacerbationis accepit) aut ex accessionū vulneribus.

In cap. V.

Bilem quidem in istis redundare, iracundia significat: atram verò bilem iracundiæ vehementia ac feritas) etymon est vocabuli $\mu\epsilon\lambda\alpha\chi\omicron\lambda\iota\kappa\omicron\varsigma$, in quo nomine, inquit, $\chi\omicron\lambda\iota\nu$ irā interpretamur, & $\mu\epsilon\lambda\alpha\chi\epsilon\nu$ multam & efferatam.

Et animi angore) $\theta\upsilon\mu\delta\iota\nu$ lætitia. Interpretis lectio magis probatur, qui legit $\alpha\theta\upsilon\mu\iota\nu$.

Accusanda) causanda, id est causa est.

Rarius autem quàm viri, sed deterius mulieres furiis agitantur) Aliter sonant Græca. Ac viri quidem, inquit, furere &

melancholia corripuntur, aut etiam viris iuniores: sed deterius quam viri mulieres ad insaniam aguntur.

Quotquot enim à naturali statu, &c. Græca habent in hunc sensum, Quæ enim cūque refugiant & auersantur, nondum in malo, prouident insomnij occursum: ad mutandam sententiam faciles sunt, turpes, parci, non munifici.

Melancholicum visum esse) adde quæ interpretis omisit. Hic verò nec amorem in se nouerat: at ubi puella, &c.

In cap. VI.

Quippe & vinum mētem inflamat, & per ebrietatem delirare cogit) nam & vinum in ebrietate ad mentis perturbationem accendit.

Nam repente hæc adueniunt) & celeriter conquiescunt. Temere enim orta, facilius consistūt.

Et viri) & quibus omnium vigor inest.

Quibus obuiam fiunt, non sunt infestis: ita se habet huiusmodi furoris species) posterior pars abundat. Græcè enim est tantum, Non tristis est præsentibus species.

Et obuios quosque male habuerunt)
quæ quidem præsentibus non sine peri-
culo calamitas est.

Monstruosa quædam cogitant) visa a-
liena gignuntur.

Hæc erat inter locum illum, & viri
mentem cognatio) & eadem mētis quæ
loci dilatio erat, id est tantum mentis
habebat, quantum locus protēdebatur.

Altero alterum inuicem lædente) pa-
riter mutuis adiumentis alterum alteri
opitulantia.

Verum præcipua furoris & melancho-
liæ sedes, &c. Verum in infania & furo-
re vis mali hæret in visceribus, quemad-
modum phreniticis magnam partem in
capite & sensibus.

Anxij sunt) fastidiosi.

Neque eos etiam in publico ventrem
exonerare pudet, ad mutua & familia-
ria colloquia pigri sunt) idem lapsus qui
in capite de Satyriasi. Interpret enim le-
git ἀφ' οὗ pro ἀμφοτέρω. adde etiam
quod verbum ὁμιλῶ eum fefellerit.
Sensus enim est, Effrænatus est ad libi-
dinem impetus, vt ne in propatulo

quidem verecundia sit aut eunctatio cō-
plexus.

Quidam immensum spatium decur-
runt, & quo peruenturi sint nescientes)

Quidam effrenatè cursu rapiuntur, igna-
rique eodem reuertuntur: alij longo in-
teruallo se ad suos recipiunt.

In cap. viii.

Si ab externa causa) alias interna.

Genus homines empyj) id genus mor-
bi empye, id est purulentia vocatur.

ἐμπευοι legit interpres.

Angor, fastidium.

Tumida, excarnis) non est in Græco,
excarnis. nam quod vnum exemplarium
veterum habebat κοῖλον, vitiosè repeti-
tum è proximo videtur, & mox sequi-
tur, excarnes sunt.

Buccarum tenuia dentibus inhaerent)
buccæ graciles faciunt vt dentibus pro-
pius admoveantur.

Tenues enim) abundat cōiunctio.

At spina) spina enim.

Porro senes in hoc malum, frequen-
ter non incidunt) exemplaria Græca qui-
bus vsi sumus, negationē non habebant.

Ac

Ac senes quidem, inquit, frequenter hūc morbum patiuntur, & minime euadunt.

Tussi vsq; ad phthisin) vsq; ad phthoē, id est tabem.

In cap. IX.

Grauitas potius quàm dolor) grauitas aut certè dolor.

Quoniam concoctio non fit qualis antea, inde caro consumitur) Concoctio enim antea familiaris abest, & bona corporis habitudo.

In cap. XI.

Materia verò crassi interiūsque abditū humores.) materia verò humidi, crassi, glutinosi humores. Interpres legit *κολωδία*.

Morbi verò incipientis) futuri morbi: vel poti⁹ dilationis morbi, *μελλισμοῦ*.

Multum & frigidum aerem cupiunt) subdiao ambulant) in Græco *ἰπιθυμῖν* dandi casu legatur, aptius erit, hoc sensu, Multi & frigidi aeris cupiditate commoti, in locum subdiao proficiscuntur.

In cap. XII.

Interdum & senes in hanc labem incidunt, & exterriti.) Ea correptis leui mo

Kk

mento ad perniciem opus est) si quando
senes quos facile hic morbo capit, & hor
rore perculsi, eo vel leuiter tententur,
lecto in quo mortem obeant, componan
tur, idest non conualescent, mortem non
euadent, si semel hoc morbo vexati de
cumbant.

In cap. XIII.

Venter squallet) alius sicca est.

In cap. XIII.

Increscere visus est) intumescere.

In cap. XV.

Et sy' uestris mustella species est) Hæc
de suo addidit interpres.

Atque adeo istorum causa & ipsius bi
lis causa est) Atque istorum quidem caus
sa est: ea verò & genera bilis sunt.

Tenuioris generis) omissum, Aut ad li
uidum atrumque vergens.

In cap. XVI.

Siquidem ab omnibus morbis propa
gatur & emanat) Morbus autem in mul
tum tempus extrahitur,

Intestinatorum difficultas adest continua)
Morbus iste parua quædam dysenteria est
cōtinua: nonnullis, morborum reuersiones.

Quando enim horum singula quæ aderant non amplius reuertuntur, tunc sequitur corporis grauitas) Quo tempore eorum singula quæ aderant nulla redeunt. Grauitas corporis adest, &c.

Decumbentibus autem partes decliues atque iacentes) inclinata fœmora, decumbentibus. Interpres pro *μηρία, μόρια* legit. In illas decumbentes partes) in illa, subaudi fœmora.

IN LIB. II. DE DIVTVERNORUM morborum signis,
cap. I.

Si paulum superficiem secueris) si quā partem multum secueris. Interpres legit *επι πολλῶς*.

Si abdomen perforaueris, parum admodum humoris effundes. Ab interiori namque parte vesica occlufit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succ^o emanabit) Nam si abdomine perforato, parum admodum humoris effundis, intus vesica occludetur: at si instrumentum impuleris, iterum effluet.

Kk 2

Nam siue ex intestino colo , siue ex ventre ferantur, qualis sit ipsarum generationis modus , quid dicam nihil certi habeo) neque enim de his quid dicā habeo. Nam siue ex colo, siue ex ventre profiscantur , quis coagmentationis modus sit?

In cap. II.

Itaque potius insatiabili auiditate) legendum, potus.

In cap. III.

Aut si vnus sit magnus , locorum angustiiis intensus inhærescit. Atque si vtroque in rene hæc fieri vsu veniat) Si magnus vnus locorum angustiiis inhærescat & in vtroque rene hæc fiant , interclusa vrina, &c.

Multum sanguinis limum elixatū) à sanguine, Græce est.

In cap. V.

Neque id quod fit) neque geniturae fluor, sensu percipitur.

In ap. VI.

Corde periculosa vicinia ad tenorem animique alacritatem siue abiectiōem ob animæ consensum præcipue stoma-

chi facultas cōfert) cordis vicinia ad te-
norem, animique alacritatem siue abie-
ctionem, ob animæ consensum, interest.
hæc prima est & præcipua stomachi fa-
cultas.

Delectationis hi fructus sunt) volupta-
tem hæc pariunt.

Ore conterere, in deuorando dolor,
& maior conflictatio.) In cibis ore con-
terendis angor, in deuorandis dolor ma-
ior adest.

Quibus molle cubile est nuda humus,
stragula vestis, ignobilis) quibus molle
est cubile humi sine stragulis, vile indu-
mentum.

Diuitiæ autem adeptio atque vsus di-
uinæ sapientiæ) diuitiæ autem, diuinæ
intelligentiæ atque copiarum abundan-
tiæ, vsus.

Non saturandæ famis, &c.) non vt ci-
bis satientur, sed vt vitam sustineāt dun-
taxat: non vino indulgēt, non exhilarā-
tur: non vagantur & obambulant, non
exercent corpora, non fiunt carnulen-
tiores.

Atqui ob stomachum erga cibos male

affectum, cito satiantur cibo vſitato) ſto-
mach^o quoq; iis malè erga cibū affectus
eſt: ac celeriter aſſuetōq; ſatiantur, eoq;
vili & ad manū, quòd variis dapibus nō
ſint aſſueti.

In cap. VIII.

In ieiuno vbi affectus maxime vrget)
in ieiunio, ideſt quādo quis ſe à cibis ab-
ſtinet, quo tempore morbus viget. Ne
quis de inteſtino dictum accipiat.

Propoſiti inteſtini dolor) morbus.

In cap. IX.

Aut potio ryeon appellata) bryteon
videtur legendum, vt ſupra libri primi
cap. 9, quæ potio ex ſlocibus ſeu vina-
ceis conficitur.

Maiora ſunt vlcera) profunda, caua.
Et viuunt) noxæque ſoluti viuunt.

In cap. X.

In iſtis enim calidum quandoque re-
frigeratum eſt, &c.) Si enim quod in iſtis
eſt calidum refrigeratum neque conco-
quat, neque ad diſtributionem incite-
tur, ſed præ imbecillitate retinere non
poſſit, omni cōfectione alimentum de-
ſtituitur.

Sed leuis mouenti) legendū, leuis mo-
menti.

Et malus habitus qui decumbere non
cogit) & malus habitus quem quis se eri-
gendo ac stando comparauit.

In cap. XI.

Anxietate vexantur) fastidiosæ sunt.

Minime autē puellis, quibus magis al-
bi nocent) puellis vero minime albi no-
cent.

Quod si altius penetrēt, &c.) Si verō al-
tiora fiant, & vlcerum ora immitia sine
& aspera, sanies quædam tetri odoris, &
maior quàm antea dolor existit. exedit
autem vuluam vlcus.

Si grata odoramenta naribus subi-
ciat) vt grata odoramenta olfaciat.

Et prius remedia mitigatoria, &c.) &
antē mitigatoriis vterinis oblinatur.

In cap. XII.

In capite feruntur) abundant hæc ver-
ba, in capite.

Viri facilius in hunc morbum incidūt,
& ex mulieribus agiliores) viri vt faci-
lius in hunc morbū incidunt, ita mulie-
ribus leuius torquentur.

Auari) munifici.

Tanquam mortem rursus subituri) tā-
quam iterum mortem euasuri.

In cap. XIII.

Facies fœdas) ignobiles & obscuras.

Cum musto reiecisse, quoniam in mu-
sto fera extincta fuerat: iterumque, &c.)
cum musto reiecisse. Postquam autem
fera in musto extincta est, auidè largi-
terque hominem è musto bibisse.

IN LIB. PRIMI DE CVRA-
tione acutorum morborum,

cap. I.

At si vltra conueniens tempus, vtpu-
ta sexto aut septimo die superueniat, venæ
sectio dimittenda est. multo enim ante,
&c.) At si vltra conueniens tempus, vtpu-
ta sexto aut septimo die accedat, multū
ante iudicationes in acutis morbis va-
cuandum, aut pharmacis vtendum, &c.

Aut succi ad amaræ fabæ magnitudi-
nem ex aquæ cyathis duobus) aut amari
succi cyathum cum aquæ cyathis duo-
bus. Interpres pro *ἡνάθου πικροῦ*, legit
ἡναρόν πικρόν.

In cap. ii.

Herba verò mercuriali assidue vti-
tor) cum herba verò mercuriali conco-
quito.

Manus ad humeros vsque, &c.) Manus
ab humeris vsq; pedes itē ab inguinib⁹.

Sic enim magis flatus digerit) cum
his verò magis quoque flatus digerit, si
hæc adiungantur, & terebinthinæ resi-
næ pars vna.

Sed pruritus & dolorem non gra-
uem) sed pruritus doloris expertem.

Quale est cyprinum, aut gleucinum,
aut Sicyonium) aut cyprino, aut gleuci-
no, aut Sicyonio. ne ista medica mento-
sa putes.

Imperitia enim timoris & cautionis
causa est) timor enim & cautio imperi-
tiæ causa est.

In cap. iii.

Nutricatio & vètris calefactio) nutri-
catio & calefactio, ventrisq; humectatio.

In cap. iiii.

Exanimes sunt, quorum & corpus &
mēs stupet &c.) in totum enim mortem
præseferunt, si & ægrotus senex sit, qui-

bus familiaris morbus est. non enim liberantur, tum propter mali magnitudinem, tum propter ætatis calamitatem.

AEgrotis verò id inutile est: illæ autē inhærentes corpori in colliquatas partes à calore sorbentur.) id verò laborantibus inutile est, si corpori inhæreat, inque partibus colliquatis, & à calore sorbeatur.

In cap. V.

Id intra anum intrudítro) lege intrudito.

In cap. VI.

Fouenti sunt) lege, fouendi sunt.

In cap. IX.

Porro igne vitium adurere, cum in superiori parte sit, imprudentis esse propter isthmum iudico) Porro igne vitium adurere, subleuat: at imprudenter id fit propter isthmum.

IN LIB. II. DE CVRATIONE acutorum morborum.

cap. I.

Repletioque pulmonis) inflatio seu tumefactio. verbū etiā significat ardorem.

In cap. II.

Gummi etiam cum planta porri & spinæ lachryma) gummi etiam cum planta, porrum, spinæ lachryma.

In cap. V.

Oleum bibat) adde, multum.

Et ipsarum succus itellinæ aqua potui detur) & ipsarum aut tellinæ succus, aqua potui detur.

At si dolor absit) at si pus absit.

In cap. VI.

Hirundines quàm scarificationes) scribe, hirudines.

In cap. VII.

Exercitatio modica) gestatio parua.

In cap. VIII.

Si pauperes agroti sint) melior alia lectio, ἀπὸι, id est si pus abest. sequitur enim, Si ad pus vergat.

Quæ bistimus appellatur) Bistimus medici cuiuspiam nomen videtur huius medicamenti auctoris, ut sit legendum, quæ Bistimi nuncupatur. nisi mauis legere Bistini, cuius confectionis multis locis Arateus meminit.

In cap. ix.

Vnde mars cum maximis cruciatibus
miseris mortalibus ingruit) erat mors,
vbi, mars, reposuimus. Locus est quidam
ex Homero.

In cap. xi.

Locus inter fœmina & inguina ple-
chada Græci vocant) & locum inter
anum & scrotum (perineos Græce dici-
tur) Abundat sententia posterior Græce
enim est τᾶν καὶ πλεονάζον, quam
vocem quidam interpretans ad margi-
nem adnotarat, τὸ περὶ οὐ: quod inter-
pretem fecit.

IN LIB. PRIMI DE CV-
ratione morborum diuturno-
rum, cap. II.

Verum non semel totum detrahere,
&c.) maxime verò conducit, non semel
detrahere, si & vires copiosam sanguinis
detractionē patiantur, & in his ipsis con-
tinerent morbus altius radices agat.

Alio loco descripsimus) describemus.

In cap. iiii.

Vena cubiti recta, &c.) vena frontis recta secanda, aut quæ vtrunque ad angulos nari circumponuntur: cucurbitula vertici affigenda, arteriæ secandæ: caput radendum.

Ad magnitudinem amæ, idest placentulæ) ad magnitudinem hamæ, quod instrumenti nomen videtur. si placentulâ significasset, ἄμμος, opinor, scripsisset.

Mentem labefactat) mens facile perverti potest.

Sed rectæ & longæ & lenes ac superioribus locis exercitationes fiant) sint autem ambulationes rectæ, longæ & lenes. Interpres pro οἱ περὶ παρὰ legit ἐνδὲ παρὰ.

Si quidem ita assueti sint, optimum panem solum assumant) si quidem ientaculum assumere sint assueti, pane solo contenti sint.

Salsamentum recte conditum) salsamentum tempestivum, & veris tempore conditum.

in cap. V.

Ipsæ naturæ prædium est atque ali-

metum) praelium malè erat prius.

In cap. xiii.

Illud purum syncerumq; sit) puri tum
syncerique sint.

Asari radice) adde, phu.

IN LIB. II. DE CVRATIO-
ne diuturnorum morborum,

cap. VII.

Vomitibus ex radiculis vtitor) à radi-
culis, seu ab esu radiculorum.

In cap. xiii.

Cum vini Cretici cyathis duobus) cū
vini diluti ac temperati cyathis duobus.

Quod genus avis est, &c. ad eum lo-
cum, Simile) verba sunt interpretis.

Simile enim in dissimili) Simile enim
vnum dissimili, &c.

IN RVFFI LIBRVM PRI-
mum de partibus corporis hu-
mani. cap. viii.

Quos nonnulli cranteras appellant)
Hæc verba huc pertinere non videntur,
sed subiicienda his, Ab vtraq; parte vnus
est. Ex Polluce.

In cap. ix.

Quæ & ligula) lege iugula.

In cap. XIX.

Meditullium diploen nominant. vbi
verò nasi initium, eius crebra ibi fora-
mina ithmoide) meditullium, vnde na-
sus inchoat, diploen nominant. cuius cre-
bra foramina, etmoide, &c.

In cap. XXXIII.

Omnes verò magnæ venæ ventres ap-
pellantur) cauæ appellantur.

IN LIB. II. cap. VIII.

Pinci nuclei effigiē adeptus) forma ro-
tundus. πυγιοειδής; interpres legit.

Hæc cursim Latina cum Græcis cōiun-
gentes obseruauimus, h'cque adnotau-
mus, non vt aliquid interpreti bono de-
traheremus, cuius meditatio docta non
mediocriter nobis in edendis Græcis
profuit, sed vt ipse his pauculis admoni-
tus, in studiosorū gratiā dū vitā super-
est, op' regnoscat, & melius quàm qui-
uis alius, inchoatū opus tandem absolu-
tum emittat.

E S V I D A.

Ruffus Ephesius medicus, temporibus
Traiani cum Critone vixit, eius plurimi
libri feruntur, ex quibus & hi sunt, De vi-
tus ratione lib. 5. De nauigantium vi-
tus ratione 1. De vulnificis medicamē-
tis 1. De membrorū contusione 1. De fi-
cis 1. De antiqua medendi ratione 1. De
lacte 1. De melle.

529
R V F F I E P H E -
sij de vesicæ renumq;
affectibus.

Singulatim perscribā
morbos omnes, q̄ ve-
sicæ, & renibus inna-
scuntur: eosq; vt præ-
scire & medicare con-
ueniat. Ac in renibus
quidem haud temerè vnquam pera-
cuti morbi obueniunt, tam exitiabiles
tamen, alibi quàm qui maxime: siquidē
hulcera inibi coalita, & suppurata, pro-
cessu temporis exitio compluribus ex-
titerunt. Nam licet renes, cū inflam-
matione tentantur, peradmodum do-
leant, non tamen morbus acceleratur:
vesicæ vero inflammationes acutiores
sunt. his enim laborantibus promptius
cōtingit urinas intercipi, febricitare, de-
lirare, & multa itidem euomere mera,
& impermixta. Acutiores etiā sunt reli-
qui vesicæ morbi. namque perniciosior
Ll

locus est, qui que cum primum ab infan-
tia morbis solet esse obnoxius, atque a-
cutis ad modum. Renum vero dolori-
bus citius & grauius vexantur senes,
quam iuuenes. Communiter autem omnia
renum, ac vesicæ vitia, tractatu morosa
sunt, præsertim si hulus insuper acces-
serit. Latium enim continenter influens,
vnà extimulat, & ad cicatricem perducere
non patitur. Quæ huiusmodi cum sint,
& prædiscere, & curare oportet.

SIGNA RENVM LABO-
rantium inflammatione.

INflammationis renum notæ sunt, do-
lor infra lumbos, ut incedendi, aut eri-
gendi sui, egrotis potestas negata sit: & si
steterint, aut quocunque modo succu-
tic ontigerit, continuo lamentantur, &
reclinati in vêtrem non sufferunt, resu-
pini dolore videntur non nihil releuari.
renes enim lumborum teneritati conti-
nentes sunt & proximi. Porro cuius
hunc in modum affecto tolerabilius est
placide iacere, atque acquiescere. Nam

DE MORB. VES. 51

corpus inclinando, dolor ingrauescit
cruciatusque cum cæteras partes per-
meât, tum hepar supernum afficiunt. re-
nes nanque magnæ venæ communione
illi malum suum communicant, præser-
tim si horum dexter inflammatione ten-
tetur: est enim hic ipse ieceri propin-
quior, & eius particulam, & segmentum
attingit: sinister verò paulo remotior,
& demissior exiit. Alij verò dolores ve-
sicæ vsq; & genitalia protenduntur, & ij
quidē continui, sed dissipati lumbos, cru-
ra, & ilia exagitant. A Egrotantibus inte-
rim extrema frigent, tibiæ, & pedes præ-
cipuè. meūt assiduè, & difficiliter: prin-
cipio tenuia, & aquosa: inualecente ve-
rò phlegmone rubicundiora. Et cum eò
status progressum est, femora & clunes
extenuantur atque gracilescent, tibiæ
debilitantur, & quibusdam suppurantur
renes. Nam bona ex parte ita finiuntur.
sed de suppuratis paulopost tractabitur.

LI

CVRATIO PHLEGMO-

nes.

INflāationibus ita medēdū: aegroti in-
lecto cōponēdi sunt quā mollissimē &
primū diem absque cibo tolerandi. Non
tamen sicut in aliis inflammationibus,
conducunt extremę inedia: sed aliquid
assumendum potius, obseruando cum
se febres intenderint, & quando relaxa-
rint. Nec tantum illis profunt ieiunia,
quantum nocent morsus intemperati' lo-
tij. Primis autē diebus sustentandi sunt
forbitionibus dilutis, & aquæ potu. mul-
so verò eos abstinere oportet, nisi iam
tum vrinas ciere consultum sit: quod ini-
tio fieri mihi non probatur, antea quā
liquido constet, dolores esse sopitos: quo
tempore equidē per vrinas purgare ope-
ræ precium fore iudicari.

DE CLYSTERE.

QUod si aluus vacuandus sit, nihil tale
moliri oportet, quale illud vacuan-
di genus, quod medicamentis inuentū,

atque excogitatum. Eluenda tantum est iniecta aqua calda, aut maluae, aut lini, aut silicia decocto, cui olei admixtum sit, quantum usus exigit. Nec vero ita magna copia immittenda est, ne intestina completa renes comprimant: subducta aluo si necdum concedat dolor, lannam oleo calido delibutam circumpones, atque illic residere patiêre. Nec absere fuerit, rutham, hibiscum, anethum, & artemisiâ oleo incoquere.

DE VENAE SECTIONE.

Acrius ægrotantibus, vena secundum cubitum secanda est, & si quid inflammationis reliquum sit, emplastra illinenda sunt, primum ex farina mulso incocta, aut telino. Postea admiscere conveniet chamæpytij, polij, abrotoni, vitis nigrae, ruthae, absinthij, centaureæ, artemisiæ, & trissaginis folia: adhæc asari, & iunci odorati. Tum non amplius emplastra mulso incoquere, sed musto, aut vino melitite, adicere etiam cū superiorū aliquo, farinæ duplum, paulò plus etiâ,

si quis efficacius cupiat, admixta cera
sicca, & contusa. Benefacit præterea hoc
Chryssippi emplastrum, quod ita confici-
tur: Galbani, resinæ terebinthi, polij, fa-
rinæ erui, singulorum pondo drachmæ
quingenta, iridis siccae sicilique duo,
cerati suauiter olentis hemina, farinæ
tritici sextarij dimidium. Hæc musto
decocta illinito, nephriticis quidem po-
nè: ante verò vesica laborantibus. tum si
nec emplastris cruciatus lenietur, admo-
uendæ sunt cucurbitulæ tum lumbis, tū
partibus infra ilia, & scarificatione san-
guis detrahendus. Postea adhibenda sunt
fomenta ex spongiis, faciendumque uti
æger supra aquam caldam desideat, in
qua papauer, anthemida, harundinem,
iuncumque coxeris. Ceterum prius im-
pletis oleo, & aqua vesicis, reclinandus
erit, fouendusque molliter, & delicatè.
Postremò his locis superponere profi-
ciet tum cerata ex cyprino oleo, vngue-
to rosaceo, tum malagmata odoris sua-
uitate quàm iucundissima.

DE MORB. VES. 139
CONTRA VEHEMENTES
cruciatus remedia.

CUm dolores infestant, hæc medica-
menta ebibenda sunt: seminis fœni-
culi grana vicena, opij, aut panacis her-
culei radicis sesquiscrupulum, fertulæ
campanæ momentum, cedriæ, & scapi
papaveris exustulati semiobolus, styra-
cis tantundem, apij quantum tribus di-
gitis comprehendi potest, meconij quan-
ta est erui magnitudo: horum vnum-
quodque subtilissimè tritum, ex aqua
dulci potandū exhibeto. Actutum enim
iuuabit, quantunus dolor sæuiat, &
mollis somnus obrepet. Postea cum tem-
pestiuum esse videbitur, his rebus partes
tradentur quæ vrinas mouent.

DIVRETICA NEPHRY-
ticis.

HÆc sint quæ vrinas ducant: apij ra-
dix, chamæpitys, casia, meum, cina-
momum, polium, petroselinum, & grā-
men: hæc in aqua coquenda sunt, & cum

℥ 4

vino, aut mulso propināda. prodest etiā echinorum marinorum esus. Inter ole-
ra fœniculus, apium, daucus, raphanus
discoctus, & agrestia omnia vtiliter as-
sumuntur. belle enim excitant meien-
di voluntatem: & comprimis pastinaca,
crithmum, scandix. Actalibus expectan-
dum vrinas copiosas & crassas fore: atq;
eisdem pulchrum quod subsidit: quod, si
quod aliud, morbum diiudicat. quæ ve-
rò aquæ, puræ, & perspicuæ redduntur,
iudicandi sui maiorem afferunt difficul-
tatem.

SVPPVRATIONVM ET inflammationum sanatio.

INflammationes hoc modo perbenè
quis curarit. Porro quibus suppurati
sunt renes, iam ilia intumuerè, & renes
ipfos vehemens ardor incessuit, fulua, &
temperata meciunt. nec iam tam acres
sunt cruciatus, quàm antea, ceteroquin
grauiores, & pulsantes: febres non statæ,
sed erraticæ, atq; horridæ. Illis suppura-
ta vt plurimum in vesicâ erumpunt, quæ

rupturarum est potentissima. aliquando in intestinum abscessus rumpitur, ibi se alleuante purulenta materia, & putrescente. Praxagoras referebat visum sibi quendam, qui per sedem urinam excreuisset, superuixissetque annis duodecim. an ne etiam pluribus, quod tunc temporis ipse discessisset, nec de eo quicquam audisset postea, ignorare. Sunt alij quibus abscessus collectio extrorsum abruptur, & iliorum cauernas peruadit, quas pure, & lotio cōpleri necessum est, ibique illuuiem adharefcere: deinde progressu temporis in anum extrudi, atque illac foras tendere. Nonnullis verò extra renes frangi cunctatur, & illic ad multum tempus remanet vsquequo exuratur, aut quocunque modo se discindat. Quibus autem in vesicam effunditur, illi principio mucosa, & cruenta meunt, instar apostematis excisi: deinde pro vlcerum competentia, atque ratione. Nam si malignè exasperentur, vt in aliis hulceribus putrescētibus vsituenit, multa redduntur foetida, liuida, & mucosa, atque etiam quædam ca-

runculae oblongae, similesque membranis absistunt. si hucera maligna non extiterint, pus album, & aquabile, sine graecolentia, & copia paucum excernitur. Iam vero si ren ad suppurationem inclinare videbitur (videbitur autem praedictis signis) maturum est, quoad eius fieri potest, insubide atque diligenter, & ita viam quendam moliri atque comminisci ad puris exitum, quod saepius in vesicam diuertitur. Proinde spongiis identidem fouere oportebit, & locum farina hordeacea, cum ficuum decocto oblinere: verum ficus easdem in mulso aut vino decoquere consimiliter oportebit. Bonum erit etiam ficus ipsas tenuando, & diducendo admiscere: & comam tusam absinthij quin & chameleae, iridis, bryoniaeque radicem excretam. Haec siquidem tum mitificant, tum urinas prolliciunt. Expedit autem mingendi facultatem provocare. Ideo agroti erunt inuitandi, ut aliquid horum bibant quae urinas cient: ad quem usum accommodatissimum erit amerinae semen ex vino aut mulso potum. Conferet quoque

DE MORB. VES. 539

ferulæ radix, & anchusa, & arum, siue
vnumquodque per se datum, siue cū vno
horum aut altero permixtum.

DIVRETICA QVAE AB-
scellus frangunt.

Prodest etiam illud: Origani, & dauci-
sextarium, pseudodictami eandem
mensuram in vinum album, odorūq;
coniicito atque recondito. Cum verò
necesse habebis, fumes cyathos quatuor,
& affuso aquæ dimidio, permixtāque
drachma ex folliculis ruthe subtilissimi
pulueris, propinabis. hoc pus educet, &
vrinas copiosè. Si tamen omnia tentan-
ti labor frustrā cesserit, necdum ruptum
sit empyema, clysteriis acribus ventrem
eluere oportebit. Constant autem ex ve-
ratri nigri diluto, in quo etiam perma-
duerint raphan^o, allia, & pulpa colocyn-
thidis. licebit quoque in muria, vel aqua
marina, vel aceto macerare: tum pauco
oleo admixto, vt lubricum sit, his rebus
aluū perfundere: iuberéq; vt quān pote-
rint diutissimè retineant. Eo sepe puru-

lenta collectio frangitur, & consanescit: nihilominus tamen, spongiis usque fouere conuenit, & emplastra inducere, ut dolor omnis minuatur, & pus ex facili profluat.

QVAE MOVENDO VRINAS vlcera detergant.

Danda itidē sunt quæ per urinas purgant, hulceris habita ratione: quod si tractabile sit (id autem denotant febres, & dolores leuiore, & quæ in urinis apparent æquabilia, alba, & inodora, cum facilitate miendi) mitiora exhibeantur. Cuius generis sunt peponis semen, palmarum decoctum, iris excepta melle, & ipsum mel per se. Et si quis valētius purgare volet, usurpet capilli veneris decoctum cum aqua mulsa, galbanum, opopanacem, resinam terebinthi: tum in aqua liquefaciat, atque ubi aqua referbuerit & substiterit, percollet, & ex mulso, aut vino bibendū exhibeat. Hæc quidem hulceribus minus morosis atque difficilibus auxiliantur.

CATAPLASMATA HVLCE-
ribus putrescentibus.

ADuersus maligniora hulcera valen-
tioribus opus est, & intro assumptis,
& foris admotis: intus quidem, quæcun-
que iam dicta sunt ad rumpendas colle-
ctiones conuenient, Et cum inũ AETHIO-
picum cum vino dulci, rutha cum mel-
le & vino, canchrys cum semine porri
ex vino molli & delicato. Extra verò
proderit erui farinam in vino & mel-
le coctam illinere: & rosas aridas tritas-
que cum lente & melle, aut baccas myr-
ti alicui horum incoctas. Quippe hæc &
id genus omnia hulcerum putredines
inhibent: verum oportet totos lumbos
& ilia perlinere. Bonum etiam aliquod
medicamentũ iniicere eorum quæ dy-
senterica appellantur, si vehemētius de-
pascatur hulus: si verò præ dolore &
inflammatione pus foras prodire nõ po-
test, abluere oportebit tenui cremore
ptisanæ, & lacte, & huiusmodi tepida fo-
menta adhibere, & supra aquam tepidã
sedentem collocare. Ita enim percom-

modè exierit. At si propter crassamentū retardetur, bibendum decocturam apij chamapityj, absinthij atque origani. hæc taliter facienda sunt.

DE LACTE.

Postmodum bibendum lac cum melle, cū primis asininum aut equinum. Siquidē eius magnus vsus est ad hūlcerū mundiciem. Quando autem nihil amplius repurgari indigebunt, & pauca subluuies effluet, morsusque vrinarum retundentur, atque homo corpus recuperare & pinguescere laborabit, tum lac bubulum citius quàm ouillum obtuleris. Crassum enim magis, & minus fluidū. Dabitur vero ad duas, tres, pluresue heminas. Nec cibi quicquam præterea ingeretur, quoad sumptum hoc percoctum sit & mitificatum. Quin immò serum ipsum lactis tum intestinorum hūlcerum efficacissimum est remedium, tū grauitè manantibus hūlceribus mitissimum accidit, & sub manu corpus alit: maximè in syntecticis, hoc est defectis

DE MORB. VES. 543

& quasi strigosus, quorum plurimi interest, ut ad habitio-rem corpulentiam quam primum reducantur. quapropter siue hac victus ratione, siue alia procures, uti nephryticus pinguescat, nihil aberrabis. Itaque cubantem & molliter fricare, & quotidie expediet: alere autem, initio lacte ut dictum est, & sorbili ptisanario, amyliis panibus, farina elota & incocta lacti ac placentis, suminalibus confractis in capi iuscula pingua. dabis etiam pulmentaria ex ciceris, phaseolis atque eruis. sed eruum prius oportebit, ut ita dicam, edulcare, hoc est macerare ut amarorem deponat, & per se decoquere, aut cum aliquo dictorum leguminum.

DE OLERIBVS.

OLera conuenientia his de quibus agitur, malua, lapathum, blitum, portulaca, asparagus, cucurbita, coctus cucumis, & lactuca cocta: prodestque nihil crudum comedere. Hæc autem & ventrem leniter subducunt, & hebetant vrinarum acrimoniam: atque in processu iam ad

plenum extinctis febrium ardoribus, & corpore refeito, carnibus cibare oportebit.

DE CARNIBVS.

Carnes in hoc morbo laudo hœdorũ, agnorum, carnem suillam probo, aues tenellas, ex piscibus saxatiles coctos, quin & squatinas, raias leues, torpedines, & cætera id genus cartilagineorum.

DE SECVNDÆ MENSA.

ET si quid in lōgo morbo bellariis op^o sit, à carycis abstinendum. hūlceribus enim aduersantur. vescendum verò palmis, nucibus auellanis, strobilis & vua passa: amygdala etiam tosta danda sunt ex melle, vinumque bibendum mellei coloris. Acetum autem atque omnē salflaginem, in poculentis atque esculentis iuxta, vitare oportet. Hæc igitur sunt eorum quibus renes dolent pulmenta & edulia. Quod autem ad reliquam vitæ rationem attinet, confert minimè festinatem, sed tardè atque ociosè eos ad exercitia

ercitia motusque, produrere. namque agitatio cum aliis exulceratis omnibus, tum renum hulceribus vehementer est inimica. conducit igitur quietum reficere atque recreare omni vitæ mollitie voluptuaria, frictionibus quàm leuissimis, balneis & integumentis.

QVÆ VOMITIONEM excitant.

R Epletionibus subortis faciet satis illasque leuabit fatus per sicca & vomitus: per inferna vacuare vel detrahere nihil est necesse, præterquam dictorum ciborum quotidiana retrimenta: ac ne impendiò mouendo crucietur, impera vt intra modum repleto vètriculo vomat, assumpto etiam eorum aliquo quæ nauseosa sunt & vomendi appetitionem mouent, cuiusmodi sunt pinguia & dulcia & prægrandes cucumeres: qui si non sint ad manum, substituantur eorum semina melle intrita, & pulicula: potusque dulcis super his ingestus largiter: nec solum aduersus saturitates & expletiones

Mm

vomitionem commendo, sed etiã mihi videtur (si quis fortè periclitari audeat) vomendo sæpius, non modo renum hulcera, verum etiam eius loci vitia omnia breui posse consanari. postmodum autẽ cū vsque adeo processum erit, vt iã ex morbo reualuisse compareat, & motiones salutariter posse perpeti, primum spatium poterit paulatim & modicè, idque per planitiem: status verò fugiet, cursus, saltationes, subitãsque declinationes, & inflexiones corporis: deinde quo firmior & valentior in dies euaserit, eo plus deambulationibus exercitationibusque aliis licebit apponere. Alia exercendi sui genera sunt, colluctationes manuum, frictionesq; leui attactu & manu suspensa. Ea quidem est in nephriticis viuendi præceptio: nunc si suppuratio foras eruperit, an etiam manus tractatione atq; opera vtendum sit nec ne, luculenter apparet. Antiquitus suppurata inurebãt, aut decacuminabãt, hoc est scalpello deputato fastigio rescabant vt pus proflueret. *

547
EIVSDEM AV-
ctoris fragmentum

DE MEDICAMENTIS
purgantibus.

* Et soboli procreandæ conferre videtur.

Filicula pituitam, bilem aquasq; detrahit. danda excepta mulso aut aqua, rasa radix, ad drachmas duas. Non minus est salubre bullitam ad salgama, siue cum salsamento, ante prandium comedere. purgat item non molestè cum ptisana & cum iure avis domesticę decocta: bella fuerit purgatio, vt quæ adolescentibus etiam satisfaciatur: in morbis vero nihil tãta purgatione opus est.

Iris quidem pituitam, mucosa excrementa, atq; etiam biliosa deducit: quin & sanguinem, & melancholiam trahit, si præter modum dederis. Quare sola vt mediocriter purget, cyathi dimidium sufficiet. admodum enim stomacho est ingrata. Radicis vero dandæ

Mm 2

drachmæ (7) in mulso, lienosis, quotidiana & quartana febre laborantibus, anhelatoribus, tussientibus, & colicis.

Colocynthis pituitam purgat, & bilē meram. Eius pulpæ danda est drachma vna in mulso: si quis tamen mitius purgare volet, semen eiiciendum est, & affuso vino dulci intra corticem, lento igne coquendum, quousq; rectè incaluerit, tum his propinandum offeratur, quos non potenter exinanire cōueniat, & quorum cutem liuidæ papulæ deformarint. In totū verò colocynthis prodest suspiriosis, laterum doloribus, inueteratis capitis cruciatibus, singultibus, & aduersus obtusam aciem oculorum. Et si enim oppido quàm amara est medicina, tamen in posterum efficit, ut illis sit vsus cibi gratior.

Calcifraga aquosa, pituitosa, biliosa, & que vacuat. drachmis duabus in mulso pota sufficit.

Peplos & peplis gentilitate & figuræ cognatione proximæ, in purgando pituitam, & bilem extrahunt cum flatibus pro copia: siccata etiam benignè purgāt.

Aloe celeriter purgat, nec vero ut ab-
sinthium gratissimū est stomacho. eius
duæ drachmæ cum mulso potæ, suffi-
ciunt. pituitam & bilem attrahit. Bonū
consimiliter quotidie eam assumere à
prandio. humores siquidem permeat &
subducit, nec cibi digestionem abolet.
præterea non siticulosum reddit, sed fa-
melicum. terere autem oportet cū bra-
sicæ aut lapathi succo, & formare ca-
tapotia partim ciceris, partim fabæ ma-
gnitudine: & cum exinanire collibuerit,
duo aut tria ingerere. Cōuenient etiam
eius globuli cum resina apparati, aut cū
melle cocto, eorum causa maximè quæ-
bus intolerabilis est amaritudo. *Quin-*
etiam scāmonio vtiliter admiscetur, aut
corū alteri quæ stomachi dissolutionem
faciunt præterquam quòd febres quoti-
dianas sanat, arquatis, & iocinoris vi-
tiis subuenit: cibi fastidia & cruditates
emēdat in hominibus, & perinde in mu-
lieribus. fuissetque optimum medica-
mentum pueris, nisi amarum esset supra
modum. puerilis enim ætas à rebus vsq;
adeo amaris vehementer abhorret.

Mm 3

Hippophaes & hippophæstum pituitam, bilem, aquasque purgant largiter: hippophæstum aquæ vitia. Præcipuè comitialibus datur, syderatis altera manu, aut crure, obliuioſo, diſſiciliter ſpiranti, & his qui rectà ſpirare coguntur: adhuc his omnibus quos perpetuus variuſque tremor exagitat. Si valétius purgare vo- lueris, dabis ſucci per ſe obolos tres: ſin- autem ex eo quod cum farina erui cō- ſicitur, drachmam vnam ex mulſo. ſed omnia efficacius hippophæstum: ideo dandum minore copia.

Clematis pituitam & bilem purgat. eius fructus ad drachmā vnam exhiben- dus eſt cum mulſo.

Pycnocomum bilioſa detrahit. eius radicem comedendam dato. ipſa enim per ſe purgat, rotunda eſt, exiguo malo admodum ſimilis.

Vites purgant tum bilem, tum pitui- tam. Dantur drachmis duabus. ſatiuæ uſus eſt inſignis contra morbum cadu- cum, & inſaniam: ſylueſtris vero ad a- quam intercutem.

Thymus, epithymum, amaracus, &

DE PURGANT. 551

cunila, bilem atram pituitamque purgant: sed ad omnia plus potest epithymum. tritum & cretum dandum est in vino dulci, semunciae cum siciliquo mensura, aut etiam maiore. Egregie enim humores trahit. ac si à medicamento statim prandere velis, nihil iustam purgationem impedit: manè vero purgare oportet cum oxymelite sale adiecto. Cōfert etiā epithymū inflationibus, & interaneis morbis, crudis, & his quibus hepar, aut liē pregrauatur, atq; etiā difficiliter spirantibus. Thymus detrahit melancholiam, & pituitam affluenter. Comē eius acetabuli mensura cum melle danda suspiriosis, tussi inueteratæ, & his qui humores crassos in ventriculo continent.

Amaracus siccus drachmis quatuor melle exceptus, admixto sale, eandem vim habet: similiter & origanū. Danda sunt sicca acetabuli mensura cū mulso.

Papauera leniter subducunt: seminis vtriusque sufficit acetabulum in mulso.

Cucumeris radix epota facit ad aquā inter cutem: purgat pituitam & bilem:

verum succi ex radice satis est trium
obolũ pondus • corticis triplum : elat-
yrij quantum paulo post.

Heliotropium minus, quod tricoccũ
dicitur, pituitã purgat, purgat & bilem.
satis facit manualis fasciculus deco-
ctus moderatè ex aqua, & potus affuso
vino.

Sesamoides minus pituitam quoque
& bilem ducit: seminis mensura aceta-
buli dimidium.

Tithymalus helioscopios (est autem o-
mniũ esularũ imbecilimus) detrahit etiã
ipse biliosa & pituitosa recrementa, siue
succum, siue semen, siue folia dederis. est
tamen succus efficacior, secũdo loco se-
men, extremo folia. Succi vero drachmę
pondus satis est. Ex aliis detur quantum
vires ferunt. Purgat itidem cyparissias,
sed cum maiore efficacia, idcirco minus
dandũ. Inter esulas quę esula propriè di-
citur, potentissima. nam seminis si solum
expressum succũ intra carycam dederis,
purgabit insigniter: folia perinde, per-
arida, & mulso soluta, quanta est semis
se minus mensura acetabuli.

Chamelæa pituitam, bilémq; vacuat. folia terere oportet, & melle cocto exceptâ exhibere: acriter enim mordet. nonnulli abfinthiū admiscentes, in catapotia digerūt. pōdus idoneū drachmę duæ. Brassica marina, vt cętera olera cocta & cōdita estur: stomachūq; pessimē subuertit, & celeriter perturbat.

Lathyreos comesta grana decem faciunt satis: gustatu dulcia sunt, & pituitam, & bilem affatim detrahunt. sufficiūt etiam succi ex mulso liquati, terni oboli. folia etiam licet ad eundem vsū in fculo gallinaceo incoquere. aluum siquidem subducunt: sed non cum tanto successu.

Agaricum pituitam bilémq; deducit, sed segniter. vtilissimum est hepati, lien, pulmonibus, anhelatoribus, acidum ructantibus, & his qui articulorum morbo, & capitis grauedine vexātur: conuenit etiam singultibus, morbo caduco, & mulierum doloribus. pondus est sicilicet ex mulso aut posca.

Euphorbium aquosos humores, biliososque detrahitis. R. C. F.

INDEX EORVM QVAE

in Aetii & Ruffi libris

continentur.

A.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Abdomē 422, 460 | ancon 419, 458 |
| acetabulum 425 | ancyroides 487 |
| achichadaron 423 | angina 12, 259 |
| acini 420, 458 | anguli 454 |
| acromiū 418, 458 | anhelitus 119, 122 |
| acromphalon 422 | anthelix 414, 455 |
| adenes 158, 435. | anthereon 454 |
| 482 | antiades 417, 470 |
| adeps 445, 482 | anticari, n 418, |
| AEgyptiaca vlce- | 457 |
| ra 19 | antilobis 414 |
| AEgyptij medici | antisternon 417 |
| 428 | antitragus 455 |
| ala 419, 458 | aortæ 434, 443, |
| aluus 422 | 444 |
| amnios 448 | aphthæ 19 |
| amphidion 440 | apoplecton 93 |
| anagoge 33, 35 | apoplexia 99, 242 |
| anæsthesia 59 | apostematia 111 |
| anasarca 124, 147 | aqua intercus 146 |
| ancistroides 487, | aqualiculus 422 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| aquilæ | 442 | Blepharides | 410 |
| arachnoides | 433 | bilis conceptaculā | |
| aræa | 436 | | 472 |
| aranealis | 468 | bilis atra | 446 |
| Aristotelis locus | | bilis flaua | 446 |
| 417, 444 | | brachiō | 457, 458, |
| arquatus | 133 | | 488 |
| arteriæ | 443, 482 | bronchia | 118, 434, |
| arteria aspera | 457 | | 475 |
| arthritidis | 196 | bronchus | 418, 457 |
| articulorum mor- | | bubones | 44 |
| bi | 393 | | |
| aruspices | 437 | C. | |
| ascites | 147 | | |
| Asclepiades | 483 | Cachexia | 140 |
| aspera arteria | 418 | cacochymia | 365 |
| assessores | 438, 480 | calculus | 159, 164, |
| asthma | 119, 203 | | 384 |
| astragali | 425 | calx | 426, 462 |
| Athenarum pesti- | | cauini dentes | 416, |
| lencia | 14 | | 456 |
| auriculæ | 455 | canthi | 411 |
| aurigo | 133 | caput | 410, 452 |
| | | cardiaci | 297 |
| B. | | carotides | 70, 444 |
| | | cartilago | 422, |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------|
| 444,460,482 | Clitarchus | 440 |
| eatheter 488 | clitoris | 424 |
| cauernæ 434 | clitorissare | 424 |
| causus 47,62 | clunes | 425,461 |
| ceneones 425 | coccyx | 425,461 |
| cephalæa 79,339 | cœca foramina | 430 |
| cephalalgia 79 | cœcum intestinum | |
| cercis 488 | 477 | |
| cerebrum 431,44, | cœliaci | 175,390 |
| 457 | cœlum | 17,456 |
| cervix 418,437, | κειλοειδῆς | 411 |
| 456,457 | colici | 178 |
| cerumina 136,446 | coles | 423,460 |
| chartæ 452 | collum | 418,437 |
| chelæ 411 | colli vertebræ | 433 |
| chemosis 412 | colon | 54,436,437 |
| chiasmus 201 | 477 | |
| chiragra 196 | columella | 456,470 |
| cholades 179 | eius morbi | 16,263 |
| cholera 49,308 | columna | 17,417, |
| chorion 468 | 453 | |
| choroides 432,468 | coma | 30 |
| chyli 447 | comitialis morbus | |
| chymi 446 | 2,82,250,357 | |
| cilia 411,454 | concha | 414,455 |
| claves 418,458 | condyli | 420,458 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------|
| cor | 422, 434, 459, | 469 | |
| | 473, 474 | | |
| coræ | 454 | ctedones | 468 |
| cornicularistuni- | | cubitiffare | 420 |
| ca | 432 | cubitus | 420, 458 |
| corona | 452, 468 | | 488 |
| corone | 411 | cuculus | 461 |
| coronaria sutura | | cyceon | 181 |
| | 428 | cyclops | 417 |
| corfæ | 410 | cynanche | 13 |
| coryza | 413 | cypselis | 136, 446 |
| costæ | 422. earum | | |
| tunicæ | 435 mor- | D. | |
| bus | 24 | | |
| cotyli | 491 | Dartos | 441, 481 |
| coxendix | 426 | delphys | 440 |
| cranteres | 416 | dentes | 416, 456 |
| craspedon | 17 | dera | 457 |
| crassæ arteriæ mor- | | diabetes | 154, 382 |
| bi | 320 | diapliffare | 423 |
| cremasteres | 55, | diarrhoea | 175, 193 |
| | 441 | digiti | 420, 459 |
| cremni | 424 | Dionysius | 443 |
| crotaphi | 410 | diploe | 429 |
| crusta | 19 | discoïdes | 469 |
| crystalloïdes | 433, | dodecadactylus | |
| | | | 477 |

| | | | |
|---------------|----------|--------------------|---------------|
| Dores Siculi | 20, | epigonatis | 426, |
| | 442 | | 462, 491, 492 |
| dorsi ossa | 425, 461 | epigunides | 426, |
| dracontides | 442 | epilepsia | 82 |
| dysenteria | 179 | epymilis | 426 |
| | | epiploon | 437 |
| | | episcenium | 410 |
| | | epision | 424, 460 |
| Elephantias | 203 | epomides | 418, 457 |
| elephantiasis | 394 | Erastatus | 483 |
| elephas | 203 | erythroides | 441, |
| Empedocles | 444 | | 481 |
| emprosthenos | 7 | eschara | 19, 187 |
| empyema | 36 | etmoide | 429 |
| empyi | 107, 111 | Eudem ^o | 418, 430, |
| entera | 189 | | 443 |
| epanthismi | 443 | eunuchi | 480 |
| ephebraum | 422 | Euripho | 424 |
| ephedrana | 462 | exanthemata | 19 |
| Epicharmus | 420 | excrementa | 445, |
| epichordis | 52 | | 446 |
| epidermis | 412 | | |
| epigastrium | 422, | | |
| | 460, 476 | | |
| epiglossis | 416, 456 | | |
| | 469 | | |
| | | F. | |
| | | Facies | 413 |
| | | fauces | 417 |
| | | | circa |

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|---------------|
| pestilentes mor- | | gonorrhœa | 168, |
| bi | 266 | | 386 |
| febris bistoria | 47 | gonos | 446 |
| fibræ | 455, 468 | gracilia intestina | |
| fibræ auris | 414 | | 477 |
| filamenta | 468 | grammatistæ | 450 |
| flatus | 446 | gula | 434, 471, 475 |
| fœmina | 426, 462 | gurgulio | 16, 417, |
| foramina | 430 | | 457 |
| frons | 410, 452 | guttur | 418, 434, |
| furor | 87, 91 | | 457 |

G.

Gangræna 69
gastrocnemia 426
gemini 423
genæ 410
genuini 416, 456
genu 426, 462
gingivæ 416, 456
glabella 410, 413,
452
glans 423
glena 411, 454
globulus 453

H.

Habena 455
hamorrhagia 33
helix 414, 455
hemine 425
hepatitis 442
herculeus morbus
207
Herophilus 426,
432, 433, 434, 439
442, 468, 483
Homeri locus 87,
417, 418, 425, 436

| | | |
|-------------------|---------------------|----------|
| homo exiguus mū | hystera | 440 |
| dus 465 | | |
| homini similia a- | I. | |
| nimantia 427 | | |
| hostiarius 477 | Ichor | 190 |
| humerus 418, 419, | icterus | 133 |
| 457, 458, 487 | iecur | 437, 472 |
| humorum species | iecoris morbi | 55, |
| 108 | 124, 316, 376 | |
| hydropici 129 | ieiunum intestinū | |
| hydrops 146 | 436, 477 | |
| hypena 416 | ilia | 425 |
| hypochōdria 422, | ileus | 51 |
| 460 | ilithya | 448 |
| hypodermis 424 | iugua | 425, 462 |
| hypodiris 418 | insania | 86 |
| hypoglossis 416, | intercostalia | 422 |
| 456 | internodia 420, 458 | |
| hypoglutides 425 | 489, 493 | |
| hypopia 413, 454 | interseptum | 475 |
| hyporrhinon 413, | intestina | 436, 476 |
| 453 | iris | 412, 454 |
| hypospondylum | ischias | 195 |
| 425, 461 | isthmi | 470 |
| hypothenar 421 | ithmoides | 48 |
| hypostema 460 | iugula | 458, 487 |

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 418 | | 433, 469 | |
| iuli | 410, 416, 452 | leo morbus | 207 |
| | | lepidoides futura | |
| | L. | 428 | |
| | | leucania | 415, 418, |
| Labia | 453 | 454 | |
| lac | 446 | leucophlegmatias | |
| laccopedon | 423, | 149 | |
| 461 | | lien | 438, 472 |
| laccoschea | 423 | lienis morbi | 129, |
| lacertus | 458 | 379 | |
| lactes | 52, 436, 478 | lienteria | 189 |
| leuitas intestino- | | lingua | 416, 456, |
| rum | 188 | 469 | |
| lambdoides futura | | lorum | 17 |
| 428, 486 | | lumbi | 421, 459, 461 |
| lanugo | 410, 416, | | |
| 452 | | M. | |
| laparæ | 423 | Malæ | 414, 454, |
| lapidea ossa | 429 | mala | 417, 419 |
| laxum intestinum | | malleoli | 462 |
| 436 | | malus corporis ha- | |
| lateris morbus | 23, | bitus | 140 |
| 268. | | mammæ | 421, 459 |
| latus | 459. | mandibula | 414 |
| lenticularis tunica | | | |
| | | Nn | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| mamma 87 | micare 443 |
| manus 419, 420, | molaë 462, 492 |
| 458 | molares 416, 456 |
| marmorata 136. | mortariola 416, |
| 446 | 456 |
| maxillæ 454 | mucor 413 |
| maxillares 416 | mucus 446 |
| medulla 432, 445, | musculi 430, 439, |
| 483 | 445, 482 |
| melancholia 86, 365 | myrtachila 424, |
| melancholici 87 | 461 |
| membra 431, 445 | myrton 424, 461 |
| menfa 456 | mystaces 416 |
| menes 446 | myttotum 182 |
| mentum 415, 454 | myxa 413 |
| mesarcon 436, 478 | N. |
| mesenterion 436 | |
| mesomeria 426 | |
| mesophryon 410, | Nares 413, 453 |
| 452 | nasus 429, 452 |
| metacarpion 420 | nates 425, 461 |
| metacondyli 420, | necrosis 69 |
| 458 | nephritis 439 |
| metaphrenon 421, | nerui 432, 444, 483 |
| 459 | neruorum resolu- |
| metra 440 | tio 98 |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| nuxera | 436 | paralyfis | 99 |
| nodi | 458 | parameria | 426 |
| nympha | 414, 424, | paraplegia | 99 |
| 461 | | parasyra | 416, 458 |
| O. | | parencephalis | 431 |
| Oculus | 411, 432 | parefis | 99 |
| 453, 467 | | paristhmia | 417, |
| occiput | 410, 452 | 470 | |
| occipitium | 457 | patella | 426, 462, |
| oesophagus | 434 | 492 | |
| olecranon | 420, 458 | pecten | 422, 424, |
| omentum | 437, 479 | 460 | |
| omoplatae | 418 | pectus | 421, 459 |
| opisthotonos | 7 | penis | 460 |
| ora venarum | 472 | periostios tunica | |
| orrhos | 423 | 428 | |
| orthopnoea | 119 | Pericardios | 435, |
| ossa | 482 | 474 | |
| P. | | pericraniū | 428 |
| Palatum | 417, 456 | perineus | 460 |
| palma | 420 | peripneumonia | 29 |
| palmae | 458 | peritonæon | 437 |
| palpebrae | 410, 453 | pestis faucium | 266 |
| pancreas | 437 | peza | 463 |
| papillae | 421, 459 | phagedæna | 193 |
| pappus | 416 | phalanges | 420, |

Nu 2

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| 458, 489 | | præputiū | 413, 460 |
| pharynx | 471 | præsepia | 456 |
| phlegmatias | 147 | proboscis | 206 |
| Philistio Ital ⁹ | 442 | procardion | 422, |
| philtrum | 413, 453 | 459 | |
| phrenes | 435, 459 | prochila | 413, 453 |
| ptrenitici | 216 | procondyli | 420, |
| phthisis | 107, 373 | 458 | |
| phthoe | 107 | proglossum | 456 |
| pinguitudo | 482 | propogonium | 416 |
| pinna | 413 | proftomion | 414, |
| pituita | 445 | 453 | |
| planta | 426, 463, | psoæ | 439, 440 |
| 493 | | pterygomata | 424 |
| plechas | 74, 423 | pubes | 422, 460 |
| plechades | 462 | pudenda | 460, 461 |
| pleuritis | 23, 268 | pudendum mulie. | |
| podagra | 196 | bre | 424 |
| pollex | 420 | pulmonis abscess ⁹ | |
| poples | 426 | 117 | |
| porta iccoris | 437 | pulmonis vlcera | |
| portæ venarū | 472 | 373 | |
| Praxagoras | 441, | pulmonarij | 122 |
| 444, 446 | | pulmonaria | 28, 281 |
| præcordia | 422, | pulsus | 482 |
| 460 | | papilla | 411 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| purulenti | 107, 111 | sanguinis reiectio | |
| pus | 108, 111 | | 32 |
| pyelides | 486 | satyriasis | 73, 707, |
| pylorus | 436 | | 332 |
| pyrinoides | 434 | scirrhus | 129, 379 |
| R. | | sceptrula aperta | |
| Rabidus canis | 13 | | 457, 487 |
| radius | 420, 426, | scotoma | 82 |
| | 488 | scrotum | 423, 460, |
| regius morbus | 132 | | 480, 481 |
| renes | 438, 478 | scutilla | 420, 458 |
| renum affectus | 63, | scytaides | 489, 493 |
| | 158 323 | sedimentum | 423, |
| reticularis tunica | | | 438, 460 |
| | 433, 468 | secunda | 448 |
| rhago des tunica | | sedilia | 425 |
| ibidem | | femen | 446 |
| rhorrhones | 413 | feminis profluuiū | |
| rigor | 7 | | 168, 386 |
| ryteon | 181 | f. minaria vasa | 338 |
| | | | 479 |
| S. | | seranges | 445 |
| Sacrum os | 425, | septū transversum | |
| | 461, 490 | | 459 |
| salua | 446 | sigmatoides | 488 |
| | | sophronisteres | 416 |
| | | Nn | 3 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4567 | | T. | |
| spathe | 459 | Tabes | 241 |
| sphincter | 477, 478 | talus | 491, 492 |
| spina | 425, 457, 461, | tali | 426, 462 |
| 467 | | tarsus | 410, 420, |
| splenitis | 442 | 426, 454, 493 | |
| spuriae costae | 422, | tempora | 410, 452 |
| 490 | | tendones | 418, 444 |
| stema | 423, 460 | tergum | 459 |
| sternō | 112, 421, 459 | testes | 423, 460 |
| stethos | 420, 426 | testiū tunicae | 441 |
| stomachus | 434 | tetanus | 7, 253 |
| stomachi affectus | | tibia | 426, 462, 491 |
| 170 | | thenar | 418 |
| stomachici | 389 | thora | 446 |
| strophus | 178 | thorax | 409, 421, |
| sudor | 446 | 451 | |
| sumen | 460 | thymus | 435 |
| supercilia | 452 | tonfillae | 417, 470 |
| sura | 426, 462, 491 | tonfillarum vlce- | |
| suturae | 428 | ra | 19 |
| sinanche | 12 | tonus | |
| synciput | 410, 452 | toni | 434, 447 |
| syncopa | 43, 297 | tormina | 178 |
| Syriaca vlcera | 19 | tragus | 419, 455 |
| | | tramis | 423, 438 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| transuersum septū | vesicę ægritudines |
| 435, 475 | 66, 164, 326 |
| tunicæ | vestigium |
| 445 | 463 |
| tunicæ oculi | veternosi |
| 412, | 233 |
| 467 | vetula |
| tympanias | 422, 460 |
| 147 | vipera |
| V. | 213 |
| Vbera | vitrea |
| 421 | 468 |
| venæ | vlua |
| 441, 443, | 458 |
| 472, 482 | umbilicus |
| venę concauę mor | 422, |
| bi | 445, 460 |
| 58, 320 | ungues |
| venum vlcera | 428, 458 |
| 384 | vola |
| venter | 421, 458, 459 |
| 422, 436 | voluulus |
| véter superior | 51, 178, |
| 476 | 313 |
| vétricul ⁹ | vreteres |
| 436, 475 | 423, 438 |
| ventriculi affectus | vrethra |
| 175 | 423 |
| ventriculios' | vrina |
| 422 | 446 |
| vertebræ | vrinæ profluuium |
| 425, 433 | 154 |
| 461, 487, 489 | vrinaculum |
| vertex | 448 |
| 410, 420, | uterus |
| 452 | 440, 481 |
| vertigo | uteri morbi |
| 82 | 190 |
| vertiginosi | vua |
| 349 | 17, 417, 457 |
| 438 | vuiferi processus |
| vesica | 417 |
| | vulpes |
| | 439 |

vulua 69,440,481 Ypsiloides 434
vulux strangula- Z.
sus 69,329

Y Zeno 447

